

استان یزد - صفحات ۱ تا ۱۰			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱	در رابطه با گروه چهاردهم جدول دوره‌ای عناصرها، درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. (آ) عنصر سوم این گروه در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد. (ب) عنصر پنجم این گروه برخلاف عنصر سوم در اثر ضربه خرد نمی‌شود. (پ) ۵ عنصر اول این گروه در دوره‌ای ۲ تا ۶ جدول دوره‌ای قرار گرفته‌اند. (ت) عنصر اول این گروه همانند عنصر دوم سطح تیره و کدر دارد.	(آ) درست (ب) درست (پ) درست (ت) نادرست	۱
۲	ویژگی چند عنصر داده شده است، درستی یا نادرستی هر یک را مشخص کنید. (آ) قلع رسانایی گرمایی و الکتریکی بالا دارد و در اثر ضربه تغییر شکل می‌دهد. (ب) گوگرد عایق جریان برق و گرماست و در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد یا می‌گیرد. (پ) منیزیم رسانایی گرمایی و الکتریکی بالایی دارد و در اثر ضربه خرد می‌شود. (ت) گرافیت آلوتروپی از کربن است که سطح تیره‌ای دارد و در برابر ضربه مقاوم می‌باشد.	(آ) درست (ب) درست (پ) نادرست - منیزیم در اثر ضربه تغییر شکل می‌دهد. (ت) نادرست - گرافیت جامدی شکننده است.	۱
۳	کدام یک از موارد زیر نادرست است؟ توضیح دهید. (آ) توانایی فلزها در از دست دادن الکترون و چکش‌خوار بودن جزو رفتارهای فیزیکی آنها به شمار می‌روند. (ب) روندهای تناوبی در جدول بر اساس کمیت‌های وابسته به اتم قابل توضیح است. (پ) میان شعاع اتم‌ها و خصلت فلزی و نافلزی رابطه مستقیم وجود دارد. (ت) فعالیت شیمیایی ^{۱۹}K بیش‌تر از ^{۱۱}Na است.	(آ) نادرست - از دست دادن الکترون جزء خواص شیمیایی فلزها است. (ب) درست (پ) نادرست - شعاع اتمی با خصلت نافلزی رابطه عکس دارد. (ت) درست	۱/۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	(آ) درست (ب) درست (پ) نادرست (ت) درست	با توجه به جدول دوره‌ای، درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. (آ) جدول دوره‌ای شامل ۷ دوره و ۱۸ گروه است. (ب) نسبت تعداد عناصر دوره دوم به دوره اول، برابر ۴ است. (پ) در دوره دوم جدول با افزایش عدد اتمی خصلت فلزی افزایش می‌یابد. (ت) در گروه‌های اصلی، عنصرهایی که دارای تعداد الکترون‌های ظرفیتی برابر هستند، می‌توانند دارای خواص شیمیایی مشابه باشند.	۴
۰/۵	گروه از بالا به پایین - Cs_{۵۵}	با انتخاب واژه مناسب، عبارت را کامل کنید. در هر گروه از بالا به پایین خصلت فلزی افزایش می‌یابد و Ba_{۵۶} خصلت فلزی کمتری از $\frac{K_{۱۹}}{Cs_{۵۵}}$ دارد.	۵
۱/۷۵	(آ) نافلز (ب) دو ، بالاتر (پ) دانش تجربی - خواص مواد (ت) شکننده - نافلز	در هر مورد واژه مناسب را انتخاب کنید. (آ) قوی‌ترین (فلز/نافلز) در سمت راست و بالای جدول قرار دارد. (ب) در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای (یک/دو) شبه فلز وجود دارد و در گروه‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷، عنصرهای (بالاتر/پایین‌تر) خصلت نافلزی بیشتری دارند. (پ) با گسترش (فناوری/دانش تجربی) شیمی‌دان‌ها به رابطه بین (خواص مواد/موادمناسب) با عنصرهای سازنده آنها پی بردند. (ت) عنصر سیلیسیم مشابه نافلزها (درخشان/شکننده) است و عنصر گوگرد یک (فلز/نافلز) است	۶
۲	(آ) B (ب) B زیرا در یک دوره از چپ به راست خصلت نافلزی افزایش می‌یابد. (پ) A زیرا در یک دوره از چپ به راست از گروه ۱ به ۲ واکنش‌پذیری کم می‌شود.	باتوجه به جدول زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید: (آ) کمترین شعاع اتمی مربوط به کدام عنصر است؟ (ب) خصوصیات نافلزی C بیشتر است یا B ؟ چرا؟	۷

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	پ) واکنش پذیری کدام یک بیشتر است؟ A یا E . چرا؟ ت) فعال ترین فلز کدام است ؟ چرا ؟ <table><tr><td>گروه \ دوره</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۱۶</td><td>۱۷</td></tr><tr><td>n = ۲</td><td></td><td></td><td>C</td><td>B</td></tr><tr><td>n = ۳</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>n = ۴</td><td>A</td><td>E</td><td></td><td></td></tr><tr><td>n = ۵</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	گروه \ دوره	۱	۲	۱۶	۱۷	n = ۲			C	B	n = ۳					n = ۴	A	E			n = ۵	D				
گروه \ دوره	۱	۲	۱۶	۱۷																							
n = ۲			C	B																							
n = ۳																											
n = ۴	A	E																									
n = ۵	D																										
۰/۵	لایه ظرفیت عنصرهای این گروه به صورت $ns^2 np^2$ است. باید برای جواب از عناصر گروه ۱۴ انتخاب کنیم. Ge یا Si یا C (آ) Si یا Ge (ب)	۸ عنصرهای این گروه دو الکترون با عدد کوانتومی $l = 1$ در لایه ظرفیت خود دارند. در پاسخ به سؤالات زیر یکی از عناصر گروه را نام ببرید. (آ) در واکنش با سایر اتم ها ، الکترون به اشتراک می گذارد . (ب) رسانای خوب برق نیست																									
۱	(آ) الکترون های ظرفیتی عنصرهای گروه های ۳ و ۱۳ یا (۴ و ۱۴ یا ۵ و ۱۵ یا ۶ و ۱۶ یا ۷ و ۱۷ یا ۸ و ۱۸) با هم برابر هستند. (ب) چون در یک دوره فعالیت شیمیایی هالوژن ها از سایر نافلزهای دیگر بیشتر است	۹ برای جملات درست زیر دلیل بنویسید : (آ) شمار الکترون های ظرفیتی عناصر گروه های مختلف، می تواند برابر باشد. (ب) اگر فعالیت شیمیایی نافلز Y بیشتر از هالوژن D باشد، این دو عنصر در یک دوره جای ندارند																									
۱/۲۵	(آ) سیلیسیم یا ژرمانیم (ب) کربن (پ) سیلیسیم و ژرمانیم (ت) نافلزها	۱۰ با توجه به عنصرهای گروه چهاردهم به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (آ) عنصری نافلز نام ببرید که رسانایی گرمایی داشته باشد. (ب) عنصری نافلز نام ببرید که رسانایی الکتریکی زیادی داشته باشد. (پ) عنصری نام ببرید که الکترون به اشتراک می گذارد ولی نافلز نباشد. (ت) خواص شیمیایی شبه فلزها به کدام دسته از عناصر شبیه است؟																									

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

استان همدان - صفحات ۱ تا ۱۰											
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره								
۱۱	جملات زیر را با عبارت‌های داده کامل کنید. (رساناها - دانش تجربی- مواد مناسب - رفتار - نیمه رساناها- مواد افزودنی-خاصیت- اقتصاد نوین) آ) برای شناسایی ساختار دقیق هدایای زمینی دانش شیمی ما کمک می‌کند، تا به..... .. آنها پی ببریم و بهره‌برداری درست از آنها را بیاموزیم. ب) گسترش فناوری به میزان دسترسی به..... وابسته است. پ) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام..... ساخته می‌شوند. ت) با گسترش..... شیمی‌دان‌ها به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آنها پی بردند.	آ) رفتار ۰/۲۵ نمره ب) مواد مناسب ۰/۲۵ نمره پ) نیمه رساناها ۰/۲۵ نمره ت) دانش تجربی ۰/۲۵ نمره	۰/۷۵								
۱۲	با توجه به عناصر دوره سوم جدول تناوب به سوالات خواسته شده پاسخ دهید. <table border="1"><tr><td>Na</td><td>Mg</td><td>Al</td><td>Si</td><td>P</td><td>S</td><td>Cl</td><td>Ar</td></tr></table> آ) کدام عنصر بیشترین تمایل به تبدیل شدن به کاتیون را دارد؟ چرا؟ ب) کدام عنصر تمایلی برای واکنش ندارد؟ چرا؟ پ) کدام عنصر مرزی میان فلزها و نافلزهاست؟ چرا؟ ت) کدام عنصرها می‌توانند ترکیب یونی با فرمول عمومی A_2B تشکیل دهند.	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	آ) سدیم زیرا در لایه آخر خود تنها یک الکترون دارد. ۰/۵ نمره ب) آرگون زیرا لایه آخر آن هشت تایی و تکمیل است. ۰/۵ نمره پ) سیلیسیم زیرا شبه فلز می باشد. ۰/۵ نمره ت) سدیم و گوگرد. ۰/۵ نمره	۲
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar				
۱۳	آرایش الکترونی A^{2+} به $[Ar]$ ختم می‌شود: آ) این عنصر فلزاست یا نافلز؟ چرا؟ ب) آرایش الکترونی آن را بنویسید.	آ) فلز است بخاطر بار مثبت و از دست دادن الکترون ۰/۵ نمره ب) $1s^2/2s^22p^6/3s^23p^6/4s^2$ ۰/۵ نمره پ) دوره چهارم و گروه دوم ۰/۵ نمره	۲								

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	پ) دوره و گروه آنرا در جدول دوره ای عناصر معین کنید (ت) تعداد الکترونها $I=0$ در حالت یونی آن را بنویسید.	(ت) شش الکترون ۰/۵ نمره	
۱۴	با توجه به عناصر گروه ۱۴ که در زیر آمده است به پرسش ها پاسخ دهید: (آ) کدام عنصر سطح تیره و در اثر ضربه خورد می شود. (ب) کدام عناصر رسانایی کمی دارند و از نظر خواص شیمیایی رفتار مشابهی با نافلزات دارند. (پ) کدام عنصر رسانایی گرمایی و الکتریکی بالایی دارد ؟	C Si Ge Sn (آ) کربن ۰/۲۵ نمره (ب) سیلیسیم و ژرمانیم ۰/۵ نمره (پ) قلع ۰/۲۵ نمره	۱
۱۵	هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید. « مواد مناسب – هفدهم – رساناها – گرافیت – اول – دانش تجربی – الماس – نیمه رساناها » (آ) گسترش فناوری به میزان دسترسی به وابسته است. (ب) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام ساخته می شوند. (پ) در هر دوره فعال ترین فلز در گروه و فعال ترین نافلز در گروه قرار دارد. (ت) همه نافلزات به جز نارسانا هستند.	(آ) مواد مناسب (ب) نیمه رساناها (پ) اول – هفدهم (ت) گرافیت	۱/۲۵
۱۶	جمله های درست یا نادرست را مشخص کرده و جمله های نادرست را تصحیح کنید. (آ) در هر دوره با کاهش عدد اتمی خاصیت فلزی افزایش می یابد. (ب) در دوره چهارم جدول تناوبی دو عنصر وجود دارد که آخرین زیرلایه آنها به $4s^1$ ختم می شود. (پ) در دوره سوم و گروه چهاردهم جدول تناوبی دو فلز وجود دارد.	(آ) درست (ب) نادرست – سه عنصر وجود دارد. (K . Cr . Cu) (پ) نادرست – در دوره سوم سه فلز وجود دارد.	۱/۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱۷	موارد زیر را با ذکر دلیل مقایسه کنید. آ) خاصیت نافلزی ^{16}S و ^{17}Cl ب) شعاع اتمی ^{35}Br و ^{37}Br	آ) خاصیت نافلزی $^{17}\text{Cl} < ^{16}\text{S}$ چون شعاع ^{17}Cl کمتر است و راحتتر الکترون جذب می‌کند. ب) شعاع اتمی $^{35}\text{Br} > ^{37}\text{Br}$ چون تعداد لایه‌های ^{35}Br بیشتر است.	۱/۵
۱۸	کلمات موجود در کدام گزینه برای پرکردن جاهای خالی متن زیر، مناسب‌تر است؟ « نافلزها به طور عمده در سمت جدول دوره‌ای قرار گرفته‌اند و خواص فیزیکی شبه فلزها بیشتر به شبیه بوده در حالی که رفتار شیمیایی آنها همانند است.» ۱) چپ و مرکز – فلزها – نافلزها ۲) راست و بالای – فلزها – نافلزها ۳) چپ و مرکز – نافلزها – فلزها ۴) راست و بالای – نافلزها – فلزها	گزینه ۲	۰/۵
۱۹	علت درستی هر یک از عبارتهای زیر را بنویسید. آ) Si مانند Cu سطح صیقلی دارد. ب) همه عنصرهایی که آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم آنها مشابه است در یک گروه قرار ندارند.	آ) چون خواص فیزیکی شبه‌فلزات شبیه فلزات است ب) مثلاً آرایش الکترونی لایه ظرفیت هلیوم با آرایش الکترونی لایه ظرفیت بقیه عناصر هم‌گروهش متفاوت است.	۱
۲۰	در جملات زیر ، صحیح و غلط را با ذکر دلیل ، مشخص کنید. آ) واکنش پذیری و شعاع اتمی گروه ۱۷ با افزایش عدد اتمی، رابطه مستقیم دارند. ب) آرایش الکترونی لایه آخر در همه عناصر یک گروه، مشابه است. پ) اتم پتاسیم بزرگترین شعاع را در دوره خود دارد. ت) در همه گروه‌های جدول تناوبی، با افزایش عدد اتمی، واکنش پذیری افزایش می‌یابد.	آ) غلط ، با واکنش پذیری رابطه وارونه دارد. ب) غلط ، گروه گاز نجیب متفاوت است. پ) صحیح، چون اولین اتم دوره خود است. ت) غلط ، در هر گروه از بالا به پایین واکنش‌پذیری فلزها افزایش و واکنش‌پذیری نافلزها کاهش می‌یابد.	۲/۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	در جملات زیر با حذف کلمه نادرست، جمله درستی به دست آورید. آ) در همه گروه‌های عنصرها به جز گازهای نجیب، با افزایش عدد اتمی (واکنش پذیری/خصلت فلزی) افزایش می‌یابد. ب) کربن تنها نافلزی است که دارای رسانایی (گرمایی/الکتریکی) است. پ) در تمامی نافلزات ویژگی (اشتراک / گرفتن) الکترون، مشترک است. ت) خاصیت نافلزی فلزها از کلر (بیشتر/کمتر) و شعاع اتمی آن از برم (کوچکتر/بزرگتر) است. ث) هر چه شعاع اتمی یک فلز بیشتر باشد (دشواری/آسانی) تر الکترون از دست می‌دهد.	۲۱												
۲	در شکل چند عنصر با شعاع اتمی متفاوت نشان داده شده است. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) اگر این عناصر در یک دوره از جدول قرار داشته باشند، کدامیک تمایل بیشتری به گرفتن الکترون دارد؟ چرا؟ ب) اگر عناصر A, B, C در یک گروه از جدول قرار داشته باشند و به هنگام واکنش با آب گاز هیدروژن تولید کنند، کدامیک از اعداد ۱۶۷، ۱۹۰ و ۲۴۳ برای شعاع هر کدام از این عناصر مناسب است. (قسمت نماد و شعاع را تکمیل کنید) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>شعاع اتمی</th><th>واکنش پذیری با آب</th><th>نماد</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱۶۷</td><td>با آب به آرامی واکنش می‌دهد</td><td>B</td></tr> <tr> <td>۱۹۰</td><td>با آب به شدت واکنش می‌دهد</td><td>A</td></tr> <tr> <td>۲۴۳</td><td>به هنگام واکنش آتش می‌گیرد</td><td>C</td></tr> </tbody> </table>	شعاع اتمی	واکنش پذیری با آب	نماد	۱۶۷	با آب به آرامی واکنش می‌دهد	B	۱۹۰	با آب به شدت واکنش می‌دهد	A	۲۴۳	به هنگام واکنش آتش می‌گیرد	C	۲۲
شعاع اتمی	واکنش پذیری با آب	نماد												
۱۶۷	با آب به آرامی واکنش می‌دهد	B												
۱۹۰	با آب به شدت واکنش می‌دهد	A												
۲۴۳	به هنگام واکنش آتش می‌گیرد	C												

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	با توجه به عناصر گروه ۱۴ و دوره سوم جدول تناوبی که به ترتیب عدد اتمی (از چپ به راست) مرتب شده اند، مقایسه های زیر را انجام دهید. گروه ۱۴: $C - Si - Ge - Sn - Pb$ دوره سوم: $Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl$ (آ) واکنش پذیری سدیم با منیزیم (ب) خصلت فلزی آلومینیم با منیزیم (پ) فعالیت شیمیایی کلر با کربن (ت) شعاع اتمی ژرمانیم با سرب (ث) خصلت نافلزی گوگرد با فسفر (ج) شمار لایه های الکترونی سیلیسیم با قلع	۲۳
۱	(آ) برم کمتر از فلوئور (ب) کلر بیشتر از گوگرد (پ) کلسیم کمتر از پتاسیم (ت) آلومینیم کمتر از سدیم	۲۴
۲	گروه اول: از بالا به پایین، خصلت فلزی و شعاع اتمی و واکنش پذیری افزایش می یابد اما خصلت نافلزی، کاهش می یابد. گروه هفده: از بالا به پایین، خصلت فلزی و شعاع اتمی افزایش اما خصلت نافلزی و واکنش پذیری کاهش می یابد.	۲۵

استان هرمزگان - صفحات ۱ تا ۱۰			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۶	با توجه به نمودار ستونی زیر که برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در جهان نشان می‌دهد، درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.  آ) بیشترین مصرف ذخایر زمین مربوط به سخت‌های فسیلی است. ب) تقاضای جهانی برای استفاده از ذخایر فلزی روندی ثابت دارد. پ) در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰، تولید و مصرف نسبی مواد معدنی بیشتر از سخت‌های فسیلی است. ت) تمام مواد طبیعی و ساختگی از کره زمین به دست می‌آیند. ث) رشد مصرف سرامیک در آینده بیشتر از نفت خام خواهد بود.	آ) نادرست ب) نادرست پ) درست ت) درست ث) درست	۱/۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲۷	با توجه به ۳۶ عنصر اول جدول دوره‌ای به سوالات پاسخ دهید. (آ) بیشترین خصلت فلزی و بیشترین خصلت نافلزی مربوط به کدام عناصر است؟ (ب) چند عنصر در دسته d قرار دارند؟ (پ) عنصری شبه فلز که در دوره سوم قرار دارد؟ (ت) عنصری نافلز که پایدارترین شکل آن، رسانایی الکتریکی دارد؟ (ث) عنصری نارسانای الکتریکی که حالت فیزیکی آن مایع می‌باشد؟ (ج) در عناصر دوره چهارم جدول چه تعداد از عناصر دارای زیرلایه ۳d کاملاً پر هستند و چه تعداد از عناصر در آخرین لایه خود یک الکترون دارند؟	(آ) بیشترین خصلت فلزی پتاسیم (K۱۹) و بیشترین خصلت نافلزی فلوئور (F۹) (ب) ۱۰ عنصر (پ) سیلیسیم (Si۱۴) (ت) کربن (گرافیت) (ث) برم (Br۳۵) (ج) ۸ عنصر – ۳ عنصر																					
۲۸	با توجه به جدول زیر درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. <table><tr><td>گروه \ دوره</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۱۳</td><td>۱۴</td><td>۱۵</td><td>۱۶</td></tr><tr><td>۳</td><td>A</td><td></td><td>C</td><td>F</td><td>G</td><td>I</td></tr><tr><td>۴</td><td></td><td>B</td><td>D</td><td></td><td>H</td><td></td></tr></table> (آ) خصلت فلزی اتم B از خصلت فلزی اتم‌های C و D کمتر است. (ب) عنصر F سطحی کدر دارد و شکننده است. (پ) عنصر A سدیم بوده که نرم است و با چاقو بریده و در هوا به سرعت سطح آن کدر می‌شود. (ت) خصلت نافلزی اتم H از خصلت نافلزی اتم I بیشتر است	گروه \ دوره	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۳	A		C	F	G	I	۴		B	D		H		(آ) نادرست (ب) نادرست (پ) درست (ت) نادرست
گروه \ دوره	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶																	
۳	A		C	F	G	I																	
۴		B	D		H																		

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	(آ) لایه ظرفیت اتم این عنصر $ns^2 np^2$ است: $\left. \begin{array}{l} s: 2(n+1) = 2(n+0) \\ p: 2(n+1) = 2(n+1) \end{array} \right\} \Rightarrow 2(n+0) + 2(n+1) = 18 \Rightarrow n = 4$ این عنصر در دوره چهارم قرار دارد و ژرمانیم و یک شبه فلز است (ب) پیوند اشتراکی (کووالانسی)	۲۹ اگر مجموع $n+l$ الکترون‌های لایه ظرفیت عنصری از گروه ۱۴ برابر ۱۸ باشد: (آ) این عنصر فلز است، شبه فلز یا نافلز؟ (ب) در واکنش با نافلزات چه نوع پیوندی می‌دهد؟																								
۱/۵	(آ) عنصرهای زیر را با استفاده از خواص فیزیکی در دو دسته فلز و نافلز دسته‌بندی نمایید. $Mg - Co - P - K - Cl - C$ (ب) ویژگی‌های عنصری که تعداد الکترون‌های زیرلایه با عدد کوانتومی $l=1$ آن برابر ۹ است با ویژگی کدام دسته از عناصرها (فلز ، نافلز ، شبه فلز) مطابقت دارد؟ (پ) عنصری از دوره چهارم که ۱۱ الکترون ظرفیتی دارد رساناست یا نارسانا؟ (ت) با توجه به جدول زیر، چگالی کدام عنصر بیشتر است؟ ^{26}A یا ^{17}B (آ) عنصرهای Mg, Co, K فلز اما عناصر P, Cl, C نافلز هستند. (ب) آرایش الکترونی عنصری که تعداد الکترون‌های زیرلایه با عدد کوانتومی $l=1$ آن برابر ۹ است به صورت $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ است پس ویژگی آن مشابه نافلزها است. (پ) رسانا (ت) ^{26}A	۳۰ <table border="1"> <thead> <tr> <th>خاصیت</th><th>فلز</th><th>نافلز</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حالت سطح</td><td>درخشان</td><td>کدر</td></tr> <tr> <td>سختی</td><td>بسیار زیاد و زیاد</td><td>کم</td></tr> <tr> <td>شکل پذیری</td><td>شکل پذیر</td><td>شکل ناپذیر</td></tr> <tr> <td>قابلیت مفتول شدن</td><td>دارد</td><td>ندارد</td></tr> <tr> <td>چگالی</td><td>زیاد</td><td>کم</td></tr> <tr> <td>رسانایی</td><td>زیاد</td><td>ندارد</td></tr> <tr> <td>حالت</td><td>جامد (بجز جیوه)</td><td>جامد، مایع، گاز</td></tr> </tbody> </table>	خاصیت	فلز	نافلز	حالت سطح	درخشان	کدر	سختی	بسیار زیاد و زیاد	کم	شکل پذیری	شکل پذیر	شکل ناپذیر	قابلیت مفتول شدن	دارد	ندارد	چگالی	زیاد	کم	رسانایی	زیاد	ندارد	حالت	جامد (بجز جیوه)	جامد، مایع، گاز
خاصیت	فلز	نافلز																								
حالت سطح	درخشان	کدر																								
سختی	بسیار زیاد و زیاد	کم																								
شکل پذیری	شکل پذیر	شکل ناپذیر																								
قابلیت مفتول شدن	دارد	ندارد																								
چگالی	زیاد	کم																								
رسانایی	زیاد	ندارد																								
حالت	جامد (بجز جیوه)	جامد، مایع، گاز																								

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲	آ) Cl تمایل بیشتری به گرفتن الکترون دارد چون شعاع اتمی آن کمتر و خصلت نافلزی آن نسبت به P بیشتر است. ب) خصلت فلزی Ga بیشتر از Al است. چون در یک گروه از بالا به پایین با افزایش شعاع اتمی خصلت فلزی افزایش می‌یابد. پ) خصلت نافلزی Br بیشتر است زیرا شعاع کوچکتری دارد و در یک دوره از چپ به راست خصلت نافلزی با کاهش شعاع اتمی، افزایش می‌یابد. ت) سرعت واکنش F با گاز هیدروژن بیشتر است چون $F.Cl$ هم گروه هستند اما F دارای شعاع کوچکتر و خصلت نافلزی بیشتر است پس سریع‌تر واکنش می‌دهد.	با توجه به جدول داده شده با ذکر دلیل موارد خواسته شده را با هم مقایسه کنید. آ) تمایل به گرفتن الکترون: $P \circ Cl$ ب) خصلت فلزی: $Al \circ Ga$ پ) خصلت نافلزی: $Br \circ As$ ت) سرعت واکنش با گاز هیدروژن: $F \circ Cl$ <table border="1"> <tr> <td>گروه</td><td>۱۳</td><td>۱۵</td><td>۱۷</td></tr> <tr> <td>دوره</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>۲</td><td>B</td><td>N</td><td>F</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>Al</td><td>P</td><td>Cl</td></tr> <tr> <td>۴</td><td>Ga</td><td>As</td><td>Br</td></tr> </table>	گروه	۱۳	۱۵	۱۷	دوره				۲	B	N	F	۳	Al	P	Cl	۴	Ga	As	Br	۳۱
گروه	۱۳	۱۵	۱۷																				
دوره																							
۲	B	N	F																				
۳	Al	P	Cl																				
۴	Ga	As	Br																				
۱	آ) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 d^6 4s^2$ عدد اتمی عنصر ۲۶ است. ب) فعالیت شیمیایی این عنصر کمتر از فعالیت شیمیایی Na است چون تمایل به از دست دادن الکترون (خصلت فلزی) آن کمتر است.	عنصری در دوره چهارم شمار الکترون‌های دارای $l = 1$ با شمار الکترون‌های دارای $l = 2$ لایه سوم آن با هم برابر است: آ) عدد اتمی آن را مشخص کنید. ب) فعالیت شیمیایی این عنصر را با بیان علت با Na مقایسه کنید.	۳۲																				
۰/۷۵	آ) درست ب) نادرست پ) درست	درست یا نادرست بودن هر کدام از عبارات‌های زیر را مشخص کنید. آ) با چشم‌پوشی از گاز نجیب، عنصر اصلی سازنده نفت خام، کمترین واکنش‌پذیری را در بین عناصر هم دوره خود دارد. ب) $\frac{1}{3}$ عنصرهای دوره سوم که در شرایط معمولی به حالت جامدند، سطح صیقلی و براق دارند. پ) در گروه چهاردهم جدول دوره‌ای همانند گروه دوم از بالا به پایین، خاصیت فلزی عناصر افزایش می‌یابد.	۳۳																				

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

		جاهای خالی را با کلمات داده شده در کادر پر کنید :	
			بیشتر کمتر p s ۶ ۸
۰/۷۵	پ (آ) ب) بیشتر پ) ۶	۳۴ (آ) اگر A شبه فلز باشد به یقین در دسته جدول جای دارد. ب) عدد اتمی یک عنصر فلزی به یقین از عدد اتمی نافلز هم گروه آن است. پ) در سه دوره اول جدول، در مجموع ۸ عنصر گازی وجود دارد که عنصر آن، متعلق به دسته p است.	
۱	آ- نادرست - اغلب فلزهای اصلی با یک نوع کاتیون شرکت می‌کنند. ب- نادرست - عنصرهای شبه فلزی در خواص شیمیایی مشابه نافلزها هستند و الکترون به اشتراک می‌گذارند بنابراین در تشکیل ترکیب‌های یونی با نافلزها شرکت نمی‌کنند.	درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کنید و جملات نادرست به درست تبدیل کنید : (آ) بسیاری از فلزهای واسطه مانند فلزهای اصلی می‌توانند با بیش از یک نوع کاتیون، در تشکیل ترکیب‌های یونی شرکت کنند. ب) عنصرهای شبه فلزی در خواص شیمیایی مشابه نافلزها هستند و در تشکیل ترکیب‌های یونی با فلزها شرکت می‌کنند.	۳۵
۱	(آ) چون الکترون‌های ظرفیتی عنصرهای گروه‌های ۳ و ۱۳ - ۴ و ۱۴ - ۵ و ۱۵ - ۶ و ۱۶ - ۷ و ۱۷ - ۸ و ۱۸ با هم برابر هستند. ب) چون در یک دوره فعالیت شیمیایی هالوژن‌ها از سایر نافلزهای دیگر بیشتر است.	برای جملات درست زیر دلیل بنویسید : (آ) شمار الکترون‌های ظرفیتی عناصر گروه‌های مختلف، می‌تواند برابر باشد. ب) اگر فعالیت شیمیایی نافلز Y بیشتر از هالوژن D باشد، این دو عنصر در یک دوره جای ندارند.	۳۶
۰/۵	لایه ظرفیت عنصرهای این گروه به صورت $ns^2 np^2$ است. باید برای جواب از عناصر گروه ۱۴ انتخاب کنیم. (آ) C یا Si ب) Si	عنصرهای این گروه دو الکترون با عدد کوانتومی $l = 1$ در لایه ظرفیت خود دارند. در پاسخ به سؤالات زیر یکی از عناصر گروه را نام ببرید. (آ) در واکنش با سایر اتم‌ها ، الکترون به اشتراک می‌گذارد. ب) رسانای خوب برق نیست.	۳۷


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	آ) سیلیسیم یا ژرمانیم ب) کربن پ) سیلیسیم یا ژرمانیم ت) نافلزها	با توجه به عنصرهای گروه چهاردهم به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. آ) عنصری غیر فلز نام ببرید که رسانایی گرمایی داشته باشد. ب) عنصری نافلز نام ببرید که یکی از دگرشکل‌های آن رسانایی الکتریکی داشته باشد. پ) عنصری نام ببرید که الکترون به اشتراک می‌گذارد ولی نافلز نباشد. ت) خواص شیمیایی شبه فلزها به کدام دسته از عناصر شبیه است؟	۳۸																									
۱/۷۵	آ) B ب) B - زیرا در یک دوره از چپ به راست خصلت نافلزی افزایش می‌یابد. پ) A - زیرا در یک دوره از چپ به راست از گروه ۱ به ۲ واکنش‌پذیری کم می‌شود. ت) D - خصلت فلزی در یک دوره از چپ به راست کاهش و در یک گروه از بالا به پایین افزایش می‌یابد. بیشترین خصلت فلزی متعلق به گروه یک است.	باتوجه به جدول زیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: <table><tr><th>گروه \ دوره</th><th>۱</th><th>۲</th><th>۱۶</th><th>۱۷</th></tr><tr><th>n = ۲</th><td></td><td></td><td>C</td><td>B</td></tr><tr><th>n = ۳</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>n = ۴</th><td>A</td><td>E</td><td></td><td></td></tr><tr><th>n = ۵</th><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> آ) کمترین شعاع اتمی مربوط به کدام عنصر است؟ ب) خصوصیات نافلزی C بیشتر است یا B ؟ چرا؟ پ) واکنش پذیری کدام یک بیشتر است A یا E ؟ چرا؟ ت) فعال ترین فلز کدام است؟ چرا؟	گروه \ دوره	۱	۲	۱۶	۱۷	n = ۲			C	B	n = ۳					n = ۴	A	E			n = ۵	D				۳۹
گروه \ دوره	۱	۲	۱۶	۱۷																								
n = ۲			C	B																								
n = ۳																												
n = ۴	A	E																										
n = ۵	D																											
۰/۷۵	آ) گوگرد ب) فسفر پ) کلر	بر اساس ویژگی‌های ذکر شده نام عنصر مورد نظر را انتخاب کنید. (کلر / فسفر / گوگرد) آ) عنصری جامد و زرد رنگ که در اثر ضربه خورد می‌شود. ب) به دو رنگ قرمز و سفید یافت می‌شود. پ) گازی زرد رنگ که الکترون به اشتراک می‌گذارد.	۴۰																									

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۰/۷۵	از راست به چپ : قلع یا سرب / کربن / سیلیسیم یا ژرمانیم	با توجه به عناصر گروه ۱۴ نام یک عنصر را در هر جای خالی بنویسید. <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td>خواص فیزیکی و شیمیایی</td></tr> <tr> <td>ندارد</td><td>ندارد</td><td>دارد</td><td>چکش خواری</td></tr> <tr> <td>دارد</td><td>ندارد</td><td>دارد</td><td>رسانایی گرمایی</td></tr> <tr> <td>دارد</td><td>دارد</td><td>دارد</td><td>رسانایی الکتریکی</td></tr> <tr> <td>دارد</td><td>دارد</td><td>ندارد</td><td>اشتراک الکترون</td></tr> </table>				خواص فیزیکی و شیمیایی	ندارد	ندارد	دارد	چکش خواری	دارد	ندارد	دارد	رسانایی گرمایی	دارد	دارد	دارد	رسانایی الکتریکی	دارد	دارد	ندارد	اشتراک الکترون	۴۱
			خواص فیزیکی و شیمیایی																				
ندارد	ندارد	دارد	چکش خواری																				
دارد	ندارد	دارد	رسانایی گرمایی																				
دارد	دارد	دارد	رسانایی الکتریکی																				
دارد	دارد	ندارد	اشتراک الکترون																				
۰/۷۵	از راست به چپ : استحکام / شکل پذیری / رسانایی الکتریکی	هر یک شکل های زیر کدام ویژگی کاربردی فلزها را بیان می کند؟ (رسانایی الکتریکی - رسانایی گرمایی - سطح صیقلی - شکل پذیری - استحکام)   	۴۲																				
۱/۵	آ) ۷ زیرا خصلت نافلزی در یک گروه از بالا به پایین کم و در یک دوره از چپ به راست زیاد می شود. ب) ۱۹E زیرا خصلت فلزی در یک دوره از چپ به راست کم و در یک گروه از بالا به پایین خصلت فلزی زیاد می شود.	باتوجه به عناصر داده شده پاسخ دهید: آ) کدام یک از عنصرهای زیر خصلت نافلزی بیشتری دارد؟ چرا؟ ^{۱۶}Z ^{۸}Y ^{۶}X ب) کدام یک از عنصرهای زیر تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون و تشکیل کاتیون دارند؟ چرا؟ ^{۱۱}M ^{۱۲}A ^{۱۹}E	۴۳																				

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴


۰.۲۵	گزینه ۲ درست - درست - نادرست - نادرست - نادرست	در میان موارد زیر چند مورد ، عبارت زیر را به درستی پر می کنند؟ (..... عنصر گروه ۱۴ ، است.) (آ) سومین - دارای خاصیت شبه فلزی (ب) پنجمین - یک فلز (پ) چهارمین - متعلق به دوره چهارم جدول دوره‌ای عناصرها (ت) دومین - دارای سطح تیره (ث) نخستین - در واکنش با اتم‌های دیگر ، متمایل به گرفتن الکترون ۴ (۴) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)	۴۴
۰.۲۵	گزینه ۴	در میان ویژگی‌های زیر، نمودار داده شده مربوط به تغییر <u>تقریبی</u> چند ویژگی در عنصرهای گروه ۱۴ می تواند باشد؟  (شکل پذیری - تمایل به از دست دادن الکترون - خاصیت فلزی - شکنندگی) ۴ (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴)	۴۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۰.۲۵	گزینه ۱	کدام نمودار، بیانگر تغییر تقریبی واکنش پذیری عنصرهای دوره سوم جدول دوره‌ای (به جز آرگون) است؟ (۱) (۲) (۳) (۴)	۴۶															
۰.۲۵	گزینه ۲	با توجه به جدول زیر ، ویژگی ذکر شده در ردیف از ستون با عدد اتمی ذکر شده در ردیف از ستون مطابقت دارد . <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>I</th> <th>II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>رسانایی الکتریکی دارد، اما رسانایی گرمایی ندارد.</td> <td>۳۲</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>سطح درخشان دارد.</td> <td>۱۶</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>فعال ترین نافلز در دوره خود است.</td> <td>۵۳</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>در واکنش با دیگر اتم‌ها، تمایل به دادن الکترون دارد.</td> <td>۱۲</td> </tr> </tbody> </table> (۱) $II - ۴ - I$ (۲) $II - ۱ - I$ (۳) $I - ۳ - II$ (۴) $II - ۳ - I$		I	II	۱	رسانایی الکتریکی دارد، اما رسانایی گرمایی ندارد.	۳۲	۲	سطح درخشان دارد.	۱۶	۳	فعال ترین نافلز در دوره خود است.	۵۳	۴	در واکنش با دیگر اتم‌ها، تمایل به دادن الکترون دارد.	۱۲	۴۷
	I	II																
۱	رسانایی الکتریکی دارد، اما رسانایی گرمایی ندارد.	۳۲																
۲	سطح درخشان دارد.	۱۶																
۳	فعال ترین نافلز در دوره خود است.	۵۳																
۴	در واکنش با دیگر اتم‌ها، تمایل به دادن الکترون دارد.	۱۲																

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۷۵	در هر مورد واژه مناسب را انتخاب کنید. (آ) قوی ترین (فلز/نافلز) در سمت راست و بالای جدول قرار دارد. (ب) در گروه ۱۴ جدول دوره ای (یک/دو) شبه فلز وجود دارد و در گروه های ۱۵، ۱۶ و ۱۷، عنصرهای (بالا تر/پایین تر) خصلت نافلزی بیش تری دارند. (پ) با گسترش (فناوری/دانش تجربی) شیمی دان ها به رابطه بین (خواص مواد/مواد مناسب) با عنصرهای سازنده آنها پی بردند. (ت) عنصر سیلیسیم مشابه نافلزها (درخشان/شکننده) است و عنصر گوگرد یک (فلز/نافلز) است.	۴۸
۱/۲۵	هریک از تصاویر داده شده ، کدام ویژگی فلزها را نشان می دهد ؟  پ ب آ	۴۹
۱	چنانچه بدانیم اتم عنصر A دارای ۱۴ الکترون با $I=1$ است کدام عبارت ها ی زیر درست و کدام نادرست است . (آ) رسانای الکتریکی کمی دارد . (ب) تشابه خواص آن با عنصر بالای جدول دوره ای بیشتر از عنصر زیرین خود است . (پ) سطح براق و صیقلی دارد . (ت) در واکنش با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود می رسد .	۵۰

۱	با توجه به نمودار ستونی زیر که برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد رادر جهان نشان می دهد ، کدام یک از جمله های زیر نادرست است ؟ برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی از مواد  آ) نادرست ب) نادرست پ) درست ت) نادرست	۵۱ آ) باگذشت زمان ذخایر زمین رو به افزایش است . ب) بیشترین مصرف ذخایرزمین مربوط به سوخت های فسیلی است. پ) زمین منبع عظیمی ازهدایای ارزشمند و ضروری برای زندگی دارد. ت) تقاضای جهانی برای استفاده از ذخایر فلزی روندی ثابت دارد .
۱	آ) فلزها – نافلز ها ب) متفاوت پ) نیمه رسانا ها	۵۲ کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید . آ) خواص فیزیکی سیلیسیم بیشتر به (فلز ها / نافلز ها) بوده و خواص شیمیایی آن بیشتر به (فلز ها / نافلز ها) است . ب) آرایش الکترونی لایه ظرفیت هلیوم با دیگر گاز های نجیب (یکسان / متفاوت) است . پ) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام (رسانا ها / نیمه رسانا ها) ساخته می شوند .

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	الف) B^{2+} و W^{2-} ب) $C < A < B$ پ) $Y < X < W$	با توجه به جدول داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید . <table><tr><th>گروه \ دوره</th><th>۱۳</th><th>۱۴</th><th>۱۵</th><th>۱۶</th></tr><tr><th>۳</th><td>A</td><td>C</td><td>X</td><td>W</td></tr><tr><th>۴</th><td>B</td><td>D</td><td>Y</td><td>Z</td></tr></table> آ) نماد شیمیایی یون پایدار اتم های W و B را بنویسید . ب) خصلت فلزی A, B, C را مقایسه کنید پ) خصلت نافلزی X, Y, W را مقایسه نمایید .	گروه \ دوره	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۳	A	C	X	W	۴	B	D	Y	Z	۵۳
گروه \ دوره	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶														
۳	A	C	X	W														
۴	B	D	Y	Z														
۱	آ) بله – زیرا منابعی که از زمین استخراج می شود، بعد از مدتی دوباره به زمین بازگردانده می شوند. ب) زیرا از زمانی که منابع فلزی استخراج می شوند و تا ساخت فلز و استفاده از قطعه فلزی، زمان بسیار زیادی می گذرد تا دوباره به زمین برگردانده شوند.	به موارد زیر پاسخ دهید: آ) آیا به تقریب جرم کل مواد در کره زمین ثابت می ماند؟ چرا؟ ب) چرا فلزات جزو منابع تجدیدناپذیر محسوب می شوند؟	۵۴															
۱	آ) فلزها ب) گروه پ) کم ت) نافلزها	جمله های زیر را با واژه های مناسب کامل کنید تا جمله مفهوم علمی درستی داشته باشد. آ) بیشترین عناصر جدول دوره ای را تشکیل می دهند. ب) جدول دوره ای شامل هجده است. پ) در یک گروه از بالا به پایین خاصیت نافلزی می شود. ت) بیشتر در سمت راست و بالای جدول دوره ای قرار دارند.	۵۵															
۱	آ) نادرست. گاهی به بهبود خواص مواد منجر می شود. ب) نادرست. مدیون شناخت و دسترسی به فولاد است. پ) درست.	درستی و یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرستی جمله نادرست را بنویسید. آ) شیمی دان ها دریافته اند که در اکثر موارد گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر باعث بهبود خواص آن ها می شود. ب) پیشرفت و گسترش صنایع خودرو مدیون شناخت و دسترسی به صنایع الکترونیک است. پ) پیش بینی می شود که در سال ۲۰۳۰ میزان تولید و مصرف مواد معدنی از فلزها بیشتر باشد.	۵۶															

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۵۷	به موارد زیر پاسخ دهید: آ) آیا جمله «همه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین به دست می آیند.» درست است؟ توضیح دهید. ب) مقایسه میزان تولید و مصرف نسبی سوخت های فسیلی، مواد معدنی و فلزها در جهان چگونه است؟	آ) بله - بعضی از مواد به طور مستقیم از کره زمین به دست می آیند، مانند برخی فلزات، الماس، نفت و ... و برخی نیز به طور غیرمستقیم از مواد طبیعی ساخته می شوند که از زمین به دست می آیند، مانند شیشه یا پلاستیک ب) مواد معدنی < سوخت فسیلی < فلزها
۵۸	به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید: آ) پیشرفت صنایع الکترونیک براساس شناخت چه موادی است؟ ب) فلزات جزو منابع تجدیدپذیر هستند یا تجدیدناپذیر؟ پ) میزان تولید و مصرف مواد معدنی بیشتر است یا سوخت های فسیلی؟ ت) دلیل پیدایش تجارت جهانی چیست؟	آ) استفاده و ساخت نیمه رساناها ب) تجدیدناپذیر پ) مواد معدنی ت) پراکندگی منابع طبیعی
۵۹	با توجه به شکل داده شده به سوالات پاسخ دهید. آ) برای تولید لاستیک این چرخ از کدام منبع زمین استفاده شده است؟ ب) پس از گذشت چندین سال چه اتفاقی برای این چرخ می افتد؟ پ) تولید کدام بخش تایر خودرو آلاینده گی بیشتری برای محیط زیست خواهد داشت؟	 آ) مواد نفتی (نفت خام) ب) فرسوده می شوند که در نهایت ممکن است به زباله تبدیل شده یا بازیافت شوند. پ) لاستیک
۶۰	مقایسه کنید. آ) خصلت نافلزی ^{15}P ، ^{14}N ب) تمایل به از دست دادن الکترون ^{50}Sn ، ^{32}Ge پ) شکنندگی ^{12}Mg ، ^{6}C ت) واکنش با اکسیژن ^{20}Ca ، ^{12}Mg	آ) خصلت نافلزی ^{14}N، بیشتر است. ب) تمایل به از دست دادن الکترون ^{50}Sn بیشتر است پ) ^{6}C، شکننده تر است. ت) واکنش پذیری ^{20}Ca با اکسیژن بیشتر است.

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۵/۰	گروه مورد نظر سوال گروه ۱۴ جدول تناوبی بوده که با توجه به شکل کتاب درسی دارای ۱ عنصر نافلز، ۲ عنصر شبه فلزی و ۲ عنصر فلزی می باشد. با توجه به اطلاعات موجود در صفحه ۷ کتاب درسی تنها گزینه درست گزینه "پ" می باشد.	کدام عبارت در رابطه با گروهی از جدول تناوبی که ۴۰ درصد عناصر طبیعی آن فلز، ۲۰ درصد نافلز و ۴۰ درصد شبه فلز می باشد ، صحیح است؟ (آ) سومین عضو این گروه رسانایی الکتریکی بالایی دارد. (ب) آخرین عضو این گروه در دسته d قرار دارد. (پ) اولین عضو این گروه دارای سطحی تیره است. (ت) این گروه شامل ۳ عنصر فلزی طبیعی است.
-----	---	---

استان مرکزی - صفحات ۱۰ تا ۲۲													
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره										
۶۲	با توجه به داده‌های جدول زیر (بدون ذکر دلیل): <table><tr><td>یون</td><td>A^{۲-}</td><td>B^{۲+}</td><td>C^{۳+}</td><td>D</td></tr><tr><td>زیرلایه آخر</td><td>۳p^۶</td><td>۲p^۶</td><td>۳p^۶</td><td>۲p^۶</td></tr></table> (آ) شعاع اتمی A و B را با هم مقایسه کنید (ب) واکنش‌پذیری اتم‌های A و D را با یکدیگر مقایسه کنید. (پ) اتم عنصر کدام یک جز دسته d است؟	یون	A ^{۲-}	B ^{۲+}	C ^{۳+}	D	زیرلایه آخر	۳p ^۶	۲p ^۶	۳p ^۶	۲p ^۶	(آ) A < B (ب) D < A (پ) C	۰/۷۵
یون	A ^{۲-}	B ^{۲+}	C ^{۳+}	D									
زیرلایه آخر	۳p ^۶	۲p ^۶	۳p ^۶	۲p ^۶									
۶۳	با توجه به متن نوشته شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. "جلای نقره‌ای فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت از بین می‌رود. در معماری اسلامی با ورقه نازکی از طلا گنبد و گلدسته شماری از اماکن مقدس را تزیین می‌کنند. آهن پس از مدت طولانی زنگ می‌زند." (آ) تأمین شرایط نگهداری کدام فلز دشوارتر است؟ (ب) کدام واکنش انجام‌پذیر است؟ چرا؟ (۱) FeO (s) + ۲ Na (s) → Na_۲O (s) + Fe (s) (۲) ۳FeO (s) + ۲Au (s) → Au_۲O_۳ (s) + ۲Fe (s)	(آ) سدیم (ب) واکنش ۱ - چون واکنش‌پذیری سدیم بیشتر از آهن است.	۰/۷۵										
۶۴	اتم‌های زیر را به ترتیب افزایش شعاع اتمی مرتب کنید. As , Se , S , O	با توجه به آنکه در یک گروه از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش می‌یابد پس ترتیب افزایش شعاع اتم‌های هم گروه به صورت Se>S>O خواهد بود. و چون آرسنیک هم دوره سلنیم است، شعاع آن بزرگ‌تر از گوگرد و چون در گروه ۱۵ قرار گرفته و قبل از سلنیم است شعاع آن از سلنیم نیز بزرگتر است. بنابراین ترتیب افزایش شعاع اتمی به صورت As > Se >S>O است.	۱										

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱/۷۵	آ فلزی (ب) اسکاندیم - تلوزیون (پ) فلزور Fr - کلر Cl_2 (ت) کم تر - کم تر	جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید. (برخی کلمات اضافی است). کمتر - بیشتر - اسکاندیم - استرانسیم - فلزی - نافلزی - تلوزیون - کلر - برم - ید - فلزور - کمتر آ) در دوره ی سوم جدول تناوبی شیب تغییرات شعاع اتمی در عناصر بیشتر است. ب) نخستین فلز واسطه در جدول دوره ای است که در وسایل خانه مانند و برخی شیشه ها وجود دارد . پ) در میان هالوژنهای دوره ی دوم تا پنجم جدول دوره ای عناصر و در دمای اتاق ، با گاز هیدروژن واکنش می دهند. ت) در واکنش شیمیایی فلز آهن با محلول مس (II) سولفات مقدار واکنش پذیری فراورده های تولید شده از واکنش دهنده ها است و پایداری واکنش دهنده ها از فراورده ها است.	۶۵
۲	آ) سدیم < آلومینیم > گوگرد (در یک دوره هستند و شعاع از چپ به راست شعاع کاهش می یابد) ب) برم > کلر > فلزور (در یک گروه خاصیت نافلزی از بالا به پایین کم می شود) پ) گوگرد > ژرمانیم > قلع (فلزها از شبه فلزها و شبه فلزها از نافلزها رسانایی الکتریکی بیشتری دارند) ت) $\text{K} > \text{Na} > \text{Li}$ (K) بنفش Na زرد Li قرمز)، با کاهش واکنش پذیری فلز شدت نور تولید شده کمتر می شود.	دانش آموزی مقایسه های زیر را نادرست انجام داده است . مقایسه ی صحیح را شما انجام داده و بازنویسی نمایید. آ) شعاع اتمی : آلومینیم > سدیم > گوگرد ب) واکنش پذیری: فلزور < برم < کلر پ) رسانایی الکتریکی : گوگرد < قلع < ژرمانیم ت) شدت نور تولید شده طی واکنش: لیتیم > پتاسیم > سدیم	۶۶
۱/۵	آ) درست، واکنش پذیری پتاسیم از روی بیشتر است . ب) درست ، عناصر هم دوره و با عدد اتمی کوچکتر همگی فلز هستند. پ) نادرست ، می تواند نافلز یا شبه فلز باشد .	درستی یا نادرستی عبارت های زیر رامشخص نمایید و در صورت نادرست بودن دلیل آن را بیان نمایید.	۶۷

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	(ت) نادرست ، ممکن است دو نافلز در یک دوره باشند.	(آ) اگر واکنش فلز روی با اکسید فلز X انجام پذیر باشد واکنش فلز پتاسیم با اکسید فلز X نیز به یقین انجام پذیر است . (ب) اگر عنصر X شبه فلز باشد عنصرهای هم دوره و با عدد اتمی کوچکتر از عدد اتمی آن خواص فیزیکی فلزات را دارند. (پ) در عناصر دسته p ، همه ی عنصرهای هم دوره با یک عنصر فلزی ، دارای شعاع اتمی کوچکتر از آن به یقین نافلز هستند. (ت) اگر فعالیت شیمیایی نافلز M بیش از فعالیت شیمیایی نافلز X باشد عدد اتمی M از عدد اتمی X کوچکتر است .	
۱/۵	(آ) چون فلز X با دادن الکترون به کاتیون Y^{n+} باعث آزاد شدن آن می شود پس تمایل به از دست دادن الکترون در X بیشتر از Y است یعنی فعالیت شیمیایی یا واکنش پذیری X بیشتر از Y است . (ب) عناصری که از مس و روی و ۶ عنصر دسته ی P تناوب چهارم همگی دارای زیر لایه $3d^{10}$ هستند . (پ) چون واکنش پذیری آهن (Fe) بیشتر از نقره (Ag) است و فلز آهن به یون نقره الکترون می دهد و واکنش انجام می شود.	برای هریک از موارد زیر دلیل بنویسید : (آ) هر گاه واکنش $X + Y^{n+} \rightarrow \dots\dots\dots$ انجام پذیر باشد می توان نتیجه گرفت واکنش پذیری فلز X از فلز Y بیشتر است . (ب) در میان عناصر دوره ی چهارم جدول ۸ عنصر در زیر لایه $3d$ خود ۱۰ الکترون دارند (پ) محلولی از نقره نیترات را نمی توان در ظرفی از جنس فلز آهن نگه داری کرد.	۶۸
۲/۲۵	(آ) $D:Fe$ $A:HCl$ $B:Fe(OH)_2$ (ب) هدف واکنش (۲) شناسایی کاتیون آهن (III) و هدف واکنش (۳) استخراج آهن (Fe) می باشد. (پ) کربن نسبت به سدیم فراوانتر، ارزانتر و کم خطر تر می باشد. (ت) رنگ محلول آهن (III) کلرید زرد رنگ و رنگ رسوب B قرمز قهوه ای می باشد .	با توجه به واکنش های زیر به سوالات پاسخ دهید : ۱) $Fe_2O_3(s) + A(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2O(l)$ ۲) $FeCl_2(aq) + NaOH(aq) \rightarrow B(s) + NaCl(aq)$ ۳) $Fe_2O_3(s) + C(s) \rightarrow D(s) + 2CO_2(g)$ (آ) به جای موارد A و B و D فرمول شیمیایی ماده ی مورد نظر را بنویسید. (ب) هدف از انجام واکنش (۲) و (۳) را بنویسید.	۶۹

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

		پ) چرا در واکنش (۳) به جای واکنش دهنده ی کربن (C) از فلز سدیم استفاده نمی شود؟ دو دلیل بنویسید . ت) رنگ محلول آهن (III) کلرید و رنگ رسوب B را بنویسید .
--	--	--

استان مازندران - صفحات ۱۰ تا ۲۲			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۷۰	چنانچه عنصر A هم گروه با Mg ۱۲ و هم تناوب با As ۳۳ باشد و عنصر B با از دست دادن سه الکترون به آرایش پایدار سومین گاز نجیب برسد، واکنش پذیری دو عنصر A و B را با هم مقایسه کنید. دلیل پاسخ خود را بنویسید.	عنصر A در گروه ۲ و دوره ۴ جدول دوره‌ای قرار دارد. این عنصر دو خانه پس از گاز نجیب آرگون Ar ۱۸ قرار داشته و در نتیجه عدد اتمی آن ۲۰ است. از سوی دیگر سومین گاز نجیب نیز همان آرگون با عدد اتمی ۱۸ است، پس عنصر B در گروه ۳ بوده و عدد اتمی آن ۲۱ است و دو عنصر همدوره هستند. از آن جایی که در یک دوره واکنش پذیری فلز اصلی از فلز واسطه بیشتر است، بنابراین عنصر B نسبت به عنصر A واکنش-پذیری کمتری دارد.	۱
۷۱	با توجه به موقعیت عناصر در جدول دوره‌ای: هرگاه شعاع اتمی سدیم (Na ۱۱) و آلومینیم (Al ۱۳) بدون در نظر گرفتن ترتیب، برابر یکی از اعداد ۱۸۳ و ۱۴۴ بر حسب پیکومتر باشد، شعاع اتمی منیزیم (Mg ۱۲) کدام یک از مقادیر داده شده است؟ (۱۰۱، ۱۶۰ و ۱۱۹ بر حسب پیکومتر). دلیل پاسخ خود را بنویسید.	۱۶۰ پیکومتر، این سه عنصر همدوره اند و در یک دوره با افزایش عدد اتمی شعاع اتمی عنصرها از چپ به راست کاهش می‌یابد. بنابراین شعاع اتمی منیزیم عددی بین ۱۸۳ و ۱۴۴ یعنی ۱۶۰ پیکومتر خواهد بود.	۰/۷۵
۷۲	باتوجه به نمودار زیر، پاسخ دهید: 	آ دوره (ب) هر چه شعاع اتمی کوچک‌تر باشد نافلزها تمایل بیشتری به گرفتن الکترون یا به اشتراک گذاشتن آن دارند و خصلت نافلزی بیشتر است. (پ) سدیم، هر چه شعاع اتمی برای یک فلز بزرگتر باشد، آسان‌تر الکترون از دست داده و تبدیل به کاتیون می‌شود.	۱/۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

		آ) این شکل روند تغییرات شعاع اتمی را در یک دوره نشان می دهد یا در یک گروه؟ ب) چه ارتباطی بین خصلت نافلزی و شعاع اتمی در یک دوره وجود دارد؟ توضیح دهید. پ) کدام عنصر آسان تر به کاتیون تبدیل می شود ؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید.																					
۱/۷۵	آ) B^{2+}, W^{3-} ب) خصلت نافلزی: $Y < X < W$ پ) خصلت فلزی: $A < B$ ت) کمترین شعاع اتمی: W و بیشترین شعاع اتمی: B	با توجه به جدول داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید. آ) نماد شیمیایی یون پایدار اتم های W و B را بنویسید. ب) خصلت نافلزی X, W, Y را با هم مقایسه نمایید. پ) خصلت فلزی A و B را با هم مقایسه نمایید. ت) کدام اتم ها کمترین و بیشترین شعاع اتمی را دارند؟ <table><tr><th>→گروه</th><th>۱۳</th><th>۱۴</th><th>۱۵</th><th>۱۶</th></tr><tr><th>↓دوره</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>۲</td><td>A</td><td>C</td><td>X</td><td>W</td></tr><tr><td>۳</td><td>B</td><td>D</td><td>Y</td><td>Z</td></tr></table>	→گروه	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	↓دوره					۲	A	C	X	W	۳	B	D	Y	Z	۷۳
→گروه	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶																			
↓دوره																							
۲	A	C	X	W																			
۳	B	D	Y	Z																			
۱/۷۵	آ) واکنش b درجوشکاری خطوط راه آهن کاربرد دارد. ب) $Al>Fe>Ag>Pt$ پ) پلاتین- چون در اغلب واکنش ها شرکت نمی کند و در حقیقت واکنش نا پذیر است.	با توجه به واکنش های موازنه نشده زیر، به پرسش ها پاسخ دهید: <table><tr><td>a) $Al + AgNO_3 \rightarrow Ag + Al(NO_3)_3$</td><td>b) $Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + Fe$</td></tr><tr><td>c) $Fe + AgNO_3 \rightarrow Ag + Fe(NO_3)_2$</td><td>d) $Pt + AgNO_3 \rightarrow \times$</td></tr></table> آ) کدام واکنش به واکنش ترمیت معروف است؟ کاربرد آن را بنویسید. ب) واکنش پذیری Al, Fe, Ag و Pt را با هم مقایسه کنید. پ) تامین شرایط نگهداری کدام یک از فلزهای بالا آسان تر است؟ چرا؟	a) $Al + AgNO_3 \rightarrow Ag + Al(NO_3)_3$	b) $Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + Fe$	c) $Fe + AgNO_3 \rightarrow Ag + Fe(NO_3)_2$	d) $Pt + AgNO_3 \rightarrow \times$	۷۴																
a) $Al + AgNO_3 \rightarrow Ag + Al(NO_3)_3$	b) $Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + Fe$																						
c) $Fe + AgNO_3 \rightarrow Ag + Fe(NO_3)_2$	d) $Pt + AgNO_3 \rightarrow \times$																						

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱/۲۵	(آ) $A: 1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^6 3d^6, 4s^2$ عدداً اتمی عنصر ۲۶ است. (ب) فعالیت شیمیایی این عنصر کمتر از فعالیت شیمیایی ^{11}Na است چون تمایل به از دست دادن الکترون (خصلت فلزی) آن کمتر است.	عنصر A در دوره چهارم قرار دارد. شمار الکترون های با عدد کوانتومی فرعی $l=1$ لایه سوم با شمار الکترون های با عدد کوانتومی فرعی $l=2$ همان لایه باهم برابر است : (آ) با رسم آرایش الکترونی ، عدد اتمی A را مشخص کنید. (ب) با بیان علت فعالیت شیمیایی این عنصر را با ^{11}Na مقایسه کنید.	۷۵																					
۰/۷۵	(آ) A (ب) F (پ) I	با توجه به جدول زیر به سؤالات پاسخ دهید. <table><tr><th>گروه \ دوره</th><th>۱</th><th>۲</th><th>۱۳</th><th>۱۴</th><th>۱۵</th><th>۱۶</th></tr><tr><th>۳</th><td></td><td></td><td>C</td><td></td><td>G</td><td>I</td></tr><tr><th>۴</th><td>A</td><td>B</td><td>D</td><td>F</td><td>H</td><td></td></tr></table> (آ) واکنش پذیرترین فلز کدام است؟ (ب) کدام عنصر رسانایی کمی دارد و شکننده است؟ (پ) بیرونی ترین زیرلایه اشغال شده از الکترون در اتم کدام عنصر ۴ الکترون دارد ؟	گروه \ دوره	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۳			C		G	I	۴	A	B	D	F	H		۷۶
گروه \ دوره	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶																		
۳			C		G	I																		
۴	A	B	D	F	H																			
۱/۲۵	(آ) $n=3, l=2$ (ب) $Z=29$ (پ) دوره چهارم – گروه یازدهم	آرایش الکترونی یون M^+ به $3d^{10}$ ختم می شود. (آ) چنانچه یون مورد نظر یک الکترون از دست بدهد ، عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون مورد نظر را بنویسید. (ب) عدد اتمی عنصر M را بنویسید. (پ) عنصر M به کدام گروه و دوره ی جدول دوره ای عناصر تعلق دارد؟	۷۷																					
۱/۵	(آ) شعاع اتمی $B > D > A > C$ (ب) واکنش پذیری $A > C$ (پ) D ، زیرا با گرفتن یک الکترون به آرایش گاز پایدار هم دوره خود می رسد.	چهار عنصر A ، B ، C و D را در نظر بگیرید و به پرسش ها پاسخ دهید. (آ) عنصرها را به ترتیب افزایش شعاع اتمی مرتب کنید. (ب) واکنش پذیری A و C را مقایسه کنید. (پ) کدام عنصر تمایل به تشکیل آنیون یک بار منفی دارد؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید.	۷۸																					

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۱	۳۰. Zn^{2+}: $[Ar] 3d^{10}$ فلز Zn (دسته d) هنگام تشکیل کاتیون الکترون های بیرونی ترین زیرلایه خود را از دست می دهد (۴s). اشتباه اول : در اینجا دانش آموز ابتدا از زیرلایه ۳d الکترون برداشته است. در رسم آرایش الکترونی فشرده ، آرایش گاز نجیب یک دوره قبل نوشته می شود. اشتباه دوم : در اینجا دانش آموز به جای Ar از Ne استفاده نموده است.	دانش آموزی آرایش الکترونی فشرده ی یون Zn^{2+} را به صورت زیر رسم کرد : $[Ne] 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$ آیا آرایش الکترونی رسم شده درست است ؟ در صورت پاسخ منفی ، با رسم آرایش الکترونی فشرده یون مورد نظر ، موردهای نادرست را مشخص نمایید.	۷۹
---	---	--	----

استان لرستان - صفحات ۱۰ تا ۲۲																					
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره																		
۸۰	درست یا نادرست بودن موارد زیر را مشخص کنید و برای نادرست بودن موارد دلیل بیاورید. (آ) هرچه شعاع اتمی بیشتر باشد واکنش پذیری عنصر بیشتر است. (ب) مجموع تعداد نافلزهای جامد و شبه فلزهای موجود در دوره سوم از جدول دوره‌ای برابر مجموع تعداد فلزهای موجود در این دوره است.	(آ) نادرست- در عنصرهای فلزی هرچه شعاع اتمی بیشتر باشد از دست دادن الکترون آسان تر و واکنش پذیری فلز بیشتر است اما در نافلزها هر چه شعاع اتمی بیشتر باشد واکنش پذیری نافلز کمتر است. (ب) درست - در دوره سوم، دو نافلز جامد (گوگرد و فسفر) و یک شبه فلز (سیلیسیم) وجود دارد، همچنین در این دوره سه فلز وجود دارد، پس مجموع آنها با یکدیگر برابر است.	۱																		
۸۱	با توجه به جمله «در بین عنصرهای دوره چهارم جدول دوره‌ای که دارای زیرلایه نیمه پر در آرایش الکترونی خود هستند، ...» با سوالات زیر که تکمیل کننده عبارت بالا هستند پاسخ دهید: (آ) چند عنصر مربوط به فلزات دسته d هستند؟ (ب) چند عنصر متعلق به عنصرها دسته اصلی هستند؟ (پ) در بیرونی ترین لایه چند عنصر، حداقل یک زیرلایه کاملاً پر وجود دارد؟	در دوره چهارم جدول تناوبی ۵ عنصر دارای زیرلایه نیمه پر هستند: <table><tr><td>عنصر</td><td>۱۹K</td><td>۲۴Cr</td><td>۲۵Mn</td><td>۲۹Cu</td><td>۳۳As</td></tr><tr><td>آرایش الکترونی</td><td>۴s^۱</td><td>۳d^۵۴s^۱</td><td>۳d^۵۴s^۲</td><td>۳d^{۱۰}۴s^۱</td><td>۴s^۲۴p^۳</td></tr><tr><td>لایه ظرفیت</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (آ) ۳ عنصر (ب) دو عنصر پتاسیم (از دسته s) و As (از دسته p) متعلق به عناصر اصلی هستند. (ت) در لایه ظرفیت دو عنصر Mn و As یک زیرلایه کاملاً پر وجود دارد.	عنصر	۱۹K	۲۴Cr	۲۵Mn	۲۹Cu	۳۳As	آرایش الکترونی	۴s ^۱	۳d ^۵ ۴s ^۱	۳d ^۵ ۴s ^۲	۳d ^{۱۰} ۴s ^۱	۴s ^۲ ۴p ^۳	لایه ظرفیت						۱/۲۵
عنصر	۱۹K	۲۴Cr	۲۵Mn	۲۹Cu	۳۳As																
آرایش الکترونی	۴s ^۱	۳d ^۵ ۴s ^۱	۳d ^۵ ۴s ^۲	۳d ^{۱۰} ۴s ^۱	۴s ^۲ ۴p ^۳																
لایه ظرفیت																					
۸۲	با توجه به واکنش‌های زیر، فعالیت شیمیایی عنصرهای Z، A، T، X را مقایسه کنید. (نمادهای X، A، T، Z فرضی هستند). ۱) XO + T → واکنش نمی‌دهد ۲) AO + T → TO + A ۳) AO + Z → واکنش نمی‌دهد ۴) AO + X → XO + A	واکنش‌های ۲ و ۴ نشان می‌دهند که X و T از A واکنش‌پذیری بیشتری دارند و توانسته‌اند A را از ترکیب خود آزاد کنند. واکنش (۱) نشان می‌دهد T از X واکنش-پذیری کمتری دارد و واکنش انجام نمی‌شود. مطابق واکنش ۳، A از Z واکنش پذیرتر است؛ بنابراین مقایسه فعالیت شیمیایی هر ۴ عنصر به صورت: X>T>A>Z است.	۱/۵																		


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	آ) زرد رنگ است. ب) آهن (II) کلرید : $\text{FeCl}_2(\text{aq})$ پ) در زنگ آهن یون آهن(III) وجود دارد	با توجه به ۲ آزمایش زیر که برای شناسایی یون‌های آهن مطابق کاوش کنید کتاب درسی طراحی شده‌اند، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.  آ) محلول Y چه رنگی است؟ ب) نام و فرمول ماده X چیست؟ پ) در زنگ آهن کدام کاتیون آهن وجود دارد؟	۸۳
۱	آ) فلئونور-واکنش پذیری فلئونور بیشتر است. گاز فلئونور در دمای ۲۰۰- درجه سلسیوس به سرعت با هیدروژن واکنش می دهد پس در دمای اتاق بسیار سریع تر واکنش می - دهد. اما گاز کلر در دمای اتاق به آرامی واکنش می دهد. ب) ید	با توجه به واکنش پذیری عنصرهای گروه ۱۷ جدول دوره‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آ) کدام هالوژن در دمای اتاق به سرعت با گاز هیدروژن واکنش می دهد (کلر یا فلئونور)؟ چرا؟ ب) کدام هالوژن شعاع اتمی بیشتری دارد؟ (برم یا ید)	۸۴
۰/۵	^{25}Mn زیرا عناصر دسته d بوده و کاتیون پایدار آن تنها الکترونهای لایه آخر را از دست می دهد $\text{Mn}: [\text{Ar}]3d^5 4s^2$ $\text{Mn}: [\text{Ar}]3d^5$	کاتیون پایدار کدامیک از عناصر زیر به آرایش گاز نجیب نمی رسد؟ چرا؟ ${}^3\text{Li}, {}^{25}\text{Mn}, {}^{20}\text{Ca}$	۸۵
۱/۲۵	شعاع اتمی عناصر در یک دوره از چپ به راست کاهش می یابد پس شعاع ${}^{13}\text{Al} < {}^{12}\text{Mg}$ و از بالا به پایین افزایش می یابد. ${}^3\text{Li} < {}^{13}\text{Al} < {}^{12}\text{Mg} < {}^{19}\text{K}$	عناصر زیر را با ذکر دلیل بر اساس شعاع اتمی مرتب کنید. ${}^3\text{Li}, {}^{19}\text{K}, {}^{13}\text{Al}, {}^{12}\text{Mg}$	۸۶

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۲۵	در یک دوره هرچه عدد اتمی بیشتر خصلت نافلزی بیشتر پس $_{15}P >_{17}Cl$ و از بالا به پایین با افزایش عدد اتمی خصلت نافلزی کمتر می شود $_{7}N >_{17}Cl >_{15}P >_{35}Br$	بر اساس خصلت نافلزی مرتب کنید. $_{7}N,_{35}Br,_{17}Cl,_{15}P,$	۸۷																		
۰/۵	نادرست. زیرا تنها فلز دسته p آلومینیم $_{13}Al$ می تواند با ازدست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب برسد	درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. شکل درست یا دلیل نادرستی آن را بنویسید. همه فلزهای عناصر دسته p با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب می رسند.	۸۸																		
۱/۷۵	آ درست. شعاع اتمی در یک دوره و از چپ به راست کاهش می یابد به دلیل اینکه با افزایش عدد اتمی تعداد پروتون ها و بار مثبت هسته زیاد می شود در حالی که تعداد لایه ها ثابت است در نتیجه نیروی جاذبه هسته بر الکترون های بیرونی افزایش یافته و الکترون ها با نیروی قوی تری به سمت هسته جذب می شوند. (ب) درست است. (پ) نادرست است زیرا با توجه به آرایش الکترونی گوگرد و سدیم تعداد الکترون ها در آخرین زیر لایه اتم S نسبت به اتم Na ، ۴ برابر است. $Na: 1s^2/2s^22p^6/3s^1$ $S: 1s^2/2s^22p^6/3s^33p^4$ (ت) نادرست است. زیرا ترتیب مقایسه خصلت نافلزی به صورت $(Cl > S > Na)$ صحیح است.	با توجه به عنصرهای P, Na, Cl, S که چهار عنصر از دوره سوم جدول دوره ای است به سوالات زیر پاسخ دهید. (با ذکر دلیل) (آ) آیا مقایسه شعاع اتمی به صورت زیر صحیح است؟ $Na > P > S > Cl$ (ب) فسفر سفید را زیر آب نگهداری می کنند؟ (پ) نسبت تعداد الکترون ها در آخرین زیر لایه عنصر S، ۲ برابر تعداد الکترون ها در آخرین زیر لایه اتم Na می باشد؟ $Na = 11, S = 16$ (ت) ترتیب خصلت نافلزی به صورت $Cl > P > S > Na$ صحیح است؟	۸۹																		
۱/۷۵	آ خصلت فلزی Na از Mg بیشتر است. زیرا در یک دوره از چپ به راست خصلت فلزی کاهش می یابد. (ب) عنصرهای گروه ۱۳ تا ۱۸ (به جز He) به دسته P جدول تناوبی تعلق دارند. و در این جدول عنصرهای دسته P بیشتری وجود دارد. (پ) Na زیرا Na یک فلز است و رسانای الکتریکی دارد اما S یک نافلز و رسانای الکتریکی ندارد.	با توجه به جدول زیر به هر یک از سوالات پاسخ دهید. <table><tr><td>گروه \ دوره</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۱۴</td><td>۱۶</td><td>۱۷</td></tr><tr><td>۲</td><td></td><td></td><td>C</td><td>O</td><td>F</td></tr><tr><td>۳</td><td>Na</td><td>Mg</td><td>Si</td><td>S</td><td>Cl</td></tr></table> (آ) بین دو عنصر Na, Mg کدامیک خصلت فلزی بیشتری دارد؟ چرا؟	گروه \ دوره	۱	۲	۱۴	۱۶	۱۷	۲			C	O	F	۳	Na	Mg	Si	S	Cl	۹۰
گروه \ دوره	۱	۲	۱۴	۱۶	۱۷																
۲			C	O	F																
۳	Na	Mg	Si	S	Cl																

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

		ب) بیشترین عنصرهای نشان داده شده در این جدول به دسته S تعلق دارد یا P؟ چرا؟ پ) رسانایی الکتریکی Na بیشتر است یا S ؟	
۲/۵	آ) از بالا به پایین جرم مولی افزایش می‌یابد و نیز از I_2 در شرایط یکسان جامد و Br_2 نیز حالت مایع دارد و نیروی بین مولکولی در حالت جامد از مایع بیشتر است. ب) Cl_2 پ) از بالا به پایین تعداد لایه‌های الکترونی بیشتر شده و شعاع اتمی افزایش می‌یابد با افزایش شعاع اتمی تمایل اتم نافلز به گرفتن الکترون کمتر شده در نتیجه واکنش پذیری کاهش می‌یابد. ترتیب واکنش پذیری: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$	با توجه به مولکول‌های I_2, Br_2, Cl_2, F_2 به سوالات زیر پاسخ دهید؟ آ) نیروی بین مولکول در I_2 قوی‌تر است یا Br_2 . چرا؟ ب) کدامیک در دمای اتاق به آرامی با گاز H_2 واکنش می‌دهد؟ پ) واکنش پذیری آنها را با یکدیگر مقایسه کنید؟ (با ذکر دلیل)	۹۱
۰/۵	دسترسی به کربن آسانتر است و صرفه اقتصادی بیشتری دارد در صورتی که سدیم بسیار فعال می‌باشد و استخراج آن دشوار می‌باشد.	چرا برای استخراج آهن از کربن به جای سدیم استفاده می‌گردد. (۲ دلیل بیاورید)	۹۲
۰/۷۵	در یک گروه با افزایش عدد اتمی شعاع افزایش می‌یابد 	نمودار روند تغییرات شعاع اتمی عناصر زیر را با ذکر دلیل رسم کنید. $3Li, 19K, 11Na,$	۹۳
۰/۷۵	واکنش (آ) زیرا واکنش‌پذیری Na از Cu بیشتر بوده پس واکنش انجام می‌شود پس فراورده‌ها پایدارترند در حالیکه واکنش ب انجام نمی‌شود	فراورده کدام واکنش زیر از واکنش‌دهنده‌های آن پایدارتر می‌باشد؟ چرا؟ آ) $Na + CuSO_4 \rightarrow$ ب) $Ti + MgSO_4 \rightarrow$	۹۴

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

استان گیلان - صفحات ۲۲ تا ۲۹			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۹۵	در شکل زیر فرایند استخراج یک فلز از طبیعت و بازگشت آن به طبیعت نشان داده شده است با توجه به آن به سوالات پاسخ دهید. آ) اگر در مرحله A سنگ معدن داشته باشیم خوردگی و فرسایش در کدام مرحله انجام می‌گیرد؟ ب) مرحله X را چه می‌نامند؟ پ) تولید یک ماده در راستای توسعه پایدار را در گروی عبور از کدام مرحله می‌دانید؟	آ) بازگشت ب) بازگشت پ) بازگشت	۰/۷۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۹۶	در مورد ارزیابی چرخه عمر کدام درست و کدام نادرست است؟ در صورت نادرست بودن، درست آن را بنویسید. (آ) ارزیابی چرخه عمر ارزیابی میزان تأثیر یک فراورده بر روی محیط زیست در مدت طول عمر آن به کار می‌رود. (ب) در ارزیابی چرخه عمر پاکت کاغذی، حمل و نقل پسماندهای کاغذی سبب آلودگی هوا نمی‌شود. (پ) با بررسی این چرخه برای یک فراورده، میزان آب و انرژی مصرفی، ادامه فرایند براساس تأمین مواد خام و اولیه، میزان زباله و پسماند؛ همچنین هزینه حمل و نقل در هر مرحله بررسی می‌شود.	۱	(آ) درست (ب) نادرست در حمل و نقل پسماندها آلودگی ایجاد می‌شود. (پ) درست
۹۷	پاسخ دهید. (آ) در چرخه عمر دفع پاکت کاغذی و پاکت پلاستیکی، به طور کلی از چه روش‌هایی می‌توان استفاده کرد؟ (ب) در ارزیابی چرخه عمر، پاکت کاغذی و پلاستیکی را از نظر تأثیر تولید ماده خام روی محیط زیست ، مقایسه کنید.	۱/۵	(آ) دفن کردن - سوزاندن - بازیافت (ب) در پاکت کاغذی با بریدن درختان زیستگاه جانداران زیادی تخریب می‌شود. در پاکت پلاستیکی، در استخراج نفت خام انرژی زیادی مصرف می‌شود.
۹۸	۴۶۰ گرم سدیم هیدروکسید ناخالص طبق معادله زیر می‌تواند ۴۹۰ گرم سولفوریک اسید را به طور کامل خنثی کند. درصد خلوص سدیم هیدروکسید را حساب کنید. $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	۱/۵	$? \text{gNaOH} = 490 \cdot \text{gH}_2\text{SO}_4 \times \frac{1 \text{molH}_2\text{SO}_4}{98 \text{gH}_2\text{SO}_4} \times \frac{2 \text{molNaOH}}{1 \text{molH}_2\text{SO}_4}$ $\times \frac{40 \text{gNaOH}}{1 \text{molNaOH}} = 400 \cdot \text{gNaOH}$ $\text{در صد خلوص} = \frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم نمونه ناخالص}} \times 100 = \frac{400 \text{g}}{460 \text{g}} \times 100 = 86/95\%$

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	$?gZnCl_2 = 13gZn \times \frac{1molZn}{65gZn} \times \frac{1molZnCl_2}{1molZn}$ $\times \frac{136gZnCl_2}{1molZnCl_2} = 27 / 2gZnCl_2$ مقدار عملی بازده درصدی واکنش $\rightarrow \frac{\text{مقدار نظری}}{\text{مقدار عملی}} \times 100$ $\frac{27/2}{27/2} \times 100 = 80\%$	اگر از واکنش ۱۳ گرم فلز روی با مقدار کافی گاز کلر مقدار ۲۱/۷۶ گرم روی کلرید به دست آید، بازده درصدی واکنش چقدر است؟ $Zn + Cl_2 \rightarrow ZnCl_2$	۹۹
۱/۵	$?gAl - 128gCu \times \frac{1molCu}{64gCu} \times \frac{2molAl}{3molCu} \times \frac{27gAl}{1molAl} = 36gAl$ جرم ماده خالص - در صد خلوص $= \frac{\text{جرم نمونه ناخالص}}{\text{جرم ماده خالص}} \times 100 = \frac{36g}{50g} \times 100 = 72\%$	دانش آموزی برای تعیین درصد خلوص فویل آلومینیم، تکه‌ای به جرم ۵۰ گرم از آن را در مقدار کافی محلول مس (II) سولفات قرار داده و مس تولید شده را پس از خشک کردن توزین می‌کند. اگر ۱۲۸ گرم مس تولید شود، درصد خلوص فویل را حساب کنید. $2Al(s) + 3CuSO_4(aq) \rightarrow 3Cu(s) + Al_2(SO_4)_3(aq)$ (Cu=۶۴ Fe=۵۶ g.mol⁻¹)	۱۰۰
۱/۲۵	مقدار عملی بازده درصدی $\times 100 = \frac{\text{مقدار نظری}}{\text{مقدار عملی}}$ مقدار نظری $90 = \frac{30molFe}{x} \times 100 \Rightarrow x = 33 / 33molFe$ $?gC = 33 / 33molFe \times \frac{2molC}{4molFe} \times \frac{12gC}{1molC} = 299 / 99gC$	آهن در صنعت طبق واکنش زیر تهیه می‌شود، اگر بازده درصدی واکنش ۹۰ درصد باشد برای تهیه ۳۰mol فلز آهن به چند گرم کربن نیاز است؟ $3C(s) + 2Fe_2O_3(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_2(aq)$	۱۰۱
۱/۷۵	مقدار عملی بازده درصدی $\times 100 = \frac{\text{مقدار نظری}}{\text{مقدار عملی}}$	چند گرم $Al_2(SO_4)_3$ با خلوص ۸۵ درصد اگر بر اثر حرارت بالا تجزیه شود ۲/۵۲ لیتر گاز SO_3 در شرایط استاندارد آزاد می‌شود؟ بازده درصدی واکنش ۸۰ درصد است.	۱۰۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	$\frac{2}{100} \times \frac{2 \times 52 \text{ L SO}_2}{x} \times 100 = x = 3 / 15 \text{ L SO}_2$ $? \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ impure} = 3 / 15 \text{ L SO}_2 \times \frac{1 \text{ mol SO}_2}{22.4 \text{ L SO}_2} \times$ $\frac{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3}{3 \text{ mol SO}_2} \times \frac{342 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ pure}}{1 \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times$ $\frac{100 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ impure}}{88 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ pure}} = 18 / 86 \text{ g Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ impure}$	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 (\text{s}) \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 3 \text{SO}_2 (\text{aq})$	
۱	(آ) کتاب با جلد کاغذی نسبتاً پایدار - کتاب با جلد پلاستیکی ناپایدار (ب) خیر - سبب انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا می‌شوند.	اگر بخواهیم در صنعت دو دسته کتاب چاپ کنیم، یک دسته از کتاب‌ها با جلد کاغذی و یک دسته با جلد پلاستیکی باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید: (آ) پایداری تامین ماده اولیه و خام این دو دسته کتاب به چه صورت است؟ (ب) آیا برای دفع آنها روش سوزاندن را توصیه می‌کنید؟ دلیل بنویسید.	۱۰۳
۱	(آ) طبیعی است (ب) گرماده (پ) مذاب (ت) برای جوشکاری خطوط راه‌آهن استفاده می‌کنند.	در مورد واکنش ترمیت به سوالات زیر پاسخ دهید. $2\text{Al} (\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 2\text{Fe} (\text{l})$ (آ) آیا این واکنش به طور طبیعی انجام می‌شود؟ (ب) واکنش ترمیت گرماگیر است یا گرماده؟ (پ) آهن تولید شده در این واکنش جامد است یا مذاب؟ (ت) یکی از مهمترین کاربردهای آهن تولید شده در این واکنش را بنویسید؟	۱۰۴

استان گلستان - صفحات ۲۲ تا ۲۹			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱۰۵	درستی یا نادرستی هر عبارت را بنویسید و عبارت نادرست را تصحیح کنید. (آ) یکی از راه‌های تهیه سوخت سبز، استفاده از بقایای گیاهان است که واکنش هوازی تخمیر گلوکز، در این فرایند رخ می‌دهد. (ب) بستر اقیانوس‌ها منبعی غنی از سولفید چندین فلز اصلی مانند منگنز ، کبالت و ... است. (پ) واکنش‌های شیمیایی همیشه مطابق آنچه انتظار می‌رود، پیش نمی‌روند. (ت) Al_2O_3 به عنوان رنگ قرمز در نقاشی به کار می‌رود. (ث) بر اساس توسعه پایدار باید در تولید یک فراورده فقط هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن در نظر گرفته شود. (ج) در واکنش ترمیت برای استخراج آهن ، از کربن استفاده می‌شود. (چ) در یک تن کانه هماتیت ۷۵۰ کیلوگرم فلز آهن وجود دارد. (ح) از واکنش تخمیر بی هوازی گلوکز، گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود. (خ) از آهن(III) اکسید در تولید رنگ قرمز نقاشی استفاده می‌شود.	(آ) نادرست، واکنش بی هوازی (ب) نادرست، چندین فلز واسطه (پ) درست (ت) نادرست، Fe_2O_3 به عنوان رنگ قرمز در نقاشی کاربرد دارد. (ث) نادرست، هزینه‌های زیست محیطی هم در نظر گرفته شود. (ج) نادرست - از آلومینیم استفاده می‌شود. (چ) نادرست، بستگی به درصد خلوص آهن در هماتیت دارد. (ح) درست (خ) نادرست، از آهن (III) اکسید به عنوان رنگ قرمز استفاده می‌شود.	۴
۱۰۶	در هر مورد از بین دو واژه داده شده ، واژه‌ی مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید. (آ) کلوخه‌های کف اقیانوس دارای منابع غنی از فلز (منیزیم / منگنز) می‌باشد. (ب) آخرین مرحله ارزیابی چرخه عمر یک فراورده ، مرحله (مصرف / دفع) است. (پ) آهنک مصرف و استخراج فلزات (کمتر / بیشتر) از آهنک بازگشت آنها به طبیعت است. (ت) در روش گیاه پالایی استخراج فلز (طلا / نیکل) مقرون به صرفه نیست. (ث) در واکنش ترمیت از یک مول آهن(III) اکسید (یک / دو) مول آهن مذاب به دست می‌آید.	(آ) منگنز (۰/۲۵) (ب) دفع (۰/۲۵) (پ) بیشتر (۰/۲۵) (ت) نیکل (۰/۲۵) (ث) دو (۰/۲۵)	۱/۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱	در هر یک از جمله‌های زیر واژه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید. (آ) فلزها منابعی (تجدیدپذیر - تجدیدناپذیر) می‌باشند. (ب) نتیجه بازیافت فلزها در مقایسه با تهیه فلزها از سنگ معدن، موجب، (افزایش-کاهش) ردپای کربن دی اکسید می‌شود. (پ) به کمیتی که کارایی یک واکنش را نشان می‌دهد، (درصد خلوص - بازده درصدی) می‌گویند. (ت) به مقدار فراورده مورد انتظار در هر واکنش، مقدار (نظری - عملی) می‌گویند.	(آ) تجدیدناپذیر (ب) کاهش (پ) بازده درصدی (ت) نظری
۱۰۷	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کرده و در صورت نادرستی، شکل درست یا علت نادرستی را بنویسید. (آ) از آهن (III) اکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده می‌کنند. (ب) غلظت گونه‌های فلزی در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی، کمتر است. (پ) از فلز آلومینیم مذاب تولید شده در واکنش ترمیت برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می‌شود. (ت) در آخرین مرحله چرخه عمر یک پاکت کاغذی همانند کیسه پلاستیکی، بعد از دفن کردن، تجزیه شده و گاز متان تولید می‌کند.	(آ) درست (ب) نادرست - بیشتر است. (پ) نادرست - آهن مذاب تولید شده (ت) نادرست - کیسه پلاستیکی تجزیه نمی‌شود.
۱۰۸	کدام گزینه علت تفاوت مقدار واقعی یک فراورده از مقدار مورد انتظار را در یک واکنش شیمیایی درست نشان نمی‌دهد. (۱) واکنش دهنده‌ها ناخالص باشند. (۲) هم زمان با واکنش اصلی، واکنش ناخواسته دیگری انجام شود. (۳) فراورده گازی تولید شود. (۴) واکنش به طور کامل انجام نشود.	گزینه ۳
۱۰۹	شکل زیر مراحل چرخه عمر یک فراورده (پاکت کاغذی) را نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.	(آ) a: تولید (ب) درخت
۱۱۰	در هر یک از جمله‌های زیر واژه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید. (آ) فلزها منابعی (تجدیدپذیر - تجدیدناپذیر) می‌باشند. (ب) نتیجه بازیافت فلزها در مقایسه با تهیه فلزها از سنگ معدن، موجب، (افزایش-کاهش) ردپای کربن دی اکسید می‌شود. (پ) به کمیتی که کارایی یک واکنش را نشان می‌دهد، (درصد خلوص - بازده درصدی) می‌گویند. (ت) به مقدار فراورده مورد انتظار در هر واکنش، مقدار (نظری - عملی) می‌گویند.	(آ) تجدیدناپذیر (ب) کاهش (پ) بازده درصدی (ت) نظری

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


	(پ) مصرف زیاد آب و مصرف مواد شیمیایی مضر	(آ) جاهای نقطه چین – دفع و تولید» پر (ب) در تولید فراوردهٔ پاکت کاغذی ماده اولیه یا خام چیست؟ (پ) تولید این فراورده چه تاثیری بر روی محیط زیست دارد؟
۲	(آ) واکنش ترمیت ، برای جوش دادن خطوط راه آهن (ب) آلومینیم ، چون فلز آهن را از ترکیب آزاد کرده است. (پ) $\text{جرم ماده خالص} = \frac{\text{جرم ماده ناخالص}}{\text{درصد خلوص}} \times 100$ $80 = \frac{x}{\Delta / 4gAl} \times 100 \Rightarrow x = 4 / 32gAl \text{ pure}$ $? molAl_2O_3 = 4 / 32gAl \times \frac{1molAl}{27gAl} \times \frac{1molAl_2O_3}{2molAl} = 0.08molAl_2O_3$	با توجه به واکنش: $2Al(s) + Fe_2O_3(s) \rightarrow 2Fe(l) + Al_2O_3(s)$ به پرسش‌ها پاسخ دهید. (آ) این واکنش چه نامیده می‌شود؟ و چه استفاده‌ای از آن می‌شود؟ (ب) واکنش پذیری آلومینیم بیشتر است یا آهن؟ چرا؟ (پ) محاسبه کنید از واکنش ۵/۴ گرم آلومینیم با درصد خلوص ۸۰ درصد چند مول آلومینیم اکسید به دست می‌آید؟ ($Al = 27g.mol^{-1}$)

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲/۲۵	یک شیمی‌دان بنابر محاسبه انتظار داشت که در شرایط مناسب ۱۴ گرم آهن طبق واکنش زیر تهیه کند. اما در عمل توانست فقط ۹/۸ گرم آهن به دست آورد. $2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) \rightarrow 4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ (آ) بازده درصدی این واکنش را حساب کنید. (ب) از واکنش ۳ کیلوگرم گرافیت ۴۰ درصد خالص، در این واکنش چند لیتر گاز در STP حاصل می‌شود؟ ($C = 12\text{g.mol}^{-1}$)	۱۱۲
۱/۵	در صورتی که بازده واکنش زیر برابر ۷۵ درصد باشد، برای تهیه ۲/۵۲ لیتر گاز گوگرد تری‌اکسید در STP به چند گرم آلومینیم سولفات نیاز است؟ $(\text{Al}_r(\text{SO}_4)_r)_r = 342\text{g.mol}^{-1}$ $\text{Al}_r(\text{SO}_4)_r(\text{s}) \rightarrow \text{Al}_r\text{O}_r(\text{s}) + 3\text{SO}_2(\text{g})$	۱۱۳
۱/۵	(آ) جای خوردگی و فرسایش با استخراج فلز عوض شود. (ب) عبارت‌های a ، c و d درست و عبارت‌های b و e نادرست هستند.	۱۱۴

		 آ) اشتباه موجود در کنید. ب) درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را تعیین کنید. a : بازیافت فلزها سبب کاهش سرعت گرمایش جهانی می شود. b : در استخراج فلز حدود نیمی از سنگ معدن به فلز تبدیل می شود. c : در استخراج آهن، علاوه بر سنگ معدن آهن از منابع معدنی دیگر هم استفاده می شود. d : بازیافت فلزها گونه های زیستی کمتری را از بین می برد. e : آهنک مصرف و استخراج فلز با آهنک بازگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن یکسان است. آن را تصحیح	
--	--	---	--

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	نظری $\text{molNH}_3 = 0 / 4 \text{molN}_2 \times \frac{2 \text{molNH}_3}{1 \text{molN}_2} = 0 / 8 \text{molNH}_3$ عملی $\text{NH}_3 = 4 \times 0 / 1 = 0 / 4 \text{mol}$ بازده درصدی $= \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 = \frac{0 / 4}{0 / 8} \times 100 = 50\%$	با توجه به شکل زیر که به واکنش $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ مربوط است، مقدار نظری و بازده درصدی واکنش را محاسبه کنید. (هر ذره را معادل ۰/۱ مول در نظر بگیرید.) (گلوله سفید: H و گلوله سیاه: N) 	۱۱۵
۲	$\text{molHCl} = 100 \text{mLHCl} \times \frac{0 / 5 \text{molHCl}}{1000 \text{mLHCl}} = 0 / 5 \text{molHCl}$ تعداد مول HCl مصرفی $0 / 5 \text{mol} - 0 / 1 = 0 / 4$ خالص $\text{molMg} = 0 / 4 \text{molHCl} \times \frac{1 \text{molMg}}{2 \text{molHCl}} \times \frac{24 \text{gMg}}{1 \text{molMg}} = 0 / 48 \text{gMg}$ $\text{P}\% = \frac{0 / 48}{1 / 2} \times 100 = 40\%$	نمونه ناخالصی از فلز منیزیم به جرم ۱/۲ گرم را با ۱۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید (HCl) با غلظت ۰/۵ مول بر لیتر واکنش می دهیم. $\text{Mg(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{MgCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ در پایان واکنش ۰/۱ مول از هیدروکلریک اسید باقی می ماند. با فرض اینکه ناخالصی ها در واکنش شرکت نکرده اند، درصد خلوص نمونه منیزیم را محاسبه کنید. ($\text{Mg} = 24 \text{g.mol}^{-1}$)	۱۱۶
۱/۵	الف) واکنش b ، زیرا حالت فیزیکی آهن مایع است. ب) واکنش a ، زیرا کربن ارزان تر و در دسترس تر از آلومینیوم است. پ) با هم مساوی است، زیرا در هر دو واکنش به ازای مصرف یک مول آهن (III) اکسید، دو مول از آهن تولید می شود.	با توجه به واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید: a) $2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{s}) \rightarrow 4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ b) $2\text{Al}(\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) \rightarrow 2\text{Fe}(\text{l}) + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$ الف) در کدام واکنش، دما بالاتر از دمای ذوب آهن است؟ چرا؟ ب) تولید آهن با کدام روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟ چرا؟ پ) اگر در هر یک از واکنش ها، جرم های مساوی از آهن (III) اکسید به طور کامل مصرف شود، مقدار آهن تولید شده را با ذکر دلیل مقایسه کنید.	۱۱۷

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	آ) زیرا درصد فلز روی در گیاه از سنگ معدن کمتر است. $۴ = ۱۰۰ \times \frac{۴۰}{۱۰۰۰} = ۱۰۰ \times \frac{\text{جرم فلز روی}}{\text{جرم گیاه}} = \text{درصد فلز روی در گیاه}$ ب) $? kg Cu = ۱ ton \times \frac{۱۰^۶ g}{۱ ton} \times \frac{۰/۵ g Cu}{۱۰۰ g} \times \frac{۱ Kg}{۱۰۰۰ g} = ۵ kg$ پ) نیکل $? mol Cu = ۱۰۰۰ g \times \frac{۰/۵ g Cu}{۱۰۰ g} \times \frac{۱ mol Cu}{۶۴ g Cu} = ۰/۰۷۸ mol Cu$ $? mol Ni = ۱۰۰۰ g \times \frac{۲ g Ni}{۱۰۰ g} \times \frac{۱ mol Ni}{۵۹ g Ni} = ۰/۳۳۹ mol Ni$
۰/۵	در یک کیلوگرم از گیاه، ۱۴ گرم مس استخراج می‌شود. $\frac{۱۴}{۷۰} \times ۱۰۰ = ۲۰\%$

۱۱۸	با توجه به داده‌های جدول زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید. <table><tr><th>نماد شیمیایی فلز</th><th>قیمت هر کیلوگرم فلز (ریال)</th><th>بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)</th><th>درصد فلز در سنگ معدن</th></tr><tr><td>Au</td><td>۱۲۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۰/۱</td><td>۰/۰۰۲</td></tr><tr><td>Ni</td><td>۸۲۰۰۰۰</td><td>۳۸</td><td>۲</td></tr><tr><td>Cu</td><td>۲۴۵۰۰۰</td><td>۱۴</td><td>۰/۵</td></tr><tr><td>Zn</td><td>۱۵۵۰۰۰</td><td>۴۰</td><td>۵</td></tr></table> آ) درصد فلز روی را در گیاه محاسبه کنید و چرا استخراج فلز روی از گیاه مقرون به صرفه نیست؟ ب) محاسبه کنید از یک تن سنگ معدن مس، چند کیلوگرم مس می‌توان استخراج کرد؟ پ) تعداد مول‌های کدام فلز مس یا نیکل در یک کیلوگرم سنگ معدن بیشتر است؟ (Ni=۵۹ , Cu=۶۴ g.mol^{-۱})	نماد شیمیایی فلز	قیمت هر کیلوگرم فلز (ریال)	بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)	درصد فلز در سنگ معدن	Au	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۰/۱	۰/۰۰۲	Ni	۸۲۰۰۰۰	۳۸	۲	Cu	۲۴۵۰۰۰	۱۴	۰/۵	Zn	۱۵۵۰۰۰	۴۰	۵
نماد شیمیایی فلز	قیمت هر کیلوگرم فلز (ریال)	بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)	درصد فلز در سنگ معدن																		
Au	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۰/۱	۰/۰۰۲																		
Ni	۸۲۰۰۰۰	۳۸	۲																		
Cu	۲۴۵۰۰۰	۱۴	۰/۵																		
Zn	۱۵۵۰۰۰	۴۰	۵																		
۱۱۹	یک کیلوگرم از گیاهی که برای پالایش مس به کار می‌رود، ۷۰ گرم خاکستر می‌دهد، درصد مس را در این خاکستر حساب کنید. <table><tr><th>نماد شیمیایی فلز</th><th>بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)</th><th>درصد فلز در سنگ معدن</th></tr><tr><td>Cu</td><td>۱۴</td><td>۰/۵</td></tr></table>	نماد شیمیایی فلز	بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)	درصد فلز در سنگ معدن	Cu	۱۴	۰/۵														
نماد شیمیایی فلز	بیشترین مقدار فلز در یک کیلوگرم از گیاه (گرم)	درصد فلز در سنگ معدن																			
Cu	۱۴	۰/۵																			

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۳	جرم ماده خالص = $\frac{\text{جرم ماده ناخالص}}{\text{درصد خلوص}} \times ۱۰۰$ $\Rightarrow ۶۰ = \frac{x}{۸g} \times ۱۰۰ \Rightarrow x = ۴/۸g \text{ NaOH pure}$ $? \text{ mol SO}_4 = ۴/۸g \text{ NaOH} \times \frac{۱ \text{ mol NaOH}}{۴۰g \text{ NaOH}} \times \frac{۱ \text{ mol SO}_4}{۲ \text{ mol NaOH}} = ۰/۰۶ \text{ mol SO}_4$ $\times ۱۰۰ = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰$ $\Rightarrow ۶۵ = \frac{۰/۰۶ \text{ mol SO}_4}{y} \times ۱۰۰ \Rightarrow y = ۰/۰۹ \text{ mol SO}_4$ $? g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3 = ۰/۰۹ \text{ mol SO}_4 \times \frac{۱ \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3}{۳ \text{ mol SO}_4} \times \frac{۳۴۲g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3}{۱ \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3} = ۱۰/۲۶g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ pure}$ $۷۰ = \frac{۱۰/۲۶g}{z} \times ۱۰۰ \Rightarrow z = ۱۴/۶۶g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ impure}$	از تجزیه حرارتی چند گرم آلومینیم سولفات ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) با خلوص ۷۰ درصد، طبق واکنش اول، گاز مورد نیاز برای واکنش ۸ گرم سدیم هیدروکسید ۶۰ درصد خلوص فراهم می‌شود؟ (بازده واکنش اول را ۶۵ درصد در نظر بگیرید). ($\text{NaOH} = ۴۰g \cdot \text{mol}^{-1}$) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(s) \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(s) + ۳\text{SO}_3(g)$ $\text{SO}_3 + ۲\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	۱۲۰
۲/۲۵	میزان گاز تولید شده را محاسبه می‌کنیم و از جرم اولیه کم می‌کنیم. $? g \text{ SO}_3 = ۴۰g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ impure} \times \frac{۸۰g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ pure}}{۱۰۰g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3 \text{ impure}} \times \frac{۱ \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3}{۳۴۲g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{۳ \text{ mol SO}_3}{۱ \text{ mol Al}_2(\text{SO}_4)_3} \times \frac{۸۰g \text{ SO}_3}{۱ \text{ mol SO}_3} = ۲۲/۴۶g \text{ SO}_3$ نظری $\times ۱۰۰ = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰$ $\Rightarrow ۵۰ = \frac{x}{۲۲/۴۶g \text{ SO}_3} \times ۱۰۰ \Rightarrow x = ۱۱/۲۳g \text{ SO}_3$ عملی مواد جامد باقی مانده $۴۰ - ۱۱/۲۳ = ۲۸/۷۷g$	اگر ۴۰ گرم آلومینیم سولفات ناخالص ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) با خلوص ۸۰٪ تجزیه شود، چند گرم ماده جامد در ظرف باقی می‌ماند؟ بازده واکنش را ۵۰ درصد در نظر بگیرید. ($\text{O} = ۱۶, \text{Al} = ۲۷, \text{S} = ۳۲g \cdot \text{mol}^{-1}$) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(s) \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(s) + ۳\text{SO}_3(g)$	۱۲۱

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۷۵	جرم ماده خالص = $\frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم ماده ناخالص}} \times ۱۰۰$ خالص $\Rightarrow ۷۰ = \frac{x}{۲/۸g} \times ۱۰۰ \Rightarrow x = ۱/۹۶g \text{ Fe}$ $? \text{ mL HCl(aq)} = ۱/۹۶g \text{ Fe} \times \frac{۱\text{mol Fe}}{۵۶g \text{ Fe}} \times \frac{۲\text{mol HCl}}{۱\text{mol Fe}} \times \frac{۱\text{L HCl(aq)}}{۰/۷\text{mol HCl}}$ $\frac{۱۰۰\text{mL HCl(aq)}}{۱\text{L HCl(aq)}} = ۱۰۰\text{mL HCl(aq)}$	بر طبق واکنش زیر، چند میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید با غلظت ۰/۷ مول بر لیتر، برای واکنش با ۲/۸ گرم آهن با خلوص ۷۰٪ لازم است؟ (ناخالصی با اسید واکنش نمی دهد) $(\text{Fe} = ۵۶g.\text{mol}^{-1})$ $\text{Fe(s)} + ۲\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{FeCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$	۱۲۲
۱/۲۵	$? \text{ L Cl}_2 = ۲۵g \text{ MnO}_2 \text{ impure} \times \frac{۸۵g \text{ MnO}_2 \text{ pure}}{۱۰۰g \text{ MnO}_2 \text{ impure}} \times \frac{۱\text{mol MnO}_2}{۸۷g \text{ MnO}_2} \times$ $\frac{۱\text{mol Cl}_2}{۱\text{mol MnO}_2} \times \frac{۲۲/۴ \text{ L Cl}_2}{۱\text{mol Cl}_2} = ۵/۴۷ \text{ L Cl}_2$	۲۵ گرم MnO_2 با درصد خلوص ۸۵٪ با مقدار اضافی محلول HCl واکنش داده است. محاسبه کنید تقریباً چند لیتر گاز کلر در STP تولید شده است؟ ($۱\text{mol MnO}_2 = ۸۷g$ و $۱\text{mol Cl}_2 = ۷۱g$) $\text{MnO}_2(\text{s}) + ۴\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{MnCl}_2(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{g}) + ۲\text{H}_2\text{O(l)}$	۱۲۳
۱/۵	$? g \text{ CaH}_2 \text{ impure} = ۱۹۲\text{mL H}_2 \times \frac{۱\text{L H}_2}{۱۰۰۰\text{mL H}_2} \times \frac{۱\text{mol H}_2}{۲۲/۴ \text{ L H}_2} \times \frac{۱\text{mol CaH}_2}{۲\text{mol H}_2} \times$ $\frac{۴۲g \text{ CaH}_2 \text{ pure}}{۱\text{mol CaH}_2} \times \frac{۱۰۰g \text{ CaH}_2 \text{ impure}}{۷۲g \text{ CaH}_2 \text{ pure}} = ۰/۲۵g \text{ CaH}_2$ ناخالص	با توجه به واکنش زیر محاسبه کنید چند گرم کلسیم هیدرید (CaH_2) با درصد خلوص ۷۲٪ برای تهیه ۱۹۲ میلی لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد، لازم است؟ ($\text{H} = ۱, \text{O} = ۱۶, \text{Ca} = ۴۰g / \text{mol}$) $\text{CaH}_2(\text{s}) + ۲\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + ۲\text{H}_2(\text{g})$	۱۲۴
۱/۷۵	مقدار عملی = $\frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times ۱۰۰$ نظری $\frac{۰/۵\text{Kg}}{x} \times ۱۰۰ = ۲۵ \rightarrow x = ۲\text{Kg NH}_3$ $? \text{ L H}_2 = ۲\text{Kg NH}_3 \times \frac{۱۰۰g}{۱\text{Kg}} \times \frac{۱\text{mol NH}_3}{۱۷g \text{ NH}_3} \times \frac{۳\text{mol H}_2}{۲\text{mol NH}_3} \times \frac{۲۲/۴ \text{ L H}_2}{۱\text{mol H}_2} = ۳۹۵۲/۹۴ \text{ L H}_2$	اگر بازده درصدی واکنش زیر ۲۵٪ باشد، حجم گاز هیدروژن لازم برای تولید ۰/۵ کیلوگرم آمونیاک را در شرایط استاندارد، برحسب لیتر محاسبه کنید. ($۱\text{mol NH}_3 = ۱۷g$) $\text{N}_2(\text{g}) + ۳\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow ۲\text{NH}_3(\text{g})$	۱۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۷۵	$2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$ جرم مخلوط اولیه: ۱۰۰ گرم جرم گاز تولید شده: $? \text{gH}_2 = \Delta \text{gNa impure} \times \frac{2 \text{gNa pure}}{100 \text{gNa impure}} \times \frac{1 \text{molNa}}{23 \text{gNa}} \times \frac{1 \text{molH}_2}{2 \text{molNa}} \times \frac{2 \text{gH}_2}{1 \text{molH}_2} = 0 / 2 \text{gH}_2$ جرم باقیمانده: $100 - 0 / 2 = 99 / 8 \text{g}$	۵ گرم سدیم با خلوص ۹۲ درصد را وارد ۹۵ گرم آب می‌کنیم. پس از اتمام واکنش، جرم مخلوط باقی مانده چند گرم است؟ (واکنش موازنه نشده است و ناخالصی‌ها با آب واکنش نمی‌دهند.) $\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$	۱۲۶
۴	واکنش منیزیم با اسید: $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$ در صورتی که منیزیم با این مشخصات واکنش بدهد، حجم گاز هیدروژن تولیدی به این صورت خواهد بود: $? \text{L H}_2 = 15 \text{gMg impure} \times \frac{24 \text{gMg pure}}{100 \text{gMg impure}} \times \frac{1 \text{molMg}}{24 \text{gMg}} \times \frac{1 \text{molH}_2}{1 \text{molMg}} \times \frac{22.4 \text{LH}_2}{1 \text{molH}_2} = 12 / 6 \text{LH}_2$ نظری مقدار عملی $\times 100 = \frac{\text{بازده درصدی واکنش}}{\text{مقدار نظری}}$ $\Rightarrow 92 = \frac{x}{12 / 6 \text{LH}_2} \times 100 \Rightarrow x = 11 / 59 \text{LH}_2$ عملی واکنش آلومینیم با اسید: $2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$ اگر آلومینیم واکنش بدهد، حجم گاز هیدروژن تولیدی به این صورت خواهد بود: جرم ماده خالص $\times 100 = \frac{\text{درصد خلوص}}{\text{جرم ماده ناخالص}}$	از واکنش ۱۵ گرم فلز M با خلوص ۹۰ درصد با مقدار کافی محلول هیدروکلریک اسید، ۱۵/۴۵ لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید می‌شود. اگر بازده واکنش ۹۲ درصد باشد، فلز M کدامیک از فلزات داده شده میتواند باشد؟ (Al با عدد جرمی ۲۷ - Mg با عدد جرمی ۲۴)	۱۲۷

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	$\Rightarrow 90 = \frac{x}{15 \text{ g Al}} \times 100 \Rightarrow x = 13.5 \text{ g Al}$ نظري $? \text{ L H}_2 = 13.5 \text{ g Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{27 \text{ g Al}} \times \frac{3 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol Al}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \text{ mol H}_2} = 16.8 \text{ L H}_2$ مقدار عملی $\times 100 = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100$ بازده درصدی واکنش $\Rightarrow 92 = \frac{x}{16.8 \text{ L H}_2} \times 100 \Rightarrow x = 15.456 \text{ L H}_2$ عملی بنابراین M فلز آلومینیم است.	
۱/۷۵	$? \text{ g NaH}_2\text{PO}_4 \text{ pure} = 50 \text{ mL NaOH(aq)} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{0.2 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ L NaOH(aq)}} \times \frac{1 \text{ mol NaH}_2\text{PO}_4}{1 \text{ mol NaOH}} \times$ خالص $\frac{120 \text{ g NaH}_2\text{PO}_4}{1 \text{ mol NaH}_2\text{PO}_4} = 1/2 \text{ g NaH}_2\text{PO}_4$ جرم ماده خالص $\times 100 = \frac{\text{جرم ماده خالص}}{\text{جرم ماده ناخالص}} \times 100$ درصد خلوص $\Rightarrow 80 = \frac{1/2 \text{ g NaH}_2\text{PO}_4}{x} \times 100 \Rightarrow x = 1/5 \text{ g NaH}_2\text{PO}_4$ ناخالص	سدیم دی هیدروژن فسفات (NaH_2PO_4) در صنایع غذایی کاربرد دارد. مطابق واکنش زیر چند گرم سدیم دی هیدروژن فسفات (NaH_2PO_4) با خلوص ۸۰٪ برای واکنش کامل با ۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۲ مول بر لیتر سدیم هیدروکسید (NaOH) نیاز است؟ ($\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{P} = 31 \text{ g/mol}$) $\text{NaH}_2\text{PO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
۱/۵	$? \text{ g ZnS} = 84 \text{ g Zn} \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{65 \text{ g Zn}} \times \frac{97 \text{ g ZnS}}{1 \text{ mol Zn}} = 125.35 \text{ g ZnS}$ نظري مقدار عملی $\times 100 = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100$ بازده درصدی واکنش $= \frac{104 \text{ g ZnS}}{125.35 \text{ g ZnS}} \times 100 = 82.97\%$	وقتی بودر روی با گوگرد حرارت داده شود یک واکنش شدید رخ می دهد و روی سولفید تشکیل می گردد. $8\text{Zn} + \text{S}_8 \rightarrow 8\text{ZnS}$ طبق واکنش، ۱۰۴ گرم روی سولفید تولید شده است. بازده درصدی این واکنش را وقتی که ۸۴ گرم روی با مقدار کافی گوگرد واکنش می دهد، به دست آورید. ($\text{S} = 32, \text{Zn} = 65 \text{ g/mol}$)

	استان کهگیلویه و بویر احمد - صفحات ۲۲ تا ۲۹		
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱۳۰	جمله‌های زیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آنها را مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل صحیح جمله‌های نادرست را بنویسید. (آ) هر چه فلز واکنش‌پذیرتر باشد، تمایل آن برای انجام واکنش بیشتر است. (ب) میخ آهنی در محلول آبی رنگ مس(II) سولفات بدون تغییر باقی می‌ماند. (پ) فلز منیزیم می‌تواند آهن را از محلول آهن(II) نیترات خارج کند. (ت) برای نگهداری از فلز نقره خالص آن را زیر نفت نگهداری می‌کنند. (ث) برای استخراج فلزهای روی و نیکل روش گیاه پالایی مقرون به صرفه نیست. (ج) از فلز آلومینیم مذاب تولید شده در واکنش ترمیت برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می‌شود. (چ) هنگامی از فرایند گیاه پالایی بهره می‌برند که درصد فلز در این روش بیشتر از درصد فلز در کانه آن باشد. (ح) باز یافت اصطلاحی است که برای ارزیابی میزان تأثیر یک فراورده بر محیط زیست در طول مدت عمر آن به کار می‌رود.	(آ) درست (ب) نادرست، واکنش می‌دهد (پ) درست (ت) نادرست - فلزات گروه اول را زیر نفت نگهداری می‌کنند. (ث) درست (ج) نادرست - از آهن مذاب ... (چ) درست (ح) نادرست - ارزیابی چرخه عمر	۳
۱۳۱	عبارت‌های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید. (برخی موارد اضافی هستند). اصلی - فلزی - نافلزی - واسطه - کمتری - استخراج - باز یافت - تجدیدپذیر - تجدیدناپذیر - بیشتری (آ) بستر اقیانوس ها منبعی غنی از منابع گوناگون است. (ب) ستون‌های سولفیدی فلزات گنجی عظیم در اعماق دریاهاست. (پ) به توسعه پایدار کشور کمک می‌کند. (ت) فلز ها یک منبع هستند. (ث) گونه‌های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی غلظت دارند.	(آ) فلزی (ب) واسطه (پ) باز یافت (ت) تجدیدناپذیر (ث) بیشتری	۱/۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



۱/۵	$? KClO_3 g \text{ ناخالص} = 11/2 L O_2 \times \frac{100}{80} \times \frac{1 mol O_2}{22/4 L O_2}$ $\times \frac{2 mol KClO_3}{3 mol O_2} \times \frac{122/5 g KClO_3}{1 mol KClO_3} \times \frac{100 g \text{ ناخالص}}{90 g \text{ خالص}} = 56/71 g$	چند گرم پتاسیم کلرات ۹۰ درصد خالص اگر بر اثر گرما به میزان ۸۰ درصد تجزیه شود، ۱۱/۲ لیتر گاز اکسیژن در STP آزاد می شود؟ $O=16, Cl=35.5, K=39$ $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$	۱۳۲
۱/۵	$? g Al_2(SO_4)_3 \text{ خالص} = 10 g SO_3 \times \frac{1 mol SO_3}{80 g SO_3}$ $\times \frac{1 mol Al_2(SO_4)_3}{3 mol SO_3} \times \frac{342 g}{1 mol Al_2(SO_4)_3} = 14/25 g$ $\% \text{ درصد خلوص} = \frac{14/25}{68/4} \times 100 = 20/83\%$	۶۸/۴ گرم آلومینیم سولفات ناخالص طبق واکنش زیر در اثر حرارت تجزیه می شود اگر از جرم مجموع مواد ۱۰ گرم کم شده باشد درصد خلوص آلومینیم سولفات چند است؟ $1 mol Al_2(SO_4)_3 = 342, Al = 27, S = 32, O = 16 g$ $Al_2(SO_4)_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 3SO_3(g)$	۱۳۳
۱/۷۵	$? L N_2O \text{ نظری} = 60 g \text{ خ} NH_4NO_3 \times \frac{95 g \text{ خ}}{100 g \text{ خ}} \times \frac{1 mol NH_4NO_3}{80 g NH_4NO_3}$ $\times \frac{1 mol N_2O}{1 mol NH_4NO_3} \times \frac{22/4 L}{1 mol N_2O} = 15/96 L$ $\text{بازده} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \rightarrow 90 = \frac{L \text{ عملی}}{15/96} \times 100 \rightarrow L = 14/36 L$	بر اساس معادله داده شده، از تجزیه گرمایی ۶۰ گرم آمونیوم نترات ۹۵ درصد خالص با بازده ۹۰ درصد، چند لیتر گاز N_2O در STP تولید می شود؟ $NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2H_2O(g) \quad (H=1, N=14, O=16: g.mol^{-1})$	۱۳۴
۱/۷۵	$? L H_2 \text{ نظری} = 240 g \text{ خ} Mg \times \frac{90 g \text{ خ}}{100 g \text{ خ}} \times \frac{1 mol Mg}{24 g Mg}$ $\times \frac{1 mol H_2}{1 mol Mg} \times \frac{22/4 L}{1 mol H_2} = 20/1/6 L$ $\text{بازده} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \rightarrow \text{بازده} = \frac{80}{20/1/6} \times 100 = 39/68$	اگر طبق واکنش زیر ۲۴۰ گرم منیزیم ۹۰ درصد خالص وارد واکنش شود و مقدار ۸۰ لیتر گاز در STP تولید گردد، بازده درصدی واکنش را حساب کنید؟ $Mg(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g) \quad (Mg = 24 g.mol^{-1})$	۱۳۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳










۱/۷۵	در رابطه با گیاه پالایی موارد درست و نادرست را مشخص کنید و موارد نادرست را اصلاح نمایید. (آ) این روش برای استخراج فلز طلا به صرفه نیست. (ب) در این روش برای استخراج فلزات نیاز به کاشت گیاهان متفاوتی است. (پ) اگر در خاک منطقه‌ای نقره کلرید موجود باشد، برای استخراج نقره این روش مناسب است. (ت) این روش برای استخراج فلز آهن صرفه اقتصادی ندارد.	۱۳۶
۲/۲۵	برای راحتی کار می‌توانیم مقدار گلوکز را ۱ مول فرض کنیم، بنابراین داریم: $L\ CO_2 = 1\ mol\ \text{گلوکز} \times \frac{2\ mol\ CO_2}{1\ mol\ \text{گلوکز}} \times \frac{22/4\ L}{1\ mol\ CO_2} = 44/8\ L\ CO_2$ $90 = \frac{x}{44/8} \times 100 \rightarrow x = 40/32\ L\ CO_2$ $L\ CO_2\ \text{اکسایش} = 1\ mol\ \text{گلوکز} \times \frac{6\ mol\ CO_2}{1\ mol\ \text{گلوکز}}$ $\times \frac{22/4}{1\ mol\ CO_2} = 134/4\ L$ $\frac{CO_2\ \text{تخمیر}}{CO_2\ \text{اکسایش}} = \frac{40/32}{134/4} = 0/3$	۱۳۷
۲/۵	موارد درست و نادرست را با ذکر دلیل مشخص کنید. (آ) هر چه فلزی واکنش‌پذیرتر باشد، آهنگ بازگشت آن به طبیعت به شکل سنگ معدن سریع‌تر است. (ب) فلز استخراج شده از مجتمع مس سرچشمه کرمان با ترکیبات فلز حاصل از مجتمع مونه اصفهان واکنش می‌دهد.	۱۳۸

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

(پ) درست - کربن به دلیل این که واکنش پذیری بیشتری از آهن دارد و در دسترس و ارزان است برای استخراج آهن استفاده می شود. (ت) درست - فلز با خوردگی و فرسایش به ترکیبات فلز تبدیل و به طبیعت برمی گردد. (ث) نادرست - چون با بازیافت فلز آهن کربن کمتری برای استخراج آن مصرف می شود، پس کربن دی اکسید کمتری تولید شده و چون کربن دی اکسید گاز گلخانه ای است، بنابراین کاهش آن می تواند سبب کاهش گرمایش کره زمین شود.	(پ) همه شرکت های فولاد جهان، برای استخراج فلز مورد استفاده از کربن استفاده می کنند. (ت) فلز با خوردگی و فرسایش تبدیل به سنگ معدن می شود. (ث) بازیافت فلز آهن تاثیری بر گرمایش کره زمین ندارد.
---	--

استان کرمانشاه - صفحات ۲۹ تا ۴۸			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱۳۹	هیدروکربنی غیرحلقوی به فرمول C_xH_y شناسایی شده است. افزودن چند قطره از آن به مقدار کمی از محلول برم در یک حلال آلی، سبب بی‌رنگ شدن محلول می‌شود. آ) این هیدروکربن جزو آلکان‌ها یا آلکن‌هاست؟ چرا؟ ب) اگر جرم مولی آن برابر با 56 g/mol باشد، فرمول مولکولی آن را بیابید. ($H=1 \text{ g/mol}$, $C=12 \text{ g/mol}$)	آ) جزء آلکن‌ها می‌باشد، چرا که محلول قرمز برم با پیوند دوگانه آلکن‌ها وارد واکنش می‌شود. ب) در آلکن‌های غیرحلقوی با یک پیوند دوگانه داریم: $C_xH_y \rightarrow C_nH_{2n}$ $x = n, y = 2n \rightarrow (n \times 12) + (2n \times 1) = 56 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \rightarrow n = 4$ بنابراین فرمول مولکولی آلکن مربوطه C_4H_8 است.	۱/۲۵
۱۴۰	جاهای خالی را کامل کنید. آ) به طور کلی با افزایش تعداد کربن در آلکان‌ها، نقطه جوش آنها یافته، گرانروی آنها می‌یابد و میزان فرار بودن آنها می‌شود. ب) یک راه تشخیص آلکن‌ها از هیدروکربن‌های سیر شده، واکنش آنها با محلول است که در نتیجه آن، رنگ این محلول بی‌رنگ می‌شود.	آ) افزایش-افزایش-کم ب) برم-قرمز	۱/۵
۱۴۱	آ) فرمول مولکولی هیدروکربن‌های زیر را بنویسید . ب) ساختار پیوند - خط هریک را رسم کنید .	آ) C_6H_6 و $C_{10}H_8$ ب)  	۱

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳





۱/۵	(a) ۲- متیل اوکتان (b) ۳- متیل اوکتان (c) ۳، ۵- دی متیل هپتان	آلکان‌های زیر را نام‌گذاری کنید. <table><tr><td>(a)</td><td>(b)</td><td>(c)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	(a)	(b)	(c)				۱۴۲
(a)	(b)	(c)							
									
۱	(آ) C ₁₂ H ₂₆ (ب) C ₁₀ H ₂₂ (پ) C ₁₂ H ₂₆ (ت) وان‌دروالس	پیش بینی کنید طبق فرمول هیدروکربن‌های C ₁₂ H ₂₆ ، C ₁₀ H ₂₂ (آ) کدام یک نقطه جوش بالاتری دارد؟ (ب) کدام یک فرارتر است؟ (پ) کدام یک گرانشی بیشتری دارد؟ (ت) نیروی بین مولکولی آنها از چه نوعی است؟	۱۴۳						
۲/۵	معادله سوختن کامل این آلکان (A) به صورت زیر است: $C_nH_{2n+2} + \frac{(3n+1)}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$ از سوختن ۱ مول از این آلکان باید (n+۱) مول آب (W) تولید شود. جرم مولی آب برابر ۱۸ g/mol است پس ۳۶ گرم آن شامل ۲ مول آب است پس: $25\text{ g A} = 2\text{ mol W} \times \frac{1\text{ mol A}}{(n+1)\text{ mol W}} \times \frac{(12n + (2n+2))\text{ g}}{1\text{ mol A}}$ $\rightarrow 28n + 4 = 25n + 25 \rightarrow n = 7$	تعداد اتم های کربن در مولکول آلکان راست‌زنجیری که از سوختن کامل ۲۵g از آن ۳۶g آب تولید می‌شود چقدر است؟ (H=۱ g/mol, C=۱۲ g/mol, O=۱۶ g/mol) $C_nH_{2n+2} + \frac{(3n+1)}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$	۱۴۴						

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴



۲/۵	(آ) غلط ۳، ۸-دی متیل دکان (ب) صحیح. فرمول مولکولی ۳، ۸-دی متیل دکان با ۳-اتیل دکان یکسان و به صورت $C_{12}H_{26}$ می باشد. (پ) غلط ۳-اتیل دکان جرم مولی آلکان = $12(12) + 26(1) = 170 \frac{g}{mol}$ جرم مولی پروپین = $3(12) + 6(1) = 42 \frac{g}{mol} \rightarrow \frac{170}{42} \approx 4$	با توجه به آلکان داده شده زیر، ابتدا جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید و سپس علت هر یک را توضیح دهید. (آ) نام آن ۲-اتیل-۷-متیل نونان است. (ب) فرمول مولکولی آن با ۳-اتیل دکان یکسان است. (پ) جرم مولی آن تقریباً ۵ برابر جرم مولی پروپین است. ($H=1 \text{ g/mol}$, $C=12 \text{ g/mol}$)	۱۴۵
۱/۵	(آ) نادرست. هر چه جرم آلکان کمتر باشد دمای جوش کمتر دارد و فرارتر است. (ب) درست. مولکولهای چربی سیر نشده موجود در گوشت با برم واکنش می دهند. (پ) درست. فرمول مولکولی هر دو ترکیب یکسان و C_6H_{12} است ولی ساختار متفاوت دارند.	درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. (آ) بوتان فرارتر از اتان است. (ب) تکه ای گوشت چرب شده ، بخار برم را بی رنگ می کند. (پ) سیکلو هگزان و ۱- هگزن ایزومر هستند.	۱۴۶
۱	$CH_3 - C(CH_2CH_3)_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$ ۳-اتیل-۴،۳-دی متیل هگزان	دانش آموزی به اشتباه نام آیوپاک ترکیبی را ۲،۲-دی اتیل-۳-متیل پنتان نامگذاری کرده است. با رسم ساختار این ترکیب نام صحیح آن را بنویسید.	۱۴۷
۱	(آ) با افزودن برم مایع قرمز رنگ، هر ماده ای که رنگ قرمز برم در آن از بین برود سیر نشده است. پس ۱-هگزن سیر نشده و دارای پیوند دوگانه شناسایی خواهد شد. (ب) واکنش پذیری ۱- هگزن بیشتر است زیرا سیر نشده است و میل به انجام واکنش در آن زیاد است.	هگزان و ۱- هگزن دو مایع بی رنگ هستند. (آ) روشی برای تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنید. (ب) واکنش پذیری کدام ترکیب بالاتر است؟ چرا؟	۱۴۸


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۲	آ) برخلاف ب) سبز پ) کربن - چهار ت) حدود صفر - ناقطبی ث) سیر شده ج) برم مایع	۱۴۹ واژه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید. آ) با افزایش تعداد اتم های کربن در آلکان ها، نقطه جوش آنها (همانند - برخلاف) فراریت آنها زیاد می شود. ب) نفت خام یکی از سوخت های فسیلی که به شکل مایع غلیظ سیاه یا قهوه ای متمایل به (قرمز - سبز) از دل زمین بیرون کشیده می شود. پ) در خانه شماره ۶ جدول دوره ای عناصرها (کربن - اکسیژن) قرار دارد که اتم آن در لایه ظرفیت خود (چهار - شش) الکترون دارد. ت) گشتاور دو قطبی آلکانها (حدود صفر - زیاد) است و ترکیب هایی (دوقطبی - ناقطبی) هستند. ث) سیکلو آلکانها، جز هیدروکربن های (سیر شده - سیر نشده) هستند. ج) واکنش با (برم مایع - با نیکل) برای شناسایی ترکیب های سیر نشده است.
---	--	---

استان کرمان - صفحات ۲۹ تا ۴۸													
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره										
۱۵۰	در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید. <table><tr><td>کدام یک نقطه ی جوش بیشتری دارد؟</td><td>C_8H_{18} یا C_7H_{16}.</td></tr><tr><td>کدام یک فراریت کمتری دارد؟</td><td>$C_{18}H_{38}$ یا C_8H_{18}</td></tr><tr><td>کدام یک نیروی بین مولکولی قوی تری دارد؟</td><td>C_5H_{12} یا C_7H_{16}</td></tr><tr><td>کدام یک برای محافظت از فلز سدیم استفاده می شود؟</td><td>$C_{11}H_{24}$ یا C_7H_5OH</td></tr><tr><td>کدام یک واکنش پذیری بیشتری دارد؟</td><td>C_2H_4 یا C_2H_6</td></tr></table>	کدام یک نقطه ی جوش بیشتری دارد؟	C_8H_{18} یا C_7H_{16} .	کدام یک فراریت کمتری دارد؟	$C_{18}H_{38}$ یا C_8H_{18}	کدام یک نیروی بین مولکولی قوی تری دارد؟	C_5H_{12} یا C_7H_{16}	کدام یک برای محافظت از فلز سدیم استفاده می شود؟	$C_{11}H_{24}$ یا C_7H_5OH	کدام یک واکنش پذیری بیشتری دارد؟	C_2H_4 یا C_2H_6	(آ) C_8H_{18} (ب) $C_{18}H_{38}$ (پ) C_7H_{16} (ت) $C_{11}H_{24}$ (ث) C_7H_6	۱.۲۵
کدام یک نقطه ی جوش بیشتری دارد؟	C_8H_{18} یا C_7H_{16} .												
کدام یک فراریت کمتری دارد؟	$C_{18}H_{38}$ یا C_8H_{18}												
کدام یک نیروی بین مولکولی قوی تری دارد؟	C_5H_{12} یا C_7H_{16}												
کدام یک برای محافظت از فلز سدیم استفاده می شود؟	$C_{11}H_{24}$ یا C_7H_5OH												
کدام یک واکنش پذیری بیشتری دارد؟	C_2H_4 یا C_2H_6												
۱۵۱	هر شکل، کدام توانایی خاص اتم کربن را نشان می دهد؟ (آ)   $H-C \equiv C-H$ اتین (ب)   $H-C \equiv N$ هیدروژن سیانید کربن دی اکسید توانایی تشکیل پیوند اشتراکی یگانه، دوگانه و سه گانه با خود و برخی اتم های دیگر (ب) توانایی تشکیل زنجیر و حلقه $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$   		۱										







بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴



۱	با توجه به نمودار زیر که ترتیب نقطه جوش آلکان‌های راست زنجیر را نشان می‌دهد و فرمول مولکولی آلکان‌های راست زنجیر $C_{16}H_{34}$ ، $C_{15}H_{32}$ ، $C_{14}H_{30}$ ، $C_{13}H_{28}$ ، $C_{12}H_{26}$ ، $C_{11}H_{24}$ ، $C_{10}H_{22}$ ، C_9H_{20} ، C_8H_{18} ، C_7H_{16} ، C_6H_{14} ، C_5H_{12} ، C_4H_{10} ، C_3H_8 ، C_2H_6 ، C_1H_4 به پرسش‌هایی مطرح شده پاسخ دهید.  شمار اتم‌های کربن آ) نقطه جوش کدام دو آلکان داده شده به هم نزدیکتر است؟ ب) در دمای ۲۲ درجه سلسیوس حالت فیزیکی کدام با بقیه متفاوت است؟ پ) یک کاربرد برای C_6H_{14} بیان کنید. ت) کدام ممکن است در سوخت هواپیما وجود داشته باشد؟	۱۵۲
۱	 مدل پیوند-خط آلکانی با فرمول مولکولی C_8H_{18} را به شکلی رسم کنید که دارای ۳ گروه CH و ۵ گروه CH_2 باشد.	۱۵۳



۲	آ) زغال سنگ اثر گلخانه‌ای بیشتری دارد. زیرا گاز کربن دی اکسید بیشتری تولید می‌کند. ب) گوگرد دی‌اکسید پ) $4.4gC \times \frac{30kJ}{1gc} \times \frac{0.104gCO_2}{1kj} \times \frac{1molCO_2}{44gCO_2} \times \frac{22.4LCO_2}{1molCO_2} = 6/9888 LCO_2$	با توجه به جدول داده شده که مربوط به مقایسه بنزین با زغال سنگ است به سوالات مطرح شده پاسخ دهید. <table border="1"> <thead> <tr> <th>نام سوخت</th><th>گرمای آزاد شده (kJ/g)</th><th>فراورده های سوختن</th><th>مقدار کربن دی‌اکسید به ازای هر کیلوژول انرژی تولید شده (g)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بنزین</td><td>۴۸</td><td>$CO_2 + CO + H_2O$</td><td>۰/۰۶۵</td></tr> <tr> <td>زغال سنگ</td><td>۳۰</td><td>$SO_2 + CO_2 + NO_2 + CO + H_2O$</td><td>۰/۱۰۴</td></tr> </tbody> </table> آ) اثر گلخانه‌ای زغال سنگ و بنزین را با ذکر دلیل مقایسه کنید. ب) شست‌وشوی زغال‌سنگ به منظور حذف یا کاهش کدام آلاینده انجام می‌شود؟ پ) با توجه به گرمای آزاد شده از سوختن ۴/۴ گرم زغال‌سنگ، چند لیتر گاز کربن دی‌اکسید در STP تولید خواهد شد؟ $CO_2 = 44 \text{ g/mol}$	نام سوخت	گرمای آزاد شده (kJ/g)	فراورده های سوختن	مقدار کربن دی‌اکسید به ازای هر کیلوژول انرژی تولید شده (g)	بنزین	۴۸	$CO_2 + CO + H_2O$	۰/۰۶۵	زغال سنگ	۳۰	$SO_2 + CO_2 + NO_2 + CO + H_2O$	۰/۱۰۴	۱۵۴
نام سوخت	گرمای آزاد شده (kJ/g)	فراورده های سوختن	مقدار کربن دی‌اکسید به ازای هر کیلوژول انرژی تولید شده (g)												
بنزین	۴۸	$CO_2 + CO + H_2O$	۰/۰۶۵												
زغال سنگ	۳۰	$SO_2 + CO_2 + NO_2 + CO + H_2O$	۰/۱۰۴												
۱	آ) فراریت ب) ظرف ۲: چون فراریت کمتری دارد و در نتیجه کربن بیشتر و گرانی‌تری بیشتری دارد.	آ) شکل‌های زیر کدام ویژگی و رفتار فیزیکی آلکان‌های راست زنجیر را نشان می‌دهد؟  ب) کدام ظرف (۱ یا ۲) مقاومت بیشتری در برابر جاری شدن دارد؟ چرا؟	۱۵۵												
۱	آ) $C_{18}H_{38}$, $2n+2=38 \Rightarrow n=18$ ب) دمای جوش این آلکان (گریس) از اوکتان به دلیل کربن زیاد، بیشتر است.	آ) فرمول مولکولی آلکانی را بیابید که دارای ۳۸ اتم هیدروژن باشد؟ ب) با ذکر دلیل دمای جوش این ماده را نسبت به اوکتان، مقایسه کنید؟	۱۵۶												
۰/۷۵	آ) ۱ ب) فرمول پیوند-خط  فرمول مولکولی: C_7H_{16}	دانش آموزی، آلکانی را به شکل‌های زیر نامگذاری کرده است. ۱) ۳-متیل‌هگزان ۲) ۳-متیل‌هگزن ۳) ۲-اتیل‌پنتان آ) کدام نام، جهت نامگذاری این آلکان درست است؟ ب) (فرمول مولکولی) و (فرمول پیوند-خط) این ماده را بنویسید؟	۱۵۷												

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	آ) نادرست- دسته ای از آلکن ها هستند ب) درست پ) نادرست -از سوزاندن گاز اتین ت) درست	درستی یا نادرستی عبارت ها را مشخص کنید و در صورت نادرست بودن، شکل درست آن را بنویسید. آ) پلیمری شدن دسته دیگری از واکنش آلکان ها است. ب) بنزن هیدروکربنی سیر نشده و سرگروه خانواده مهمی از هیدروکربن ها به نام آروماتیک است پ) در جوشکاری و برش کاری فلزها از سوزاندن گاز اتن ،دمای لازم برای جوش دادن قطعه های فلزی تامین می شود ت) گرانروی گریس ، کمتر از گرانروی وازلین است.	۱۵۸
۱	در هر دو ظرف به یک اندازه و در شرایط یکسان برم مایع اضافه می کنیم هر کدام که باعث بی رنگ شدن برم شد اتن است زیرا اتن سیر نشده است و با برم وارد واکنش می شود اما اتان سیر شده است و واکنش نمی دهد	در دو ظرف جداگانه دو هیدرو کربن اتان و اتن داریم با طراحی یک آزمایش مشخص کنید هر ظرف حاوی کدام ماده است؟	۱۵۹

استان کردستان - صفحات ۲۹ تا ۴۸											
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره								
۱۶۰	با توجه به ترکیب‌های داده شده زیر به سوالات پاسخ دهید: <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>$(CH_3)_7CC(C_6H_5)_7CH(CH_3)_7$</td><td>B</td><td> $\begin{array}{c} CH_3 \quad \quad CH_3 \\ \quad \quad \\ CH_3-CH-CH_2-C-CH_2-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array}$ </td></tr> <tr> <td>C</td><td>  </td><td>D</td><td>  </td></tr> </table> (آ) نام ترکیب‌های A و B را بنویسید. (ب) ترکیب C به کدام خانواده از هیدروکربن‌ها تعلق دارد؟ همچنین نام این ترکیب چیست؟ (پ) درصد جرمی کربن را در ترکیب D به دست آورید.	A	$(CH_3)_7CC(C_6H_5)_7CH(CH_3)_7$	B	$ \begin{array}{c} CH_3 \quad \quad CH_3 \\ \quad \quad \\ CH_3-CH-CH_2-C-CH_2-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array} $	C		D		(آ) A: ۳،۳-دی اتیل، ۲،۲،۴-تری متیل پنتان B: ۴،۴،۴-تری متیل هگزان (ب) آروماتیک - نفتالن (پ) $\text{درصد جرمی کربن} = \frac{12 \times 10}{(12 \times 10) + 22} \times 100 = 84.5\%$	۲/۲۵
A	$(CH_3)_7CC(C_6H_5)_7CH(CH_3)_7$	B	$ \begin{array}{c} CH_3 \quad \quad CH_3 \\ \quad \quad \\ CH_3-CH-CH_2-C-CH_2-CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array} $								
C		D									
۱۶۱	(آ) واکنش داده شده را کامل کنید. $ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 = \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} + Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3} \dots\dots\dots $ (ب) مقدار ۴/۲ گرم از هیدروکربن اولیه با چند گرم گاز کلر اشباع (سیر) می‌شود؟ (پ) درصد جرمی کلر را در محصول واکنش به دست آورید. ($Cl = 35.5$, $C = 12$, $H = 1$: g.mol⁻¹)	(آ) (ب) $g\ Cl_2 = \frac{4}{2} g\ C_6H_{12} \times \frac{1\ mol\ C_6H_{12}}{84\ g\ C_6H_{12}} \times \frac{1\ mol\ Cl_2}{1\ mol\ C_6H_{12}} \times \frac{71\ g}{1\ mol\ Cl_2} = 3.5\ g$ (پ) $\text{درصد جرمی کلر} = \frac{71}{84+71} \times 100 = 45.8\ \%$	۱/۷۵								

۱/۷۵	$C_7H_8 + F_2 \rightarrow C_7H_8F_2$ $g_{C_7H_8F_2} = 1 \text{ mol } C_7H_8 \times \frac{1 \text{ mol } C_7H_8F_2}{1 \text{ mol } C_7H_8} \times \frac{66 g_{C_7H_8F_2}}{1 \text{ mol } C_7H_8F_2} = 66 g_{C_7H_8F_2}$ $80 = \frac{x}{66} \times 100 \rightarrow x = 52/8 g_{C_7H_8F_2}$	جرم فراورده تولید شده در واکنش کامل یک مول اتن در واکنش زیر با بازده ۸۰ درصد را حساب کنید. $F = 19, H = 1, C = 12 \text{ g/mol}$ $C_7H_8(g) + F_2(g) \rightarrow$	۱۶۴
۱	در لوله آزمایش A پنتان و در دیگری پنتن وجود دارد زیرا آلکن ها سیر نشده و با محلول برم واکنش می دهند.	دو لوله آزمایش مطابق شکل زیر محتوی پنتان و پنتن است؛ با افزودن محلول برم به هر کدام تغییرات زیر رخ داده است. توضیح دهید که در هر لوله آزمایش کدام ماده وجود دارد؟ 	۱۶۵
۰/۷۵	CH_2Br-CH_2Br (آ) (ب) ۱ و ۲ دی برمواتان	$CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow$ (آ) واکنش رو به رو را کامل کنید. (ب) نام فراورده را بنویسید.	۱۶۶
۱/۲۵	$C_{16}H_{34}$ (آ) (ب) $C_{10}H_{22}$ زیرا فرارتر است. (پ) 	شکل زیر حجم های یکسانی از دو آلکان را در دمای ۲۵°C نشان می دهد؛ با توجه به آن به موارد زیر پاسخ دهید. (آ) در شرایط یکسان گلوله در کدام آلکان، دیرتر به ته ظرف می رسد؟ (ب) بعد از گذشت مدتی ، حجم کدام یک در تماس با هوا بیشتر کاهش می یابد؟ چرا؟ (پ) فرمول پیوند- خط، ایزومری از $C_{10}H_{22}$ به نام ۳- اتیل- ۲- متیل هپتان را رسم کنید. 	۱۶۷

استان قم - صفحات ۵۱ تا ۶۲			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱۶۸	اگر انرژی گرمایی ماده اتانول در دو ظرف A و B در شکل زیر برابر باشد، دمای محلول در کدام ظرف بیشتر است؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید. 	ظرف B انرژی گرمایی به مقدار یک ماده و دمای آن بستگی دارد ظرف B مقدار اتانول کمتری دارد پس دمای بیشتری دارد که انرژی گرمایی آن با ظرف A برابر شده است.	۰/۷۵
۱۶۹	برای هر یک از موارد زیر دلیل بنویسید. (آ) انرژی گرمایی یک استخر آب با دمای ۲۵ °C، بیشتر از یک فنجان آب با دمای ۶۰ °C است. (ب) توزیع انرژی جنبشی بین همه ذرات یک ماده یکسان و یکنواخت نیست.	(آ) چون انرژی گرمایی آب به مقدار و دما بستگی دارد و مقدار آب استخر بسیار بیشتر از مقدار آب فنجان است. (ب) چون ذرات ماده دائم در حال حرکتند و در اثر برخورد به یکدیگر انرژی جنبشی ذرات تغییر می کند.	۱
۱۷۰	۴ نمونه ۵۰ گرمی از ۴ مایع مختلف بی رنگ در ۴ بشر با دمای اولیه ۲۵ °C قرار داده شده اند. هر یک با حرارت دادن، ۴۵۰ J گرما جذب می کند، دمای نهایی هر بشر در زیر نشان داده شده است. بشرهای A, B, C, D را به ترتیب افزایش ظرفیت گرمایی ویژه مرتب کرده و برای پاسخ خود دلیل بیاورید. 	$A > C > D > B$ ظرفیت گرمایی ویژه کمتر میزان تغییر دمای ماده بیشتر است.	۱


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۲۵	$C = \frac{Q}{m\Delta\theta} = \frac{۱۰۰/۸J}{۵۶g \times ۴^{\circ}C} = ۰/۴۵J.g^{-1}.^{\circ}C^{-1}$ (آ) (ب) کمتر زیرا ظرفیت گرمایی ویژه گرافیت بیشتر از آهن است و ظرفیت گرمایی ویژه با تغییرات دما رابطه وارونه دارد. (C ^{-۱} .J.g ^{-۱} .°C=۰/۷۲J.g ^{-۱} .°C ^{-۱})	۱۷۱													
۲	(آ) مس به آهن (ب) آهن ۳/۶۹ مس ۱۰۶/۴۶ $Q = mc\Delta\theta$ $\Delta\theta = ۲۰ \times ۰/۳۸۷ \times (\theta_f - ۱۰۰) = ۱۰۶/۴۶ J : Cu$ $\Delta\theta = ۳۰ \times ۰/۴۵۱ \times (\theta_f - ۰) = ۳/۶۹ ^{\circ}C : Fe$ (پ) ظرف مسی چون ظرفیت گرمایی ویژه آن کمتر از آهن است با جذب گرمای یکسان تغییر دمای مس بیشتر از آهن است و غذا در آن زودتر پخته می‌شود.	مشخصات دو پرچ آهنی و مسی در جدول زیر داده شده است: <table><tr><th>مشخصات</th><th>آهن</th><th>مس</th></tr><tr><td>جرم (g)</td><td>۳۰</td><td>۲۰</td></tr><tr><td>دمای اولیه (°C)</td><td>۰</td><td>۱۰۰</td></tr><tr><td>c(J.g^{-۱}.°C^{-۱})</td><td>۰/۴۵۱</td><td>۰/۳۸۷</td></tr></table> (آ) اگر این دو پرچ را به هم متصل کنند، گرما از آهن به مس یا از مس به آهن جریان می‌یابد؟ (ب) اگر به هر یک مقدار گرمای یکسان J ۵۰ داده شود دمای نهایی هر یک را حساب کنید. (پ) در کدام ظرف غذا بهتر پخته می‌شود، ظرف مسی یا ظرف آهنی؟ چرا؟	مشخصات	آهن	مس	جرم (g)	۳۰	۲۰	دمای اولیه (°C)	۰	۱۰۰	c(J.g ^{-۱} .°C ^{-۱})	۰/۴۵۱	۰/۳۸۷	۱۷۲
مشخصات	آهن	مس													
جرم (g)	۳۰	۲۰													
دمای اولیه (°C)	۰	۱۰۰													
c(J.g ^{-۱} .°C ^{-۱})	۰/۴۵۱	۰/۳۸۷													

استان قزوین - صفحات ۵۱ تا ۶۲			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱۷۳	مقدار گرمای آزاد شده از کاهش دمای ۱ Kg آهن از ۱۲۵°C به ۲۵°C توسط ۲ Kg آب جذب می شود تا دمای آن از ۲۰°C به ۲۵°C برسد. نسبت گرمای ویژه آب به گرمای ویژه آهن را حساب کنید.	$ Q_{\text{آهن}} = Q_{\text{آب}} \rightarrow mc_{\text{آب}}\Delta\theta = mc_{\text{Fe}}\Delta\theta $ $ 1000g \times c_{\text{Fe}} \times (25 - 125) = 2000g \times c_{\text{آب}} \times (25 - 20) $ $\frac{c_{\text{آب}}}{c_{\text{Fe}}} = 10$ هرگاه دو جسم با دو دمای مختلف در تماس با یکدیگر قرار گیرند، مقدار گرمایی که جسم داغ از دست می دهد برابر مقدار گرمایی است که جسم سرد دریافت می کند تا در نهایت دمای دو جسم برابر شود. (در صورتی که از اتلاف انرژی صرف نظر کنیم)	۱
۱۷۴	مورد نادرست را یافته و علت نادرستی آن را شرح دهید. (آ) ذره های سازنده یک ماده در هر سه حالت فیزیکی جامد مایع و گاز پیوسته در حال جنب و جوش هستند. (ب) جنبش های نامنظم ذره های سازنده یک ماده در حالت گاز شدیدتر از حالت مایع بوده و با دما رابطه مستقیم دارد. (پ) دمای یک ماده معیاری برای توصیف میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن است. (ت) انرژی گرمایی یک نمونه ماده کمیتی است که تنها به جرم ماده بستگی داشته و دما تاثیری بر آن ندارد.	مورد (ت) نادرست است، انرژی گرمایی یک نمونه ماده کمیتی است که هم به دما و هم به جرم ماده بستگی دارد.	۰/۵
۱۷۵	درستی و یا نادرستی عبارات را مشخص کرده و علت مورد یا موارد نادرست را شرح دهید. (آ) تجربه های خوشایند داغی یا خنکی نوشیدنی ها قطعاً نشانه ای از تفاوت میان انرژی گرمایی آنهاست.	موارد (آ) و (پ) صحیح نیستند. (آ) تجربه های خوشایند داغی یا خنکی نوشیدنی ها نشانه ای از تفاوت میان دمای آنهاست.	۱/۵


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


	(ب) در دمای ثابت داد و ستد انرژی می تواند بین سامانه و محیط پیرامون انجام بگیرد. (پ) در فرایندهای گرماده انرژی از سامانه به محیط منتقل می شود و دمای سامانه افزایش می یابد. (ت) در واکنش های گرماگیر نماد گرما (Q) سمت مواد واکنش دهنده قرار دارد.	
۱۷۶	چند مورد از مطالب زیر در مورد آب با دمای ۶۰ و چوب با دمای ۲۰ درست است؟ علت رد یا قبول عبارت را بنویسید. (آ) انرژی گرمایی آب قطعاً بیشتر از انرژی گرمایی چوب است. (ب) آب گرم تر از چوب است. (پ) اگر این دو ماده کنار یکدیگر قرار بگیرند قطعاً دمای هر دو ۴۰ خواهد شد. (ت) میانگین انرژی جنبشی ذرات آب قطعاً بیشتر از چوب است.	موارد «ب» و «ت» صحیح هستند. (آ) انرژی گرمایی یک جسم به جرم آن نیز وابسته است که با توجه به این که اطلاعاتی در مورد جرم ها نداریم انرژی گرمایی آب می تواند بیشتر یا کمتر از چوب باشد. (ب) دمای آب بیشتر از چوب است پس آب گرم تر از چوب می باشد. (پ) بسته به جرم های آب و چوب دمای تعادلی هر مقداری بین ۲۰ تا ۶۰ می تواند باشد بنابراین هیچ لزومی ندارد دمای تعادلی برابر ۴۰ شود. (ت) دما توصیفی برای میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده ماده است، پس میانگین انرژی جنبشی ذرات آب بیشتر از میانگین انرژی جنبشی ذرات چوب است.
۱۷۷	اگر برای افزایش دمای یک قطعه آهن به میزان ۲۰ درجه سلسیوس، ۳/۵۱ کیلوژول انرژی لازم باشد، جرم این قطعه آهن چند گرم است؟ (ظرفیت گرمایی ویژه آهن ۰/۴۵ ژول بر گرم در درجه سلسیوس است).	۰/۵ $Q = mc\Delta\theta$ $۳/۵۱ \times ۱۰۰۰ J = m \times ۰/۴۵ \times ۲۰$ $m = ۳۹۰ g$
۱۷۸	با توجه به شکل های مقابل پاسخ دهید. (آ) در کدام ظرف، دمای نهایی آب پس از افزودن حجم های مساوی آب، تغییر نمی کند؟ چرا؟ (ب) در مورد آب های ۳۵°C و ۶۰°C کدام عبارت زیر درست است؟ برای پاسخ خود دلیل بنویسید. (I) میانگین تندی مولکول ها در آب ۶۰°C بیشتر است. (II) مولکول های آب در هر دو ظرف انرژی جنبشی یکسانی دارند.	۱ (آ) ظرف (۱)، زیرا دمای آب در ظرف بزرگ ۳۵°C است. و دمای آب اضافه شده هم ۳۵°C است. بنابراین میانگین انرژی جنبشی مولکول های آب تغییر نمی کند. (ب) عبارت (I) درست است. هر چه دمای آب بیشتر باشد، میانگین تندی مولکول های آب بیشتر است.



۱/۵	آ) ماده B. زیرا شیب نمودار تغییر دمای آن کم تر است. (یا با جذب مقدار گرما معین، افزایش دمای آن کم تر است.) (ب) $Q = mc\Delta\theta \text{ یا } c = \frac{Q}{m\Delta\theta}$ $c = \frac{2J}{1g \times 10^{\circ}C} = 0.2 J.g^{-1}.^{\circ}C^{-1}$	به یک گرم از ماده A و یک گرم از ماده B، به یک میزان گرما می دهیم تا دمای آن ها افزایش یابد. نمودار رو به رو میزان افزایش دمای این اجسام را بر حسب گرمای داده شده نشان می دهد.  آ) ظرفیت گرمایی کدام ماده بیشتر است؟ دلیل بنویسید. ب) ظرفیت گرمایی ویژه ماده B را حساب کنید.	۱۷۹
۲	آ) $I_2(s) + Q \rightarrow I_2(g) \quad \Delta H > 0$ ب) $-810 KJ.mol^{-1}$ ، فرآیند تبخیر آب گرماگیر است. پس اگر به جای $H_2O(l)$ ، $H_2O(g)$ نوشته شود، مقداری از گرمای سوختن صرف تبخیر کردن آب می شود و گرمای کم تری آزاد می شود. (پ) $\text{گرمای } 36g = 36g \times \frac{1mol}{180g} \times \frac{2808KJ}{1mol} = 561.6KJ$	با توجه به معادله ترموشیمیایی واکنش های زیر، پاسخ دهید. ۱) $I_2(s) \rightarrow I_2(g)$:واکنش (۱) ۲) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$:واکنش (۲) ۳) $6CO_2(g) + 6H_2O(l) + 2808KJ \rightarrow C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$:واکنش (۳) آ) نماد Q را در معادله واکنش (۱) وارد کنید و علامت ΔH واکنش را مشخص کنید. ب) اگر ΔH واکنش (۲) برابر -890 کیلوژول بر مول باشد، ΔH واکنش زیر کدام عدد می تواند باشد؟ دلیل بنویسید. ۱) $-890 KJ.mol^{-1}$ (۱) $-810 KJ.mol^{-1}$ (۲) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ پ) در واکنش (۳) برای تولید ۳۶ گرم گلوکز خالص، به چند کیلوژول انرژی نیاز است؟ ($C_6H_{12}O_6 = 180g.mol^{-1}$)	۱۸۰

۱/۵	(a) انرژی گرمایی افزایش یافته است. (b) میانگین انرژی جنبشی اتم های آرگون هم افزایش یافته است. (c) دما هم افزایش یافته است. (ب) گرماده. مقداری گرما آزاد شده و از سامانه وارد محیط (اتم های آرگون) شده و باعث افزایش انرژی جنبشی ذرات محیط شده است.	مطابق شکل، یک ظرف فلزی را درون ظرف بزرگ تری که از گاز آرگون پر شده است، قرار داده ایم. با انجام یک واکنش شیمیایی درون ظرف فلزی، اتم های آرگون پیرامون ظرف فلزی، پیش و پس از انجام واکنش نشان داده شده اند. (آ) با انجام واکنش درون ظرف فلزی، هر یک از کمیت های زیر برای گاز آرگون پیرامون ظرف چه تغییری کرده است؟ (a) انرژی گرمایی (b) میانگین انرژی جنبشی (c) دما (ب) واکنش انجام شده درون ظرف، گرماده بوده است یا گرماگیر؟ دلیل بنویسید.	۱۸۱
۱/۵	$NO = 1(14) + 1(16) = 30 g \cdot mol^{-1}$ $?J = 12mgNO \times \frac{1gNO(g)}{1000mg NO(g)} \times \frac{1molNO(g)}{30gNO} \times \frac{+180KJ}{2molNO(g)} \times \frac{1000J}{1KJ} = +36J$ روزانه به ۳۶J گرما نیاز دارد.	گاز نیتروژن مونو اکسید (NO) یکی از آلاینده های محیط زیست است که در اگزوز اتومبیل طبق واکنش زیر تولید می شود. اگر یک اتومبیل روزانه ۱۲ میلی گرم NO تولید کند، روزانه چند ژول گرما نیاز دارد؟ ($1molN_2 = 28gN_2$) $N_2(g) + O_2(g) + 180KJ \rightarrow 2NO(g)$	۱۸۲

استان فارس - صفحات ۵۱ تا ۶۲				
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره	
۱۸۳	با توجه به جدول زیر به سوالات مطرح شده پاسخ دهید. تذکر: ارزش سوختی چربی برابر با ۳۸ کیلوژول بر گرم و ارزش سوختی کربوهیدرات و پروتئین با هم برابر است و ارزش سوختی هر کدام برابر با ۱۷ کیلوژول بر گرم است. سایر مواد فاقد ارزش سوختی هستند.	آ) ارزش سوختی مغز گردو $\left(\frac{14g(\text{کربوهیدرات})}{100g(\text{جرم کل})} \times \frac{17KJ}{1g(\text{کربوهیدرات})} \right) + \left(\frac{65g(\text{چربی})}{100g(\text{جرم کل})} \times \frac{38KJ}{1g(\text{چربی})} \right) + \left(\frac{15g(\text{پروتئین})}{100g(\text{جرم کل})} \times \frac{17KJ}{1g(\text{پروتئین})} \right) = 29.63KJ.g^{-1}$ ب) ارزش غذایی ماکارونی $100g(\text{جرم کل}) \times \left(\left(\frac{76.5g(\text{شکر})}{100g(\text{جرم کل})} \times \frac{17KJ}{1g(\text{شکر})} \right) + \left(\frac{1.5g(\text{چربی})}{100g(\text{جرم کل})} \times \frac{38KJ}{1g(\text{چربی})} \right) + \left(\frac{13g(\text{پروتئین})}{100g(\text{جرم کل})} \times \frac{17KJ}{1g(\text{پروتئین})} \right) \right) = 1578.5KJ.100g^{-1}$ $1578.5KJ.100g^{-1} \times \frac{1Kcal}{4.184KJ} = 377.27Kcal.100g^{-1}$	۱/۷۵	
	آ) ارزش سوختی مغز گردو (برحسب کیلوژول بر گرم) محاسبه نمایید. ب) ارزش غذایی ماکارونی (بر حسب کیلوکالری به ازای ۱۰۰ گرم ماکارونی) محاسبه نمایید. ۱ kcal = ۴/۱۸۴ kJ	پ) ماکارونی - زیرا میزان درصد کربوهیدرات آن بیشتر است. کربوهیدرات سریع تر اکسایش می یابد و سریع تر انرژی آزاد می سازد.	۰/۷۵	
	ت) مصرف کدام خوراکی را برای فعالیت های فیزیکی که در مدت زمان طولانی تر انجام می شود مناسب می دانید؟ چرا؟	ت) مغز گردو - زیرا میزان چربی موجود در آن بیشتر است و چربی ها علاوه بر ارزش سوختی بیشتر در مدت زمان طولانی تر در سوخت و ساز شرکت می کنند و کم کم انرژی خود را آزاد می سازند.	۰/۷۵	
	ث) اگر یک فرد ۷۵ کیلوگرمی به طور هم زمان ۳۰ گرم ماکارونی و ۲۰ گرم مغز گردو خورده باشد برای مصرف انرژی حاصل از آن چه مدت باید پیاده روی نماید؟ (آهنگ مصرف انرژی در پیاده روی را ۲۰۰ کیلو کالری بر ساعت در نظر بگیرید.)	ث)	۱/۵	


	$\left(30 \times \frac{15 / 785 \text{ kJ}}{1 \text{ g}} \right) + \left(20 \times \frac{29 / 63 \text{ kJ}}{1 \text{ g}} \right) = 1066 / 15 \text{ kJ}$ $1066 / 15 \text{ kJ} \times \frac{1 \text{ kcal}}{4 / 184 \text{ kJ}} \times \frac{1 \text{ h}}{20 \cdot \text{kcal}} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} = 76 / 44 \text{ min} \approx 1 \text{ h}, 17 \text{ min}$	
۱/۵	جسم جامد و خالص A به جرم ۵۰ گرم را توسط یک گرمکن الکتریکی با آهنگ ثابت تولید انرژی ۲۰ ژول بر ثانیه گرما می‌دهیم. نمودار دما- زمان آن به صورت زیر است. (مقدار ۲۰٪ انرژی الکتریکی تولیدی گرمکن الکتریکی به هدر می‌رود.) (آ)  (ب) Q = mcΔθ $300 \text{ s} \times \frac{20 \text{ J}}{1 \text{ s}} \times \frac{10}{100} = 50 \text{ g} \times c \times (80 - 20)^\circ \text{C}$ $c = 1 / 6 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ \text{C}^{-1}$ $50 \text{ g} \times 1 / 6 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ \text{C}^{-1} = 80 \text{ J} \cdot ^\circ \text{C}^{-1}$	۱۸۴
۱/۵	$1 \text{ mol}(\text{N-H}) \times \left(\frac{1 \text{ mol}(\text{NH}_3)}{3 \text{ mol}(\text{N-H})} \right) \times \left(\frac{17 \text{ g}(\text{NH}_3)}{1 \text{ mol}(\text{NH}_3)} \right) \times \left(\frac{276 \text{ KJ}}{4 \text{ g}(\text{NH}_3)} \right) = 391 \text{ KJ}$ $\Delta H_{(\text{N-H})} = 391 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	۱۸۵

۲	$\left(n \text{ mol}(\text{CH}_4) \times \left(\frac{800 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}(\text{CH}_4)} \right) \right) + \left((4-n) \text{ mol}(\text{C}_3\text{H}_8) \times \left(\frac{2200 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}(\text{C}_3\text{H}_8)} \right) \right) = 6000 \text{ kJ} \Rightarrow n=2$ $\rightarrow \text{mol C}_3\text{H}_8 = 4 - 2 = 2$ $2 \text{ mol CH}_4 \times \frac{16 \text{ g}}{1 \text{ mol CH}_4} = 32 \text{ g CH}_4$ $2 \text{ mol C}_3\text{H}_8 \times \frac{44 \text{ g}}{1 \text{ mol C}_3\text{H}_8} = 88 \text{ g C}_3\text{H}_8$ $\%(\text{CH}_4) = \frac{32 \text{ g}}{(32+88) \text{ g}} \times 100 = \%26.67$ $\left\{ \begin{aligned} \%(\text{CH}_4) &= \frac{(2 \text{ mol} \times 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})}{(2 \text{ mol} \times 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) + (2 \text{ mol} \times 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})} \times 100 = \%26.67 \end{aligned} \right\}$	مخلوطی شامل گازمتان و پروپان به میزان ۴ مول به طور کامل سوزانده ایم. سرانجام مقدار ۶۰۰۰ کیلوژول گرما در فشار ثابت حاصل شده است. درصد جرمی گاز متان در مخلوط اولیه را محاسبه نمایید. (آنتالپی سوختن گاز متان و پروپان در این شرایط به ترتیب برابر با ۸۰۰- و ۲۲۰۰- کیلوژول بر مول است.)	۱۸۶
۲	در الماس هر اتم کربن نیمی از هر پیوند C-C حساب می شود و از آن سهم دارد. از آنجایی که هر اتم کربن به ۴ اتم دیگر با پیوند یگانه متصل است، پس سهم هر اتم کربن دو پیوند C-C است. $4 \times \frac{1}{2} = 2$ $96 \text{ g C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12 \text{ g C}} \times \frac{700 \text{ kJ}}{1 \text{ mol C}} = 5600 \text{ kJ}$ $96 \text{ g C} \times \frac{1 \text{ mol C}}{12 \text{ g C}} \times \frac{2 \text{ mol}_{\text{پیوند}}}{1 \text{ mol C}} \times \frac{400 \text{ kJ}}{1 \text{ mol}_{\text{پیوند}}} = 6400 \text{ kJ}$ $5600 + 6400 = 12000 \text{ kJ}$	الماس یک آلوتروپ (دگرشکل) کربن به شمار می رود. این ماده ساختاری یکپارچه دارد به طوری که در این ساختار هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به چهار اتم کربن دیگر متصل است.  هرگاه آنتالپی تصعید الماس برابر با ۷۰۰+ و آنتالپی پیوند C-C برابر با ۴۰۰+ کیلوژول برمول فرض شود، برای شکستن کامل همه پیوندهای موجود در ۹۶ گرم الماس جامد به چند کیلوژول گرما در فشار ثابت نیاز است؟ $C(s, \text{الماس}) + 700 \text{ kJ} \rightarrow C(g, \text{الماس})$	۱۸۷


۲	(آ) بستنی (۳۷ °C) → گرما + بستنی (۰ °C)  (ب) گرما + فراورده ها (۳۷ °C) → بستنی (۳۷ °C) 	ضمن نوشتن الگوی نوشتاری، نمودار تغییر انرژی را برای فرایندهای زیر رسم کنید: (آ) فرایند هم دما شدن بستنی در بدن (ب) فرایند گوارش و سوخت و ساز بستنی در بدن	۱۸۸
۱/۷۵	(آ) $\begin{aligned} \text{C(s)} + 700 \text{ kJ} &\rightarrow \text{C(g)} \\ 2\text{H}_2\text{(g)} + 872 \text{ kJ} &\rightarrow 4\text{H(g)} \\ \text{C(g)} + 4\text{H(g)} &\rightarrow \text{CH}_4\text{(g)} + 1660 \text{ kJ} \\ \hline \text{C(s)} + 2\text{H}_2\text{(g)} &\rightarrow \text{CH}_4\text{(g)} + 88 \text{ kJ} \end{aligned}$ (ب) $4\text{g}(\text{CH}_4) \times \frac{1\text{mol}(\text{CH}_4)}{16\text{g}(\text{CH}_4)} \times \frac{88\text{kJ}}{1\text{mol}(\text{CH}_4)} = 22\text{kJ}$	با توجه به این که آنتالپی تصعید گرافیت ۷۰۰+ و میانگین آنتالپی پیوند C-H برابر با ۴۱۵+ و آنتالپی پیوند H_۲ را ۴۳۶+ کیلوژول بر مول می باشد. (آ) آنتالپی تشکیل مولی متان از گرافیت جامد و گاز هیدروژن را محاسبه نمایید. $\text{C(s)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CH}_4\text{(g)} \quad \Delta H = ?$ (ب) در همین شرایط تحت فشار ثابت همراه با تولید ۴ گرم متان چند کیلوژول گرما مبادله می کند؟	۱۸۹

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	$C_2H_2 \xrightarrow[b-a]{+CH_2} C_3H_4 \xrightarrow[b-a]{+CH_2} C_4H_6 \xrightarrow[b-a]{+CH_2} C_5H_8$ $a \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)} \quad b \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)} \quad x \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$ $x = a + 3(b-a) \Rightarrow x = 3b - 2a \Rightarrow \text{Fuel value} = \frac{3b - 2a}{68} \text{ kJ.g}^{-1}$	هرگاه تحت فشار ثابت از سوختن کامل یک مول اتین و یک مول پروپین به ترتیب a و b کیلوژول گرما حاصل شده باشد ارزش سوختی ۱-پنتین بر حسب پارامترهای a و b را محاسبه نمایید.	۱۹۰
۱	گزینه یک صحیح است. مطابق رابطه $Q=mc\Delta\theta$ وقتی جرم ها مساوی هستند، به ازای گرمای یکسانی که دو جسم دریافت می کنند، آن جسمی که گرمای ویژه کمتری دارد (جسم A) افزایش دمای بیشتری خواهد داشت. پس اگر نسبت $\frac{Q}{\Delta\theta}$ یعنی شیب نمودار را بنویسیم: $\frac{Q}{\Delta\theta} = mc \xrightarrow{c_A < c_B} \left(\frac{Q}{\Delta\theta}\right)_A < \left(\frac{Q}{\Delta\theta}\right)_B$ یعنی شیب نمودار مربوط به A کمتر از شیب نمودار مربوط به B می باشد.	به دو جسم A و B به جرم های مساوی، مقدار گرماهای یکسانی داده ایم. اگر ظرفیت گرمایی ویژه جسم A کمتر از ظرفیت گرمایی ویژه جسم B باشد، نمودار تغییرات گرما (Q) بر حسب تغییرات دما کدام یک است؟ با ذکر دلیل	۱۹۱
۱/۵	$Q = 180 \text{ s} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{3 \text{ kJ}}{1 \text{ min}} \times \frac{1000 \text{ J}}{1 \text{ kJ}} = 9000 \text{ J}$ $m = \frac{Q}{c\Delta\theta} = \frac{9000 \text{ J}}{(0.5 \text{ J.g}^{-1}.\text{°C}^{-1}) \times (45\text{°C})} = 400 \text{ g}$	نمودار تغییرات دما بر حسب زمان جسمی مطابق شکل زیر است و در هر دقیقه ۳ kJ گرما به جسم داده می شود. جرم این جسم چند گرم است؟ ($c = 0.5 \text{ J.g}^{-1}.\text{°C}^{-1}$)	۱۹۲

شهرستان های استان تهران - صفحات ۶۲ تا ۶۷			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۱۹۳	اگر ضمن تشکیل یک مول گاز آمونیاک، آنتالپی به اندازه ۴۶ kJ کاهش یابد. آنتالپی واکنش زیر را در جهت برگشت حساب کنید. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$	با توجه به صورت سوال داریم: $\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2}\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H = -46$ $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H = 2 * (-46) = -92$ $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +92$ بنابراین:	۱
۱۹۴	واکنش : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{180^\circ\text{C}} 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ در دو سامانه متفاوت زیر انجام شده است.  (آ) در کدام سامانه، گرمای واکنش ناشی از تفاوت انرژی گرمایی (مجموع انرژی جنبشی ذره-ها) در واکنش دهنده ها و فراورده ها است؟ چرا؟ (ب) در کدام سامانه، گرمای واکنش با علامت منفی گزارش می شود؟ چرا؟ (پ) آیا در سامانه ۲، گرمای واکنش با تغییر آنتالپی (ΔH) برابر است؟ چرا؟	(آ) هیچ کدام زیرا در دمای ثابت انجام شده است. (ب) هر دو زیرا واکنش سوختن، گرماده است. (پ) خیر - زیرا با انجام واکنش، شمار مول گاز در سامانه در بسته دو برابر شده و فشار افزایش یافته پس گرما در فشار ثابت آزاد نشده است یا $Q_p = \Delta H$ نداریم.	۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱۹۵	آ) آزمایشی را شرح دهید که با آن بتوان گرماده یا گرماگیر بودن انحلال یک ماده در آب را مشخص کرد. ب) چگونه می‌توانید تعیین کنید که انحلال یک ماده در آب باعث کاهش محتوای انرژی آن می‌شود یا افزایش محتوای انرژی آن؟	۱	آ) دمای اولیه آب را با دماسنج اندازه می‌گیریم و پس از انحلال ماده مورد نظر در آب نیز دما را چک می‌کنیم اگر دمای محلول افزایش یافت، انحلال گرماده است و اگر کاهش یافت انحلال گرماگیر است ب) اگر انحلال گرماگیر باشد محتوای انرژی محلول افزایش می‌یابد و اگر گرماده باشد، محتوای انرژی محلول کاهش می‌یابد.
۱۹۶	با توجه به نمودار مقابل که تغییرات انرژی را طی یک واکنش نشان می‌دهد از میان اعداد داده شده بر حسب کیلو ژول یک عدد را با ذکر دلیل برای واکنش‌های زیر انتخاب کنید. +۲۹۵۸ , -۲۹۵۸ , -۲۸۰۸ , +۲۸۰۸ , -۲۵۴۴ , +۲۵۴۴  آ) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ب) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ پ) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{s}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	۱/۵	آ) $\text{kJ } +2808$، زیرا عکس واکنش اولیه است پس علامت گرمای مبادله شده نیز عکس می‌شود و واکنش گرماگیر است. ب) $\text{kJ } -2544$، زیرا بخار آب تولید شده محتوای انرژی بیشتری از آب مایع دارد، پس مقدار گرمای کمتری آزاد می‌شود. پ) $\text{kJ } -2958$، کربن دی اکسید تولید شده در این واکنش، جامد است و محتوای انرژی کمتری از کربن دی اکسید گازی دارد، پس گرمای بیشتری نسبت به واکنش داده شده، آزاد می‌شود.
۱۹۷	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کرده و شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. آ) معادلهٔ ترموشیمیایی فرایند انجام‌شده در یخچال صحرایی، به‌صورت زیر است. $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 44/1 \text{ kJ}$ ب) تغییر آنتالپی هر واکنش، هم‌ارز با گرمایی است که در فشار ثابت با محیط پیرامون دادوستد می‌شود.	۱/۲۵	آ) نادرست – $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 44/1 \text{ kJ} \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ب) درست پ) درست ت) نادرست – در مولکول O_2 از عبارت آنتالپی پیوند استفاده می‌شود. ث) درست

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

		پ) واکنش گازی تبدیل N_2O_4 به NO_2، همانند واکنش تبدیل (گرافیت، C(s) به (الماس، C(s) یک فرایند گرماگیر است. ت) در مولکول‌هایی از قبیل NH_3 و O_2 و CH_4، به کار بردن میانگین آنتالپی پیوند، نسبت به آنتالپی پیوند، مناسب‌تر است. ث) انجام هریک از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی، با جذب یا از دست دادن گرما همراه است.	
۲	$61 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{44/1 \text{ kJ}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} = 149/45 \text{ kJ}$ $\text{گرمای جذب شده از آب درون کوزه} = \frac{149/45}{2} = 74/725 \text{ kJ}$ $Q = mc\Delta\theta \Rightarrow 74725 = (5000 - 61) \times 4/2 \times \Delta\theta$ $\Rightarrow \Delta\theta = \frac{74725}{4939 \times 4/2} = 3/6^\circ\text{C}$ آب درون کوزه ۳/۶ درجه سلسیوس خنک‌تر می‌شود.	کوزه، ظرفی سفالی است که ایرانیان از گذشته‌های دور برای نگهداری آب آشامیدنی از آن استفاده می‌کردند. فرایند تبخیر آب با معادله شیمیایی زیر نشان داده می‌شود: $\text{H}_2\text{O (l)} + 44/1 \text{ kJ} \rightarrow \text{H}_2\text{O (g)}$ درون کوزه‌ای ۵ کیلوگرم آب با دمای 30°C وجود دارد. اگر در مدت دو ساعت، ۶۱ گرم آب از روزنه‌های کوزه به بیرون نفوذ کرده و تبخیر شود، دمای آب درون کوزه چند درجه خنک‌تر می‌شود؟ (فرض کنید نیمی از گرمای لازم برای تبخیر آب، از آب درون کوزه جذب شده باشد. گرمای ویژه آب برابر $4/2 \text{ J.g}^{-1}.\text{C}^{-1}$ می‌باشد.)	۱۹۸
۰/۵	NH_4NO_3 - زیرا انحلال آن در آب گرماگیر است و محل آسیب‌دیدگی را سرد می‌کند.	اغلب ورزشکاران برای سرد کردن محل آسیب‌دیدگی از بسته‌های سرمازا استفاده می‌کنند. که دارای بسته کوچک آب به همراه مقداری جامد یونی است. با توجه به واکنش‌های زیر مشخص کنید در این بسته‌ها از کدام جامد یونی استفاده می‌شود؟ چرا؟ $\text{CaCl}_2 (\text{s}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow \text{Ca}^{2+} (\text{aq}) + 2\text{Cl}^{-} (\text{aq}) + 83 \text{ kJ}$ $\text{NH}_4\text{NO}_3 (\text{s}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) + 26 \text{ kJ} \rightarrow \text{NH}_4^{+} (\text{aq}) + \text{NO}_3^{-} (\text{aq})$	۱۹۹

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۷۵	آ) چون واکنش گرماده است سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده کمتر است بنابراین فراورده پایدارتر از واکنش دهنده می باشد. ب) چون واکنش گرماده می باشد $\Delta H < 0$ است. پ) گرما آزاد می شود $790/8 \text{ kJ} = 88 \text{ g CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{44 \text{ g CO}_2} \times \frac{395/4 \text{ kJ}}{1 \text{ mol CO}_2} = ? \text{ kJ}$	با توجه به واکنش زیر به سوالات پاسخ دهید. $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 395/4 \text{ kJ}$ آ) پایداری مواد واکنش دهنده و فراورده را با یکدیگر مقایسه کنید. (۰/۷۵) ب) علامت ΔH واکنش را معین کنید. (۰/۵) پ) در تولید ۸۸ گرم کربن دی اکسید چند کیلوژول انرژی مبادله می شود؟	۲۰۰				
۰/۷۵	آ) $\Delta H > 0$ ب) مصرف پ) مبادله شده	واژه مناسب برای هر جمله را از داخل جدول برداشته و در جای خالی قرار دهید (یک واژه اضافی است). <table border="1"> <tr> <td>مبادله شده</td> <td>$\Delta H > 0$</td> <td>مصرف</td> <td>Q_p منفی</td> </tr> </table> آ) هر واکنش در دما و فشار ثابت، آنتالپی معینی دارد که واکنش فتوسنتز نوعی سامانه با می باشد. ب) در یک واکنش، با تبدیل مولکول ها به اتم های جدا از هم، مقداری انرژی شده است. پ) گرمای شده در هر واکنش شیمیایی را به طور عمده وابسته به تفاوت میان انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده و فراورده می باشد.	مبادله شده	$\Delta H > 0$	مصرف	Q_p منفی	۲۰۱
مبادله شده	$\Delta H > 0$	مصرف	Q_p منفی				
۱	۱- نادرست، فرایند اکسایش گلوکز در بدن یک فرایند گرماده بوده که در آن $Q < 0$ است. ۲- درست ۳- نادرست، واکنش گرماده است و تغییرات گرمایی در آن صفر نیست ۴- نادرست، به تفاوت انرژی پتانسیل واکنش دهنده ها و فراورده ها بستگی دارد	کدام یک از موارد زیر درست است؟ (علت نادرستی موارد دیگر را مشخص کنید) ۱- فرایند اکسایش گلوکز در بدن یک فرایند گرماده بوده که در آن $\Delta H < 0$ است. ۲- انرژی پتانسیل و انرژی شیمیایی می توانند معنا و مفهوم یکسانی داشته باشند. ۳- اگر واکنش یک مول گاز کلر و یک مول گاز هیدروژن در دمای ثابت انجام شود تغییرات گرما در آن صفر است. ۴- گرمای جذب شده و آزاد شده در یک واکنش شیمیایی به طور عمده به تفاوت انرژی گرمایی میان واکنش دهنده ها و فراورده ها بستگی دارد.	۲۰۲				

استان تهران - صفحات ۶۲ تا ۶۷			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۰۳	جاهای خالی را با انتخاب واژه درست از واژه‌های داده شده کامل کنید. (میانگین، مجموع، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، دمای، کمتر، بیشتر) (آ) انرژی گرمایی، انرژی جنبشی ذره‌های سازنده یک نمونه ماده می‌باشد. (ب) گرمای مبادله شده در هر واکنش به طور عمده مربوط به تفاوت مواد واکنش‌دهنده و فرآورده است. (پ) در واکنش شیمیایی گرماگیر، مواد با آنتالپی به مواد با آنتالپی تبدیل می‌شود.	(آ) مجموع (ب) انرژی پتانسیل (پ) کمتر - بیشتر	۱
۲۰۴	اگر انرژی گرمایی دو نمونه از گاز هیدروژن با هم برابر باشد ذرات سازنده این دو نمونه گاز، با هم برابر است. (آ) میزان جنب و جوش و میانگین سرعت (ب) میزان سردی و گرمی (پ) مجموع انرژی جنبشی (ت) میانگین انرژی جنبشی	گزینه پ	۰/۲۵
۲۰۵	دو ظرف زیر که هر دو محتوی آب هستند را در نظر بگیرید و به پرسش‌ها پاسخ دهید. موارد خواسته شده را با ذکر دلیل با هم مقایسه کنید. (آ) میانگین انرژی جنبشی ذرات (ب) ظرفیت گرمایی (پ) ظرفیت گرمایی ویژه 	(آ) ظرف ۲ بیشتر است زیرا دمای بالاتری دارد. (ب) ظرف ۲ ظرفیت گرمایی بالاتری دارد زیرا مقدار آب بیشتری دارد. (پ) ظرفیت گرمایی ویژه هر دو برابرند زیرا نوع ماده در هر دو ظرف یکسان است.	۱/۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱	با توجه به نمودار انرژی داده شده که مربوط به اکسایش گلوکز در دمای ثابت می باشد، به پرسش ها پاسخ دهید. آ) میانگین انرژی جنبشی مواد واکنش دهنده و فراورده را با ذکر دلیل با هم مقایسه کنید. ب) گرمای مبادله شده در این واکنش ناشی از چیست؟ پ) علامت Q را در این واکنش تعیین کنید.	با توجه به نمودار انرژی داده شده که مربوط به اکسایش گلوکز در دمای ثابت می باشد، به پرسش ها پاسخ دهید. آ) میانگین انرژی جنبشی مواد واکنش دهنده و فراورده را با ذکر دلیل با هم مقایسه کنید. ب) گرمای مبادله شده در این واکنش ناشی از چیست؟ پ) علامت Q را در این واکنش تعیین کنید.
۰/۵	آ) فراورده ها پایدارترند ب) منفی	با توجه به معادله زیر به سوالات پاسخ دهید: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) + 484 kJ$ آ) پایداری واکنش دهنده ها و فراورده ها را مقایسه کنید. ب) علامت Q را در این واکنش تعیین کنید.
۱	آ) چون دگرشکل ۱ پایدارتر بوده، سطح انرژی آن نسبت به دگرشکل ۲ پایین تر است. ب) با توجه به اینکه محصول دو واکنش یکسان است داریم: $Q = 393/5 + 1/9 = 395/4 kJ$	عنصر X دارای دو دگرشکل است. به صورتی که واکنش سوختن هر دو دگرشکل منجر به تولید گاز XO_2 می شود با توجه به واکنش سوختن این دو دگرشکل به سوالات پاسخ دهید. $X(s, \text{دگرشکل ۱}) + O_2(g) \rightarrow XO_2(g) + 393.5 kJ$ $X(s, \text{دگرشکل ۲}) + O_2(g) \rightarrow XO_2(g) + Q$ آ) اگر دگرشکل ۱ به میزان ۱/۹ کیلوژول از دگرشکل ۲ پایدارتر باشد، سطح انرژی دگرشکل های عنصر X را مقایسه کنید. ب) با توجه به اطلاعات قسمت الف گرمای آزاد شده در اثر سوختن دگرشکل ۲ را به دست آورید؟


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲۰۹	واکنش‌های زیر در دمای °C ۲۵ و فشار ۱ atm انجام شده‌اند. $1) \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H_1 = -1368 \text{ kJ}$ $2) \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(g) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H_2 = ? \text{ kJ}$ $3) \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(g) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(g) \quad \Delta H_3 = ? \text{ kJ}$ $4) \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(g) \quad \Delta H_4 = 38/6 \text{ kJ}$ $5) \text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g) \quad \Delta H_5 = 44/1 \text{ kJ}$ (آ) گرمای آزاد شده در واکنش‌های ۱ و ۲ را مقایسه کنید. (ب) ΔH واکنش ۳ را حساب کنید.	۱/۵	(آ) در واکنش ۱ و ۲ تفاوت در حالت فیزیکی اتانول است. سطح انرژی اتانول گازی نسبت به اتانول مایع $38/6 \text{ kJ}$ بالاتر است. در نتیجه در واکنش ۲ نسبت به واکنش ۱ به اندازه $38/6 \text{ kJ}$ گرمای بیشتری آزاد می‌شود. $\Delta H_2 > \Delta H_1$ (ب) اگر واکنش ۵ در ضریب ۳ ضرب شود و با واکنش ۱ و وارونه واکنش ۴ جمع گردد، واکنش ۳ به دست می‌آید: $\Delta H_3 = \Delta H_1 + 3\Delta H_5 + (-\Delta H_4)$ $\Delta H_3 = -1368 + (3 \times 44/1) - 38/6 = -1274/3 \text{ kJ}$
۲۱۰	واکنش اکسایش گلوکز در بدن مطابق واکنش زیر، انجام می‌شود. با توجه به واکنش به پرسش‌ها پاسخ دهید. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g) \rightarrow 6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) + 2808 \text{ kJ}$ (آ) پایداری واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها را با ذکر علت مقایسه کنید. (ب) با توجه به اینکه انجام این واکنش تغییر دمایی محسوسی در بدن ایجاد نمی‌کند، انرژی آزاد شده در واکنش داده شده در اثر کدام یک از موارد زیر ایجاد می‌شود؟ چرا؟ ۱- تغییر در انرژی پتانسیل مواد شرکت‌کننده در واکنش ۲- افزایش انرژی جنبشی مواد شرکت‌کننده در واکنش	۱	(آ) سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها بالاتر از فراورده‌هاست. چون واکنش گرماده است. پس پایداری فراورده‌ها بیشتر است. (ب) مورد ۱ چون دما ثابت است در نتیجه انرژی جنبشی مواد تغییری نکرده است.
۲۱۱	به طور میانگین یک فرد بزرگسال برای یک پیاده‌روی ۵ کیلومتری حدود ۳۶۰ کیلوکالری انرژی نیاز دارد. حساب کنید برای تامین انرژی مورد نیاز برای هر کیلومتر پیاده‌روی چند گرم گلوکز باید در بدن یک فرد بزرگسال طبق واکنش زیر اکسایش یابد؟ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(s) + 6\text{O}_2(g) \rightarrow 6\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) + 2808 \text{ kJ}$ (هر یک کیلوکالری به تقریب برابر ۴/۲ کیلوژول است). $\text{C}=12 \quad \text{H}=1 \quad \text{O}=16 \text{ g.mol}^{-1}$	۱/۲۵	$? \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 1 \text{ km} \times \frac{360 \text{ kcal}}{5 \text{ km}} \times \frac{4/2 \text{ kJ}}{1 \text{ kcal}} \times \frac{1 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{2808 \text{ kJ}}$ $\times \frac{180 \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{1 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 19/4 \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$


۱/۷۵	(آ) $Q + N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ (ب) NO_2 - با توجه به گرماگیر بودن واکنش تولید NO_2، سطح انرژی آن بالاتر است (پ) نمودار ۲ - زیرا فرایند گرماده است و سطح انرژی N_2O_4 تولید شده، پایین تر است.	با توجه به این که $N_2O_4(g)$ بی رنگ و $NO_2(g)$ قهوه ای رنگ است و با در نظر گرفتن شکل زیر به سوالات پاسخ دهید: دما ۰°C دما ۶۰°C (آ) معادله نمادی واکنش تولید گاز قهوه ای NO_2 از گاز بی رنگ N_2O_4 را نوشته و نماد Q را در آن قرار دهید. (ب) در شرایط یکسان کدام یک از گازهای N_2O_4 یا NO_2 سطح انرژی بالاتری دارد؟ چرا؟ (پ) کدام یک از نمودارهای زیر نشان دهنده تغییرات آنتالپی واکنش تولید گاز بی رنگ N_2O_4 از گاز قهوه ای رنگ NO_2 است؟ چرا؟	۲۱۲
-------------	--	--	------------

۱	عبارت های زیر را با انتخاب پاسخ درست از بین گزینه های داده شده، کامل کنید. (آ) اکسایش گلوکز در بدن با تولید انرژی همراه است و دمای بدن در طی این فرایند (تغییر محسوسی نمی یابد - افزایش می یابد). (ب) با انجام یک واکنش شیمیایی در دمای ثابت و تغییر در شیوه اتصال اتم ها به یکدیگر ، تفاوت آشکاری در انرژی (گرمایی - پتانسیل) مواد ایجاد می شود. (پ) ذرات سازنده یک ماده، افزون بر جنبش های نامنظم، با یکدیگر (واکنش - برهمکنش) دارند.	۲۱۳
۱	با توجه به واکنش زیر به پرسش ها پاسخ دهید: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s}) , \Delta H_1$ (آ) کدام یک از نمودارهای ۱ یا ۲ مربوط به این فرایند است؟ چرا؟ (ب) اگر فرایند $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s}) , \Delta H_2$ را در نظر بگیریم کدام یک از دو رابطه زیر درست خواهد؟ چرا؟ ۱) $\Delta H_1 < \Delta H_2$ ۲) $\Delta H_1 > \Delta H_2$	۲۱۴

۱	آ) جذب گرما از محیط داخل کوزه و تبخیر آب که باعث خنک شدن داخل کوزه می شود. ب) $\frac{6}{3} g H_2O \times \frac{1 mol H_2O}{18 g H_2O} \times \frac{44/1 KJ}{1 mol H_2O} = 15/43 KJ$	آ) چرا در این دستگاه از شن های خیس استفاده می کنند؟ ب) اگر ۶/۳ گرم آب در این دستگاه تبخیر شود چند کیلو ژول گرما مبادله می شود؟ (H=۱ , O=۱۶ ; g/mol) $H_2O(l) + 44/1 kJ \rightarrow H_2O(g)$ 	۲۱۵
۱	آ) میانگین آنتالپی پیوند، چون انرژی لازم برای شکستن هر پیوند با دیگری متفاوت است. ب) $\Delta H_{(C=O)} = \frac{a+b}{2}$ ج) ۳۸۰	واکنش زیر شکستن پیوندهای مولکول کربن دی اکسید را نشان می دهد. با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید: $O = C = O(g) + 1598 kJ \rightarrow C(g) + 2O(g)$ آ) برای بیان انرژی لازم برای شکسته شدن پیوند (C=O) کدام کلمه زیر را مناسب می دانید؟ چرا؟ آنتالپی پیوند یا میانگین آنتالپی پیوند ب) اگر انرژی لازم برای شکستن پیوندهای دوگانه C=O به میزان a و b کیلوژول باشد. برای محاسبه مقدار کمی $\Delta H_{(C=O)}$ کدام عبارت زیر را مناسب می دانید؟ $\Delta H_{(C=O)} = \frac{a+b}{2} \quad \Delta H_{(C=O)} = a = b$ پ) اگر $\Delta H_{(C=O)} = 799 kJ$ باشد $\Delta H_{(C-O)}$ کدام یک از اعداد زیر است؟ (۳۸۰ - ۷۹۹ - ۸۳۹)	۲۱۶

۵/۰	با توجه به نمودار ۲ پیوند N-H در NH₃ شکسته شده و ۷۸۲ کیلوژول انرژی مصرف شده است بنابراین آنتالپی پیوند برابر است با : $\Delta H_{N-H} = \frac{1}{3} \times 782 = 261 \text{ kJ}$	با کمک تصویر زیر، آنتالپی پیوند N-H را محاسبه کنید. 	۲۱۷
-----	--	--	-----



استان سیستان و بلوچستان - صفحات ۶۲ تا ۶۷			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۱۸	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را تعیین کرده و شکل درست جمله(های) نادرست را بنویسید. (آ) عنصر اکسیژن از اوزون ناپایدارتر اما الماس از گرافیت پایدارتر است. (ب) در فرآیند فرازش سطح انرژی فرآورده بالاتر از واکنش‌دهنده است. (پ) گرمای آزاد شده در واکنش گرماده در دمای ثابت، حاصل از تفاوت مجموع انرژی جنبشی ذرات در مواد واکنش‌دهنده و فرآورده است. (ت) در اثر کاهش دما، میانگین انرژی جنبشی ذرات سازنده ماده کاهش می‌یابد.	(آ) نادرست- عنصر اکسیژن از اوزون پایدارتر اما الماس از گرافیت ناپایدارتر است. (ب) درست (پ) نادرست- گرمای آزادشده در واکنش گرماده، حاصل از تفاوت مجموع انرژی پتانسیل ذرات در مواد واکنش‌دهنده و فرآورده است. (ت) درست	۲
۲۱۹	چند گرم اتین سوزانده شود تا دمای ۵ کیلوگرم آب تا ۸۰ درجه سلسیوس افزایش یابد؟ (C=۱۲, H=۱ g) ($\Delta H = -1300 \text{ kJ/mol}$, $c = 4/2 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$) سوختن اتین)	$Q = mc(\theta_2 - \theta_1)$ $5000 \times 4/2 \times 80 = 168000 = 1680 \text{ kJ}$ $1680 \text{ kJ} \times \frac{1 \text{ mol}}{1300 \text{ kJ}} \times \frac{26 \text{ g } C_2H_2}{1 \text{ mol } C_2H_2} = 33/6 \text{ g } C_2H_2$	۱/۵
۲۲۰	با توجه به واکنش داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید: $N_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g) + 183 \text{ kJ}$ (آ) نمودار آنتالپی واکنش را رسم کنید. (ب) سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها بالاتر است یا فرآورده؟ چرا؟ (پ) اگر به جای $N_2H_4(g)$ از $N_2H_4(l)$ استفاده شود، گرمای آزاد شده کمتر می‌شود یا بیشتر؟ چرا؟	(آ) (ب) واکنش‌دهنده‌ها - زیرا واکنش گرماده است. (پ) کمتر- زیرا سطح انرژی مایع از گاز پایین‌تر است.	۲

۱/۵	(آ)  (ب) $\frac{9}{2} g C_2H_5O \times \frac{1 \text{ mol}}{46 g} \times \frac{39 kJ}{1 \text{ mol}} = 7/8 kJ$	۲۲۱ اگر برای تبخیر یک مول اتانول ۳۹ کیلوژول گرما مصرف شود : (آ) نمودار آنتالپی تبخیر و میعان اتانول را رسم کنید. (ب) در اثر میعان ۹/۲ گرم بخار اتانول چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟ (C=۱۲ , O=۱۶, H=۱ g)
۲	(آ) $2 \text{ mol Al} \times \frac{27 g}{1 \text{ mol Al}} \times \frac{15/3 kJ}{1 g Al} = 826/2 kJ$ $\Delta H = -826/2 kJ$ (ب) $4 g Al \times \frac{15/3 kJ}{1 g Al} = 61/2 kJ$ $Q = mc \cdot \Delta \theta \rightarrow 61200 = 200 \times 4/2 \times \Delta \theta \rightarrow \Delta \theta = 72/86^\circ C$	۲۲۲ (آ) از مصرف هر گرم آلومینیم در واکنش ترمیت، ۱۵/۳ کیلوژول گرما آزاد می شود. ΔH واکنش ترمیت چند کیلوژول است؟ $2 Al + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$ (ب) با استفاده از گرمای حاصل از مصرف ۴ گرم آلومینیم، دمای ۲۰۰ گرم آب، چند درجه سلسیوس افزایش می یابد؟ (Al = ۲۷ g/mol , آب c = ۴/۲ J/g °C)

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۷۵	آ) نادرست، در واکنش سوختن آلوتروپ‌های کربن همچون گرافیت و الماس هرچه گرمای آزاد شده کمتر باشد، آن آلوتروپ در سطح انرژی پایین‌تری قرار دارد و پایداری آن آلوتروپ بیشتر است. ب) نادرست، در برخی فرآیندها مانند فرآیند گوارش و سوخت و ساز شیر در بدن با این‌که دما ثابت است (°C ۳۷) اما باز هم بین سامانه و محیط پیرامون انرژی مبادله می‌شود. پ) درست ت) نادرست، در فرآیند فتوسنتز انرژی سامانه افزایش یافته و فرآیندی گرماگیر است.	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ) در واکنش سوختن کامل آلوتروپ‌های عنصرکربن در شرایط یکسان، هرچه گرمای آزاد شده بیشتر باشد، پایداری آن آلوتروپ بیشتر است. ب) واکنش‌هایی که در دمای ثابت انجام می‌شوند ($\Delta\theta = 0$) با مبادله گرما بین سامانه و محیط همراه نیستند. پ) در واکنش‌های گرماده، هرچه انرژی واکنش‌دهنده‌ها بیشتر و انرژی فرآورده‌ها کمتر باشد، گرمای واکنش بیشتر است. ت) در فرآیند فتوسنتز انرژی سامانه کاهش یافته و فرآیندی گرماده است.	۲۲۳
۱	$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -890 \text{ kJ}$ $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2O(g) \quad \Delta H = 2(41 \text{ kJ}) = 82 \text{ kJ}$ $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ $\Delta H = -890 \text{ kJ} + 82 \text{ kJ} = -808 \text{ kJ}$	با توجه به واکنش‌های زیر اگر گرمای تبخیر مولی آب ۴۱ kJ باشد مقدار آنتالپی واکنش شماره (۲) را به‌دست آورید. ۱) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + ۸۹۰$ ۲) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$, $\Delta H = ?$	۲۲۴
۰/۷۵	$۲۵ \text{ g } H_2 \times \frac{۱ \text{ mol } H_2}{۲ \text{ g } H_2} \times \frac{۴۸۴ \text{ kJ}}{۲ \text{ mol } H_2} = ۳۰۲۵ \text{ kJ}$	با توجه به معادله واکنش زیر اگر ۲۵ گرم گاز هیدروژن در واکنش با گاز اکسیژن مصرف شود، چند کیلوژول گرما تولید می‌شود؟ $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) + 484 \text{ kJ}$	۲۲۵

۱	$I_{\tau(g)} \rightarrow I_{\tau(l)} + 41/8 \text{ kJ}$ $+ \frac{I_{\tau(s)} + 57/3 \rightarrow I_{\tau(g)}}{I_{\tau(s)} + 15/5 \rightarrow I_{\tau(g)}}$ $\Delta H_{\text{ذوب}} = \Delta H_{\text{تصعید}} - \Delta H_{\text{تبخیر}}$ $\Delta H_{\text{ذوب}} = 57/3 - 41/8 = 15/5 \text{ kJ}$	اگر آنتالپی تبخیر ید برابر $41/8 \text{ kJ.mol}^{-1}$ و آنتالپی تصعید ید برابر $57/3 \text{ kJ.mol}^{-1}$ باشد، آنتالپی ذوب ید بر حسب kJ.mol^{-1} چند است ؟	۲۲۶
۱/۵	تفاوت گرما در این چهار واکنش به علت تفاوت در حالت فیزیکی پروپان (گاز و مایع) و آب (گاز و مایع) تولید شده می باشد. از آنجایی که یک ماده گازی در سطح انرژی بالا و ماده مایع در سطح انرژی پایین تری قرار دارد بنابراین بیشترین گرمای تولید شده؛ در واکنش (۱) می باشد که واکنش دهنده (پروپان گازی) در سطح انرژی بالاتر و فرآورده (آب مایع) در سطح انرژی پایین تر قرار دارد. کمترین گرمای تولیدشده مربوط به واکنش (۴) است که پروپان در حالت مایع (سطح انرژی پایین) و آب در حالت بخار (سطح انرژی بالا) است.	واکنش های زیر مربوط به سوختن پروپان است. بیشترین گرمای تولید شده و کمترین گرمای تولید شده مربوط به کدام واکنش است. چرا ؟ ۱) $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$ ۲) $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ ۳) $C_3H_8(l) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$ ۴) $C_3H_8(l) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$	۲۲۷


استان سمنان - صفحات ۶۷ تا ۷۷													
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره										
۲۲۸	راز یانه گیاهی است که در طب سنتی برای درمان بیماری‌های مختلفی به کار می‌رود. با توجه به ساختار آن، اگر یک مول از آن با مقدار کافی برم مایع واکنش دهد ۹۵ kJ گرما آزاد می‌کند. اگر تمام اجزای واکنش گازی در نظر گرفته شوند، میانگین آنتالپی پیوند C-Br چند kJ است؟ <table><tr><th>پیوند</th><th>C-C</th><th>Br-Br</th><th>C-H</th><th>C=C</th></tr><tr><td>آنتالپی یا میانگین آنتالپی پیوند (کیلوژول بر مول)</td><td>۳۴۸</td><td>۱۹۳</td><td>۴۱۵</td><td>۶۱۴</td></tr></table> 	پیوند	C-C	Br-Br	C-H	C=C	آنتالپی یا میانگین آنتالپی پیوند (کیلوژول بر مول)	۳۴۸	۱۹۳	۴۱۵	۶۱۴	$-95 = (\Delta H_{Br-Br} + \Delta H_{C=C}) - (\Delta H_{C-C} + 2\Delta H_{C-Br})$ $-95 = (193 + 614) - (348 + 2\Delta H_{C-Br})$ $\Delta H_{C-Br} = 277 \text{ kJ}$	۲
پیوند	C-C	Br-Br	C-H	C=C									
آنتالپی یا میانگین آنتالپی پیوند (کیلوژول بر مول)	۳۴۸	۱۹۳	۴۱۵	۶۱۴									
۲۲۹	وانیل نوعی ادویه و طعم دهنده است که در شیرینی‌پزی و تولید بستنی کاربرد دارد. با توجه به ساختار آن به سوالات پاسخ دهید. (آ) نام هر یک از گروه‌های عاملی آنرا ذکر کنید. (ب) آیا وانیل جزء ترکیبات آروماتیک به حساب می‌آید؟ چرا؟ (پ) چرا این ترکیب انحلال‌پذیری مناسبی در حلالی مانند اتانول دارد؟ 	(آ) گروه‌های عاملی آلدهیدی - هیدروکسیل - اتری (ب) بله زیرا حاوی حلقه بنزن است. (پ) زیرا مولکول قطبی است و در حلال قطبی حل می‌شود، همچنین می‌تواند با آن پیوند هیدروژنی برقرار سازد.	۱/۷۵										

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



۲	برای رسیدن به آنتالپی واکنش هدف، واکنش اول بدون تغییر، واکنش دوم ضرب در شش و واکنش سوم ابتدا قرینه و سپس در سه ضرب می‌شود. $\Delta H_{\text{هدف}} = \Delta H_1 + 6\Delta H_2 + 3(-\Delta H_3)$ $\Delta H_{\text{هدف}} = -1665 + 6(-188) + 3(572) = -1077 \text{ kJ}$ $89/6 \text{ L گاز} \times \frac{1 \text{ mol گاز}}{22/4 \text{ L گاز}} \times \frac{1 \text{ mol CS}_2}{3 \text{ mol گاز}} \times \frac{1077 \text{ kJ}}{1 \text{ mol CS}_2} = 1436 \text{ kJ}$	۲۳۰ با توجه به واکنش‌های زیر، مقدار گرمای آزاد شده در STP، برای تولید ۸۹/۶ لیتر گازهای گوگرد دی اکسید و کربن دی اکسید از واکنش سوختن کربن دی سولفید مایع چند کیلوژول است؟ 1) $\text{CS}_2(l) + 6\text{H}_2\text{O}_2(l) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) + 2\text{SO}_2(g) \quad \Delta H_1 = -1665 \text{ kJ}$ 2) $\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2(l) \quad \Delta H_2 = -188 \text{ kJ}$ 3) $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H_3 = -572 \text{ kJ}$ $\text{CS}_2(l) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{SO}_2(g) \quad \Delta H_{\text{هدف}} = ?$ (واکنش هدف)
۲/۵	آ) در آلکان‌ها، تفاوت هر آلکان متوالی به اندازه یک CH_2 است. پس می‌توان مقدار آنتالپی سوختن هر واحد CH_2 را به صورت زیر حساب کرد. $2\Delta H_{\text{CH}_2} = \Delta H_{\text{سوختن پروپان}} - \Delta H_{\text{سوختن متان}}$ $\Delta H_{\text{CH}_2} = \frac{-2230 - (-890)}{2} = -670 \text{ kJ}$ می‌توان آنتالپی سوختن بوتان را در دمای 25°C به صورت زیر محاسبه کرد. $\Delta H_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = \Delta H_{\text{C}_3\text{H}_8} + \Delta H_{\text{CH}_2}$ $\Delta H_{\text{C}_4\text{H}_{10}} = -2230 + (-670) = -2900 \text{ kJ}$ ب) برای محاسبه آنتالپی واکنش سوختن بوتان مطابق معادله داده شده، بایستی عدد فوق را با آنتالپی تبخیر آب جمع بست $\text{C}_4\text{H}_{10}(g) + \frac{13}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow 4\text{CO}_2(g) + 5\text{H}_2\text{O}(l), \Delta H_1 = -2900 \text{ kJ}$ $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g), \Delta H_2 = 44 \text{ kJ} \Rightarrow +220 \text{ kJ}$ $\text{C}_4\text{H}_{10}(g) + \frac{13}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow 4\text{CO}_2(g) + 5\text{H}_2\text{O}(g), \Delta H_{\text{هدف}} = ?$ $\Delta H_{\text{هدف}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -2900 + 220 = -2680 \text{ kJ}$	۲۳۱ اگر آنتالپی سوختن متان و پروپان در دمای 25°C به ترتیب برابر -890 و -2230 کیلوژول بر مول باشد، آ) آنتالپی سوختن بوتان را با محاسبه پیش‌بینی کنید. ب) با گرمای حاصل از سوختن 87 گرم بوتان مطابق واکنش زیر، چند گرم آب 40°C را می‌توان به نقطه جوش رساند؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12$)، $\text{H} = 1, \text{C} = 12$، گرمای ویژه آب؛ آنتالپی تبخیر آب را 44 kJ/mol در نظر بگیرید) $\text{C}_4\text{H}_{10}(g) + \frac{13}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow 4\text{CO}_2(g) + 5\text{H}_2\text{O}(g)$

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	$? J = 87 \text{ g C}_2\text{H}_2 \times \frac{1 \text{ mol C}_2\text{H}_2}{26 \text{ g C}_2\text{H}_2} \times \frac{2680 \text{ kJ}}{1 \text{ mol C}_2\text{H}_2} \times \frac{1000 \text{ J}}{1 \text{ kJ}} = 402000 \text{ J}$ $Q = mc\Delta\theta \Rightarrow m = \frac{402000 \text{ J}}{4/3 \times (100 - 40)} = 15952/38 \text{ g}$	
۱/۲۵	$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H^\circ = -890 \text{ kJ}$ $Q = mc\Delta\theta = 2/5 \times 0/39 \times (225 - 25) = 195 \text{ kJ}$ $? \text{ g CH}_4 = 195 \text{ kJ} \times \frac{1 \text{ mol CH}_4}{890 \text{ kJ}} \times \frac{16 \text{ g CH}_4}{1 \text{ mol CH}_4} = 3/5 \text{ g CH}_4$	۲۳۲ برای بالا بردن دمای یک قطعه مسی به وزن ۲/۵ کیلوگرم از ۲۵°C به ۲۲۵°C، چند کیلوژول گرما لازم است؟ و این مقدار گرما، به تقریب از سوختن کامل چند گرم گاز متان تأمین می‌شود؟ (ظرفیت گرمایی ویژه مس را برابر ۰/۳۹ J.g⁻¹.°C⁻¹ در نظر بگیرید، C=۱۲ g.mol⁻¹ , H=۱) $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}), \Delta H^\circ = -890 \text{ kJ}$

استان زنجان - صفحات ۶۷ تا ۷۷			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۳۳	با در نظر گرفتن مفهوم آنتالپی پیوند، دلیل درست یا نادرست بودن واکنش‌های زیر را بنویسید. (۱) $\text{HCl(g)} \rightarrow \frac{1}{2}\text{H}_2\text{(g)} + \frac{1}{2}\text{Cl}_2\text{(g)}$ (۲) $\text{Br}_2\text{(l)} \rightarrow 2\text{Br(l)}$ (۳) $\text{KF(g)} \rightarrow \text{K}^+\text{(g)} + \text{F}^-\text{(g)}$ (۴) $\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{O(g)}$	آنتالپی پیوند مقدار انرژی مصرف شده در فشار ثابت هنگام شکستن یک مول پیوند بین دو اتم گازی و تبدیل آنها به اتم‌های گازی جدا از یکدیگر است. با این تعریف درستی و نادرستی موارد خواسته شده به صورت زیر است: (۱) نادرست - مولکول تشکیل شده است نه اتم (۲) نادرست - مواد شرکت‌کننده باید به شکل گازی باشند. (۳) نادرست - یون تشکیل شده است نه اتم (۴) درست	۲
۲۳۴	آنتالپی پیوند HBr برابر با ۳۶۶ کیلوژول برمول است. (آ) نمودار مربوط به آنتالپی پیوند HBr را رسم کنید. (ب) با توجه به اطلاعات مسئله، معادله واکنش شیمیایی را بنویسید که محتوای انرژی سامانه به اندازه ۳۶۶ کیلوژول کاهش می‌یابد.	(آ)  (ب) $\text{H(g)} + \text{Br(g)} \rightarrow \text{HBr(g)} + 366\text{kJ}$	۱/۵
۲۳۵	دلیل درستی هر یک از موارد زیر که مقایسه آنتالپی پیوندها را نشان می‌دهد، بنویسید. (آ) $\text{C}\equiv\text{C} > \text{C}=\text{C} > \text{C}-\text{C}$ (ب) $\text{H-F} > \text{H-Cl} > \text{H-Br} > \text{H-I}$	(آ) پیوند ۳ گانه نسبت به پیوند دوگانه و این پیوند نسبت به یگانه استحکام و قدرت بیشتری داشته و انرژی بیشتری برای شکستن آن نیاز دارد. (ب) هر چه شعاع اتمی بیشتر، انرژی پیوند کمتر است. در یک گروه از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش می‌یابد و در نتیجه آنتالپی پیوند کمتر می‌شود.	۱



بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲۳۶	اگر میانگین آنتالپی پیوند C-H(g) برابر 415 kJ.mol^{-1} باشد، میانگین آنتالپی پیوند $\text{C}=\text{C}(\text{g})$ برحسب کیلوژول بر مول را به دست آورید. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) \rightarrow 2\text{C}(\text{g}) + 4\text{H}(\text{g}) \quad \Delta H = +2274 \text{ kJ}$	۱	$\Delta H(\text{C}=\text{C}) + 4 \times 415 - 0 = 2274$ $\Delta H(\text{C}=\text{C}) + 1660 - 0 = 2274$ $\Delta H(\text{C}=\text{C}) = 614 \text{ kJ mol}^{-1}$
۲۳۷	با توجه به فرمول ساختاری روبه‌رو، به سوالات زیر پاسخ دهید.  (آ) فرمول مولکولی آن را بنویسید. (ب) گروه(های) عاملی را بر روی ساختار مشخص کنید. (پ) نام گروه(های) عاملی را بنویسید. (ت) کدام قسمت ساختار دارای خواص الکلی است؟ (ث) حلقه موجود در ساختار به کدام خانواده اشاره دارد؟ (ج) کدام قسمت (های) مولکول می‌تواند در پیوند هیدروژنی شرکت کند؟ (چ) حلقه بنزن با جذب چند مولکول هیدروژن در فرایند هیدروژن‌دار شدن، سیر می‌شود؟	۳/۵	آ) $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_4$ ب و پ) کربونیل ($\text{C}=\text{O}$)، الکلی (OH-)، اتری (O-) و آلدئیدی ($\text{C}=\text{O}$) ت)  ث) آروماتیک ج) بخش الکلی چ) ۳ مولکول
۲۳۸	ارزش سوختی، یک فرایند گرماده است یا گرماگیر؟ واحد آن را بنویسید.	۰/۵	گرماده، کیلوژول بر گرم
۲۳۹	دانش آموزی دو اشتباه در نوشتن واکنش سوختن کامل اتین در دما و فشار اتاق دارد. این دو اشتباه را بنویسید. $2\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	۰/۵	۱. فرمول شیمیایی اتین دارای دو اتم هیدروژن است (C_2H_2) ۲. در دما و فشار اتاق آب به حالت مایع است. $2\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
۲۴۰	اگر گرمای سوختن یک گرم پروپانول ($\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$)، بتواند ۱۰۰ گرم آب را با دمای ۲۰ درجه سلسیوس در فشار ۱ اتمسفر به جوش آورد، ΔH واکنش سوختن آن به تقریب چند کیلوژول بر مول است؟ ($\text{C} = 12$ ، $\text{H} = 1$ ، $\text{O} = 16$) و $c_{\text{آب}} = 4/2 \text{ J.g}^{-1}.\text{°C}$ $2\text{C}_3\text{H}_7\text{OH} + 9\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$	۱	$Q = 100 \times 4/2 \times (100 - 20) = 33600 \text{ J}$ $1 \text{ mol} \times \frac{60 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times \frac{33600 \text{ J}}{1 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}} = 2016 \text{ kJ}$ $\Delta H = -2016 \text{ kJ mol}^{-1}$

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱	مجموع وارونه واکنش ۱ و واکنش ۲	با استفاده از واکنش‌های ترموشیمیایی زیر، گرمای لازم برای تهیه ۳۶ گرم الماس از گرافیت را به دست آورید. (C=۱۲: g.mol ⁻¹) ۱) C(s) + O ₂ (g) → CO ₂ (g) ΔH ₁ = -۳۹۵/۴ kJ ۲) C(s) + O ₂ (g) → CO ₂ (g) ΔH ₂ = -۳۹۳/۵ kJ	۲۴۱
۲/۲۵	(مجموع آنتالپی پیوند فراورده‌ها) - (مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها) = واکنش ΔH [۲(۴۳۲) + ۴۹۴] - ۴(۴۵۹) = -۴۷۸ kJ ۲H ₂ (g) + O ₂ (g) → ۲H ₂ O(g) ΔH = -۴۷۸ kJ ۲H ₂ O(g) → ۲H ₂ O(l) ΔH = ۲(-۴۴) = -۸۸ kJ ۲H ₂ (g) + O ₂ (g) → ۲H ₂ O(l) ΔH = -۵۶۶ kJ ۱۰ g H ₂ × $\frac{۱mol}{۲gH_2} \times \frac{۵۶۶kJ}{۲molH_2} = ۱۴۱۵kJ$	آنتالپی پیوندهای H-H، O=O و O-H به ترتیب برابر ۴۳۲، ۴۹۴ و ۴۵۹ کیلوژول بر مول است. از سوختن ۱۰ گرم هیدروژن در اکسیژن و تولید آب مایع، چه مقدار گرما بر حسب کیلوژول حاصل می‌شود؟ (آنتالپی تبخیر آب ۴۴ کیلوژول بر مول است) ۲H ₂ (g) + O ₂ (g) → ۲H ₂ O(l)	۲۴۲
۱/۷۵	A + ۲B → C 2E → C + D + ۲B 2E + A → 2D ----- 2A + 4E → 2C + 3D ΔH = -۱۱۵ + (-۵۲) + ۲۰ = -۱۴۷ kJ ۱mol D × $\frac{-۱۴۷kJ}{۳molD} = -۴۹kJ$	با توجه به واکنش‌های زیر: ۱) A(g) + ۲B(g) → C(g) ΔH = -۱۱۵ kJ ۲) C(g) + D(g) + ۲B(g) → ۲E(g) ΔH = +۵۲ kJ ۳) ۲D(g) → A(g) + ۲E(g) ΔH = -۲۰ kJ با گرمای آزاد شده ضمن تشکیل یک مول D(g) در واکنش زیر، ۲A(g) + ۴E(g) → ۲C(g) + ۳D(g) به تقریب چند گرم آب با دمای ۳۰°C را می‌توان در فشار یک اتمسفر به جوش آورد؟	۲۴۳

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


	$Q = mc\Delta\theta$ $49\text{kJ} \times \frac{1000\text{J}}{1\text{kJ}} = m \times 4 / 2\text{J.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1} \times (100 - 30) ^\circ\text{C}^{-1}$ $m = 166 / 7\text{g}$	$(c \text{ آب} = 4 / 2 \text{ J.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1})$	
۰/۵	نکته: * برای اینکه ΔH محاسبه شده با روش آنتالپی های پیوند تفاوت کمتری با داده های تجربی داشته باشد باید به واکنشی دقت کنیم که پیوندهای ساده در آن به کار رفته باشد. * پیوندی در آن واکنش نباشد که از لفظ "میانگین آنتالپی پیوند" استفاده کنیم . (آ) در این واکنش با توجه به ساختار H_2O (H-O-H) برای پیوند O-H ، باید از "میانگین آنتالپی پیوند" برای محاسبه ΔH استفاده کنیم. (ب) تمام پیوند ها در این واکنش ساده هستند. بنابراین ΔH محاسبه شده با روش آنتالپی های پیوند تفاوت کمتری با داده های تجربی دارد.	دو واکنش گازی زیر را در نظر بگیرید. در واکنش (ب)، ΔH محاسبه شده با روش آنتالپی های پیوند تفاوت کمتری با داده های تجربی دارد. دلیل درستی مورد (ب) و نادرستی مورد (آ) را بنویسید. (آ) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (ب) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$	۲۴۴
۲/۵	 (آ) تا ۴ که عبارتند از: کربونیل ، هیدروکسیل، اتری و آلدهیدی (ب) بله ، چون دارای حلقه بنزن است. (پ) ۳ تا (حلقه با رنگ آبی نشان داده شده است). (ت) ۴ کربن (ث) بله	با توجه به ساختار ترکیب آلی زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.  (آ) این ترکیب دارای چند گروه عاملی اکسیژندار هست؟ نام آنها را بنویسید. (ب) آیا این ترکیب جزء خانواده آروماتیک است؟ چرا ؟ (پ) تعداد گروه های CH_2 - را در این ساختار را بدست آورید. (ت) در این ترکیب چند اتم کربن وجود دارد که به هیچ اتم هیدروژنی متصل نیست؟ (ث) آیا گروه عاملی مربوط به خانواده کتون در این ساختار وجود دارد؟	۲۴۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۲	ابتدای گرمای لازم برای جوش آمدن ۱۰۰ گرم آب با دمای ۲۵ درجه را محاسبه می کنیم: $Q = mc\Delta\theta = 100g \times 4.2 \frac{J}{g.^{\circ}C} \times (100 - 25)^{\circ}C = 33600J = 33.6kJ$ پس به ازای سوختن یک گرم پروپانول، ۳۳/۶ کیلوژول گرما آزاد میشود. جرم مولی پروپانول : $C_3H_7OH = 3(12) + 8(1) + 1(16) = 60 \text{ g/mol}$ حالا گرمای آزاد شده به ازای یک مول پروپانول را حساب می کنیم: $?kJ = 1mol \text{ } C_3H_7OH \times \frac{6.0g \text{ } C_3H_7OH}{1mol \text{ } C_3H_7OH} \times \frac{33.6kJ}{1g \text{ } C_3H_7OH} = 2016kJ$ از آن جایی که آنتالپی سوختن مدنظر هست پس: $\Delta H = -2016kJ \text{ mol}^{-1}$	اگر گرمای سوختن یک گرم پروپانول، بتواند ۱۰۰ گرم آب با دمای ۲۰ °C را در فشار ۱atm به جوش آورد، ΔH واکنش سوختن آن را برحسب کیلوژول برمول بدست آورید. (c = ۴.۲ J/g.°C ، O=۱۶ ، C=۱۲ ، H=۱ : g/mol)	۲۴۶
۲	با توجه به واکنش هدف ، باید واکنش اول را معکوس و در ۲ ضرب کنیم و با واکنش دوم (بدون تغییر) جمع کنیم. $\Delta H = (-2) \times (-562) + (-1075) = +49kJ$ در واکنش هدف به ازای تولید ۲ مول H_2S به اندازه ۴۹ کیلوژول گرما نیاز است. $?kJ = 6/8g \text{ } H_2S \times \frac{1mol \text{ } H_2S}{34g \text{ } H_2S} \times \frac{49kJ}{2mol \text{ } H_2S} = 4/9kJ$	با توجه به واکنش های زیر و مقدار ΔH آنها : a) $H_2S(g) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) + SO_2(g) : \Delta H = -562kJ$ b) $CS_2(l) + 3O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2SO_2(g) : \Delta H = -1075kJ$ برای تشکیل ۶/۸ گرم H_2S ، مطابق واکنش: $CS_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2S(g)$ چند ژول گرما مبادله می شود؟	۲۴۷
۱/۲۵	با توجه به رابطه زیر: $\text{ارزش سوختی} = \frac{ \text{آنتالپی سوختن} }{\text{جرم مولی}}$ $C_3H_8 = 3(12) + 8(1) = 44 \frac{g}{mol}$ (جرم مولی) × (ارزش سوختی) = آنتالپی سوختن $= 49 \frac{kJ}{g} \times \frac{44g}{1mol} = -2058 \frac{kJ}{mol}$ توجه کنید که آنتالپی سوختن همیشه یک عدد منفی است.	اگر ارزش سوختی پروپن برابر ۴۹ کیلوژول بر گرم باشد، آنتالپی سوختن پروپن چقدر خواهد بود؟ (H=۱ , C=۱۲ : g/mol)	۲۴۸

ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۴۹	با توجه به نمودارهای زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.  آ) کدام نمودار (a یا b) می تواند مربوط به واکنش سوختن یک مول ماده سوختنی باشد؟ چرا؟ ب) اگر این نمودار مربوط به واکنش زیر باشد، پیش بینی کنید انرژی پیوندهای اولیه در واکنش دهنده ها بیشتر است یا پیوندهای جدید در فرآورده ها؟ چرا؟  پ) اگر نمودار قسمت (آ) مربوط به سوختن ۱ مول اتان باشد، انتظار دارید با جایگزینی یکی از اتم های هیدروژن در آن با گروه عاملی هیدروکسیل، گرمای واکنش چه تغییری کند؟ چرا؟ ت) به کمک نمودار و با محاسبه نشان دهید از سوختن ۱۶ گرم اتان چند کیلوژول انرژی مبادله می شود. (H=۱C=۱۲g/mol)	آ) نمودار a زیرا سوختن فرایندی گرماده است (سطح انرژی فرآورده ها پایین تر از واکنش دهنده ها می باشد). ب) انرژی پیوندهای جدید در فرآورده ها بیشتر است زیرا آنتالپی فرایند سوختن منفی است و طبق رابطه زیر، مجموع انرژی پیوندهای جدید در فرآورده ها باید بیشتر باشد. [مجموع آنتالپی پیوند فرآورده ها]-[مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها]=ΔH(واکنش) پ) کمتر می شود زیرا با این عمل، اتان به اتانول که نوعی الکل است تبدیل می شود. می دانیم آنتالپی سوختن الکل ها از آلکان های هم کربن، کمتر است، پس آنتالپی سوختن کمتر می شود. ت) $16 \text{ g C}_2\text{H}_6 \times \frac{1 \text{ mol C}_2\text{H}_6}{30 \text{ g C}_2\text{H}_6} \times \frac{1560 \text{ kJ}}{1 \text{ mol C}_2\text{H}_6} = 832 \text{ kJ}$	۲/۷۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲	$\frac{10/8 \text{ g H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{n \text{ mol CO}_2}{(n+1) \text{ mol H}_2\text{O}} \times \frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 17/6$ $n = 2 \Rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$ $\text{C}_2\text{H}_6 + \frac{7}{2} \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ $\frac{10/8 \text{ g H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{\Delta H}{3 \text{ mol H}_2\text{O}} = 312 \text{ kJ}$ $\Delta H = -1560 \text{ kJ}$	از واکنش سوختن نوعی آلکان، ۱۷/۶ گرم کربن دی اکسید، ۱۰/۸ گرم آب و ۳۱۲ کJ انرژی تولید می شود. آنتالپی سوختن این آلکان را محاسبه نمایید. (H= ۱, C=۱۲, O=۱۶ g/mol) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} \text{O}_2 \rightarrow n\text{CO}_2 + (n+1) \text{H}_2\text{O}$	۲۵۰								
۱/۵	$1) \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) \quad \Delta H_1 = +91 \text{ kJ}$ $2) \text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H_2 = -183 \text{ kJ}$ $\Delta H_{\text{واکنش}} = \Delta H_1 + \Delta H_2$ $\Delta H_{\text{واکنش}} = +91 + (-183) = -92$ {مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده ها} - {مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش دهنده ها} = $\Delta H_{\text{واکنش}}$ $\Delta H = \Delta H \{ (\text{N}=\text{N}) + 3(\text{H}-\text{H}) \} - \{ 6(\text{N}-\text{H}) \}$ $-92 = \{ \Delta H(\text{N}=\text{N}) + 3(436) \} - \{ 6(391) \}$ $\Delta H (\text{N}=\text{N}) = +946 \text{ kJ mol}^{-1}$	به کمک جدول و نمودار داده شده، که مربوط به مراحل انجام واکنش زیر: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ می باشد، آنتالپی پیوند N≡N را به طور تقریبی حساب کنید.  <table border="1" data-bbox="861 806 1372 918"> <thead> <tr> <th>N≡N</th><th>N-H</th><th>H-H</th><th>پیوند</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>؟</td><td>۳۹۱</td><td>۴۳۶</td><td>آنتالپی پیوند / میانگین آنتالپی پیوند (kJ mol⁻¹)</td></tr> </tbody> </table>	N≡N	N-H	H-H	پیوند	؟	۳۹۱	۴۳۶	آنتالپی پیوند / میانگین آنتالپی پیوند (kJ mol ⁻¹)	۲۵۱
N≡N	N-H	H-H	پیوند								
؟	۳۹۱	۴۳۶	آنتالپی پیوند / میانگین آنتالپی پیوند (kJ mol ⁻¹)								

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۵	۱) $C_6H_{14}(l) + \frac{19}{2} O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 7H_2O(l) \quad \Delta H_1 = -4159/5 kJ$ نوشتن صحیح هریک از واکنش‌های سوختن هگزان مایع و هگزان در حالت گازی ۲) $C_6H_{14}(g) + \frac{19}{2} O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 7H_2O(l) \quad \Delta H_2 = -4191/1 kJ$ واکنش دوم باید معکوس شود. در نتیجه خواهیم داشت: ۳) $6CO_2(g) + 7H_2O(l) \rightarrow C_6H_{14}(g) + \frac{19}{2} O_2(g) \quad \Delta H_3 = +4191/1 kJ$ از جمع دو واکنش ۱ و ۳ خواهیم داشت: $C_6H_{14}(l) \rightarrow C_6H_{14}(g)$ $\Delta H_{واکنش} = \Delta H_1 + \Delta H_3$ $\Delta H_{واکنش} = -4159/5 + 4191/1 = +31/6 kJ$	آنتالپی سوختن هگزان مایع C_6H_{14} برابر $-4159/5 kJ.mol^{-1}$ و آنتالپی سوختن هگزان در حالت گاز $-4191/1 kJ.mol^{-1}$ می‌باشد. با استفاده از قانون هس، ΔH تبخیر یک مول هگزان را به دست آورید. $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1) H_2O$ $C_6H_{14}(l) \rightarrow C_6H_{14}(g)$	۲۵۲
۲	اولین آلکن ۱ C_2H_4 / آلکن ۲ C_3H_6 / آلکن ۳ C_4H_8 اختلاف آنتالپی سوختن دو آلکن متوالی: $2058 - (1410) = 648$ در نتیجه به طور تقریبی آنتالپی سوختن سومین آلکن خواهد بود: $2058 + 648 = 2706 kJ/mol \rightarrow -2706 kJ/mol$ جرم مولی $4(12) + 8 = 56 g$ $1g C_4H_8 \times \frac{1 mol C_4H_8}{56 g C_4H_8} \times \frac{2706 kJ}{1 mol C_4H_8} = 48/32 kJ$	نمودار زیر مربوط به آنتالپی سوختن سه هیدروکربن آغازین در خانواده آلکن هاست. با کمک نمودار و اطلاعات داده شده، ارزش سوختی سومین آلکن را محاسبه نمایید. ($H=1, C=12g/mol$) 	۲۵۳
۲/۲۵	آ) -هپتانون ب)	دانش‌آموزی در هنگام پختن نوعی خوراکی از ادویه‌ای استفاده کرده که ساختار ماده مؤثر آن به صورت زیر می‌باشد. با توجه به آن، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.	۲۵۴

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

با توجه به واکنش (۲)، آنتالپی سوختن اتان عبارت است از: $\Delta H_{C_2H_6} = \frac{-3120}{2} = -1560 \text{ kJ.mol}^{-1}$ پس اختلاف گرمای سوختن دو آلکان متوالی متان و اتان به صورت زیر است: $1560 - 890 = 670 \text{ kJ}$ برای پروپان خواهیم داشت: $1560 + 670 = 2230 \text{ kJ}$ پس آنتالپی سوختن پروپان C_3H_8 برابر است با: $-2230 \text{ kJ.mol}^{-1}$ برای بوتان خواهیم داشت: $2230 + 670 = 2900 \text{ kJ}$ پس آنتالپی سوختن بوتان C_4H_{10} برابر است با: $-2900 \text{ kJ.mol}^{-1}$ آنتالپی سوختن = $\frac{\text{ارزش سوختی}}{\text{جرم مولی}}$ جرم یک مول پروپان برابر است با: $3(12) + 8 = 44 \text{ g}$ ارزش سوختی تقریبی پروپان عبارت است از: $\frac{2230}{44} = 50.7 \text{ kJ.g}^{-1}$ جرم یک مول بوتان برابر است با: $4(12) + 10 = 58 \text{ g}$	۱) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) + 890 \text{ kJ}$ ۲) $2C_2H_6(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(l) + 3120 \text{ kJ}$
---	--

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	ارزش سوختی تقریبی بوتان عبارت است از: $\frac{2900}{58} = 50 \text{ kJ.g}^{-1}$ ارزش سوختی بوتان > ارزش سوختی پروپان	
۲	واکنش ۱ باید وارون شود. پس خواهیم داشت: $3) \text{C(s, گرافیت)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)} \quad \Delta H_f = -110/5 \text{ kJ}$ ضرایب واکنش ۲ باید نصف شوند. پس خواهیم داشت: $4) \text{CO(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_f = -283 \text{ kJ}$ از جمع دو واکنش ۳ و ۴ خواهیم داشت: $\text{C(s, گرافیت)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H_{\text{واکنش}} = \Delta H_f + \Delta H_f = -110/5 + (-283) = -393/5 \text{ kJ}$ $7/2 \text{ g C(s, گرافیت)} \times \frac{1 \text{ mol C(s, گرافیت)}}{12 \text{ g C(s, گرافیت)}} \times \frac{393/5 \text{ kJ}}{1 \text{ mol C(s, گرافیت)}} = 236/1 \text{ kJ}$ گرما آزاد می‌شود.	۲۵۶ با استفاده از واکنش‌های داده شده تعیین کنید، از سوختن کامل ۷/۲ گرم گرافیت، مطابق با معادله شیمیایی: $\text{C(s, گرافیت)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ چند کیلوژول گرما آزاد می‌شود؟ نوشتن راه حل کامل الزامی است. $C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ ۱) $\text{CO(g)} \rightarrow \text{C(s, گرافیت)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1 = +110/5 \text{ kJ}$ ۲) $2 \text{CO(g)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_2 = -566 \text{ kJ}$
۱	[مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده‌ها] - [مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش دهنده‌ها] = $\Delta H_{\text{واکنش}}$ $-103 = (436 + 193) - 2\Delta H_{\text{H-Br}}$ $\Delta H_{\text{H-Br}} = 366 \text{ kJ.mol}^{-1}$	۲۵۷ با استفاده از نمودار زیر، آنتالپی پیوند H-Br را به دست آورید. نوشتن راه حل کامل الزامی است.


۲/۵	آ) واکنش‌ها در نمودار داده شده عبارت‌اند از: $C(s) + 2H_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -965/1 kJ$ $CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2(g) \quad \Delta H = +890/2 kJ$ از جمع دو واکنش در نمودار خواهیم داشت: $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$ ΔH واکنش = $-965/1 + 890/2 = -74/9 kJ$ ب) برای محاسبه گرمای واکنش سوختن گاز هیدروژن کافیت از واکنش‌های زیر کمک بگیریم: واکنش زیر باید وارون و ضرایب استوکیومتری آن نصف شوند).	با استفاده از نمودار داده شده: آ) آنتالپی واکنش زیر را به دست آورید. $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$	۲۵۸

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H = -394 kJ$ (ضرایب استوکیومتری واکنش زیر باید نصف شوند). $C(s) + 2H_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -965 / 1 kJ$ در این صورت خواهیم داشت: $\frac{1}{2} CO_2(g) \rightarrow \frac{1}{2} C(s) + \frac{1}{2} O_2(g) \quad \Delta H = +197 kJ$ $\frac{1}{2} C(s) + H_2(g) + O_2(g) \rightarrow \frac{1}{2} CO_2(g) + H_2O(l) \quad \Delta H = -482 / 55 kJ$ $H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H_{واکنش} = -482 / 55 + 197 = -285 / 55 kJ$ با دقت به واکنش سوختن متان و واکنش‌های موجود در نمودار، درمی‌یابیم که این واکنش وارون واکنش زیر در نمودار می‌باشد. $CO_2(g) + 2H_2O(l) \rightarrow CH_4(g) + 2O_2(g) \quad \Delta H = +890 / 2 kJ$ از این رو، آنتالپی واکنش سوختن متان، قرینه آنتالپی این واکنش و برابر $-890 / 2 kJ$ خواهد بود.	ب) آنتالپی سوختن گاز هیدروژن و گاز متان را به کمک نمودار و واکنش‌های داده شده محاسبه نمایید. $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H = -394 kJ$ $H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \quad \Delta H = ?$ $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = ?$
---	---

استان خراسان شمالی - صفحات ۷۷ تا ۸۸			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۵۹	برای نگهداری مواد غذایی از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود که چند نمونه از این روش - ها در زیر آمده است. دلیل استفاده از هر یک را بنویسید. (آ) برای نگهداری گوشت مرغ و ماهی آنها را منجمد می‌کنند. (ب) برای نگهداری غذاهای آماده، آن را کنسرو می‌کنند. (پ) در گذشته برای نگهداری کلم و ریشه سبزیجات، زمین را تا ۲ متر حفر کرده و آنها دفن می‌کردند. (ت) خشک کردن سبزی و میوه، ارزان‌ترین و سازگارترین روش نگهداری آنهاست. برخی از میوه‌ها و سبزیجات را در نمک یا ترشی نگه می‌دارند.	(آ) کاهش دما و انجماد آب موجود در مواد غذایی فعالیت باکتری‌ها را متوقف کرده و مانع فاسد شدن فرآورده‌های پروتئینی می‌شود. (کاهش سرعت واکنش‌های مربوط به فساد مواد غذایی) (ب) کنسرو کردن، نگهداری مواد غذایی پخته شده در قوطی یا شیشه استریل است و سپس با جوشاندن این ظروف باکتری‌های باقی‌مانده در آن از بین رفته یا ضعیف می‌شوند. در این فرآیند هوا از قوطی خارج می‌شود و زمانی که سرد می‌شود درزگیر خلاء تشکیل شده و از ورود مجدد هوا و فساد مواد غذایی نیز جلوگیری می‌شود. (کاهش سرعت واکنش‌های مربوط به فساد مواد غذایی) (پ) در زیر زمین نور و اکسیژن وجود ندارد و دمای پایین، محیط قلیایی و مواد رطوبت گیر در خاک سبب توقف رشد میکروب‌ها و فساد ماده غذایی می‌شود. (کاهش سرعت واکنش‌های مربوط به فساد مواد غذایی) (ت) میوه و سبزی در برابر خورشید، باد و یا دستگاه خشک‌کن قرار می‌گیرد و با حذف آب از آن، رشد باکتری‌ها متوقف می‌شود. از طرفی با خشک کردن وزن نیز کاهش یافته و حمل و نقل و نگهداری آنها ساده‌تر می‌شود. نگهداری میوه‌هایی مانند زردآلو و سیب یا سبزی‌هایی مانند نعناع به این روش صورت می‌گیرد. (کاهش سرعت واکنش‌های مربوط به فساد مواد غذایی) نگهداری مواد غذایی در آب و نمک یا ترشی (سرکه که محلول استیک اسید است) میکروارگانیسم‌ها را از بین برده و از رشد آنها جلوگیری می‌کند.	۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲/۲۵	(آ) نمک سود کردن یک روش کاربردی برای نگهداری گوشت است؛ با وجود آب نمک و فرآیند اسمز که باعث خروج آب از گوشت میشود و همچنین نمکی که به جداره بیرونی گوشت می‌چسبد و از رشد باکتری‌ها و فساد گوشت جلوگیری می‌کند. (ب) وجود آب و رطوبت سبب رشد باکتری‌ها و فاسد شدن گوشت می‌شود بنابراین آن را در معرض نور خورشید قرار می‌دهند تا رطوبت از گوشت خارج شود. وجود نمک و فرآیند اسمز نیز خروج آب را تسهیل می‌کند. بنابراین سرعت واکنش‌های مربوط به فساد مواد غذایی کاهش می‌یابد. (پ) افزایش دما سبب رشد باکتری‌ها و فساد گوشت می‌شود. نمک‌سود کردن گوشت در روزهای بسیار سرد سال انجام می‌شود تا شدت تابش نور خورشید کم باشد و سرد بودن محیط از افزایش شدید دمای گوشت به خاطر تابش نور جلوگیری می‌کند.	یکی از روش‌های نگهداری گوشت، نمک سود کردن آن است. در این روش ابتدا گوشت به مدت چند روز داخل آب نمک می‌ماند و سپس گوشت را در برابر نور آفتاب قرار می‌دهند. گوشت نمک سود در تهیه سوپ یا دیگر غذاها استفاده می‌شود. (آ) استفاده از آب نمک چگونه بر ماندگاری گوشت اثر دارد؟ (ب) قرار گرفتن گوشت در برابر نور آفتاب چه تاثیری بر ماندگاری آن دارد؟ (پ) گوشت در روزهایی که دمای هوا زیر صفر درجه سلسیوس و بسیار سرد است در مقابل نور خورشید خشک می‌شود. آیا می‌توانید دلیل این کار را توجیه نمایید.
۰/۵	محافظت در برابر گرما، نور، هوازدگی و انواع میکروب‌ها، نفوذ ناپذیری نسبت به گازها و رطوبت	یک شرکت تولیدی خشکبار تصمیم گرفت تا برای جلب مشتری و صادرات بیشتر محصول در سیستم فروش خود تغییراتی ایجاد نماید به همین منظور درصدد بود تا طرحی نو جهت بسته‌بندی محصولات ارائه نماید. به نظر شما این شرکت برای بسته‌های محصولات خود جهت ماندگاری بیشتر چه نکاتی را مد نظر قرار می‌دهد؟
۱/۵	(آ) گاز C، اولاً با توجه به نمودار، با گذشت زمان غلظت گونه در حال افزایش است پس گونه یکی از فراورده‌هاست ثانیاً نمودار بر حسب تغییرات غلظت رسم شده است و غلظت مواد جامد ثابت است. پس نمودار مربوط به B نیست. (ب) در زمان ۱۵ ثانیه (بصورت تقریبی) $R_C = \frac{(\cdot / 15 - \cdot) \text{ mol} \cdot L^{-1} \times 2L}{\Delta t \times \frac{1 \text{ min}}{60 \cdot s}} = 3 / 6 \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \quad \text{پ)}$	با توجه به نمودار زیر که مربوط به واکنش شیمیایی $2A(s) \rightarrow 2B(s) + 3C(g)$ است، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (حجم ظرف واکنش برابر ۲ لیتر است). (آ) نمودار رسم شده مربوط به کدام یک از گونه‌های شرکت‌کننده در واکنش است؟ چرا؟ (ب) در چه زمانی واکنش به پایان رسیده است؟ (پ) سرعت متوسط تولید C بر حسب مول بر دقیقه در ۵ ثانیه‌ی اول، چند است؟ 

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲/۵	آ) باعث کاهش سرعت می شود، زیرا سطح تماس واکنش دهنده کمتر می شود. ب) باعث کاهش سرعت می شود، زیرا غلظت اسید به عنوان واکنش دهنده کمتر می شود. پ) تغییری نمی کند، زیرا غلظت واکنش دهنده ثابت می ماند. ت) باعث افزایش سرعت می شود زیرا با زیاد شدن شمار مولکول های HBr غلظت اسید افزایش می یابد. ث) سرعت واکنش کاهش می یابد. زیرا دمای ظرف واکنش به علت از دست دادن گرما (برای تامین گرمای واکنش دوم) کاهش می یابد.	هر یک از تغییرات زیر چه تأثیری بر سرعت واکنش 30°C گرم پودر آلومینیم با 200°C میلی لیتر هیدروبرمیک اسید 1°C مولار دارد؟ با ذکر دلیل. آ) استفاده از 30°C گرم قطعه ی آلومینیمی به جای پودر آلومینیم ب) افزودن 300°C میلی لیتر آب مقطر به محلول پ) افزودن 200°C میلی لیتر محلول 1°C مولار هیدروبرمیک اسید به سامانه ت) افزودن 200°C میلی لیتر گاز هیدروژن برمید به سامانه ث) قرار دادن ظرف واکنش بالا، در طول واکنش؛ در یک ظرفی که داخل آن ظرف یک واکنش گرماگیر دیگری در حال انجام است. (ظرف دوم دربسته و جداره بیرونی اش کاملاً عایق است).	۲۶۳
۲	آ) $R_B^- = \frac{\Delta n_B}{\Delta t} = 0.004 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}} \times 10 \text{ L} = 0.04 \frac{\text{mol}}{\text{min}} \Rightarrow \Delta t = \frac{0.1}{0.04} = 2.5 \text{ min}$ ب) $\begin{cases} \Delta n_B = (0.02 \times 5) - 0 = 0.1 \\ \Delta n_A = ((0.02 \times 4) - 0.12) = -0.12 \end{cases} \Rightarrow -\frac{\Delta n_A}{a} = \frac{\Delta n_B}{b} \Rightarrow \frac{0.12}{a} = \frac{0.1}{b}$ $\frac{a}{b} = \frac{6}{5}$	تصویر زیر لحظه ی معینی از واکنش موازنه نشده ی $aA \rightarrow bB$ را نشان می دهد (گلوله های سفید مربوط به A و گلوله های مشکی مربوط به B می باشند). اگر هر گلوله معادل 0.02°C مول باشد و واکنش با 0.2°C مول ماده ی A شروع شده باشد و سرعت متوسط تولید B تا این زمان برابر $0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{Min}^{-1}$ باشد: آ) این شکل دقیقه ی چندم واکنش را نشان می دهد. (در لحظه آغازین واکنش هیچ فراورده ای در ظرف موجود نیست).  توجه: حجم ظرف در طول واکنش ثابت و برابر 10°C لیتر است. ب) نسبت ضرایب استوکیومتری (a و b) را بدست آورید.	۲۶۴

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

آ) چون غلظت A و B در حال کاهش ولی غلظت C و D در حال افزایش است پس A و B واکنش دهنده و C و D فراورده می‌باشند، با مقایسه تغییرات غلظت ردیف اول، دوم و چهارم در بازه‌ی زمانی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه نسبت مولی A به B و A به D هر دو برابر ۴ به ۱ می‌شود.

زمان s	۰	۱۰	۲۰	۳۰
[A] (g)		۰/۴		۰/۰۸
[B] (g)	۰/۲	۰/۱		۰/۰۲
[C] (g)	۰	۰/۲	۰/۳	
[D] (g)		۰/۱		۰/۱۸

چون مقدار اولیه D صفر است، می‌توان نسبت مولی C را به D به دست آورد که برابر ۲ می‌شود.

زمان s	۰	۱۰	۲۰	۳۰
[C] (g)	۰	۰/۲	۰/۳	
[D] (g)	۰	۰/۱		۰/۱۸

معادله واکنش موازنه شده: $4A + B \rightarrow 2C + D$

ب) با توجه به ضرایب استوکیومتری مواد، مقدار مصرف یا تولید مواد داده شده در بازه های زمانی مختلف جدول و محاسبات استوکیومتری جدول زیر کامل میشود:


زمان s	۰	۱۰	۲۰	۳۰
[A] (g)	۰/۸	۰/۴	۰/۲	۰/۰۸
[B] (g)	۰/۲	۰/۱	۰/۰۵	۰/۰۲
[C] (g)	۰	۰/۲	۰/۳	۰/۳۶
[D] (g)	۰	۰/۱	۰/۱۵	۰/۱۸

در جدول زیر، غلظت همه مواد گازی شرکت کننده در واکنش، در زمان‌های داده شده اندازه‌گیری شده است، با توجه به جدول به سوالات زیر پاسخ دهید.


زمان s	۰	۱۰	۲۰	۳۰
[A] (g)		۰/۴		۰/۰۸
[B] (g)	۰/۲	۰/۱		۰/۰۲
[C] (g)	۰	۰/۲	۰/۳	
[D] (g)		۰/۱		۰/۱۸


آ) معادله واکنش موازنه شده را برای مواد واکنش بنویسید.

ب) جدول را کامل کنید.

۲	آ) نادرست، با افزایش دما، سرعت واکنش افزایش می‌یابد. ب) درست، آزمایش ۱ و ۲ در دمای یکسانی انجام می‌شوند. در آزمایش ۲ چون از قرص پودر شده استفاده شده، پس سطح تماس بیشتر و در نتیجه سرعت بیشتری نسبت به ۱ دارد. چرا که یک قرص کامل غیر پودری زمان زیادی لازم دارد تا در آب حل شده و غلظت را بالا ببرد، اما پودر در آب سریعاً و شدیداً غلظت را افزایش می‌دهد. پ) نادرست، آزمایش ۴ هم دمای بیشتر و هم واکنش دهنده به صورت پودری (سطح تماس بیشتر) دارد که هر دو عامل باعث می‌شود، آزمایش ۴ نسبت به ۳ آزمایش دیگر بیشترین سرعت را داشته باشد. ت) درست، دمای واکنش بر مقدار نهایی گاز تولیدی تأثیری ندارد.	جدول زیر، به آزمایش انحلال قرص جوشان در آب و در دماهای داده شده مربوط است. <table border="1" data-bbox="890 257 1358 456"> <thead> <tr> <th>آزمایش</th><th>مقدار قرص جوشان</th><th>دمای آب (°C)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>یک قرص</td><td>۰</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>یک قرص (پودر)</td><td>۰</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>یک قرص</td><td>۲۵</td></tr> <tr> <td>۴</td><td>یک قرص (پودر)</td><td>۳۵</td></tr> </tbody> </table> درست یا نادرست بودن هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. آ) سرعت واکنش در آزمایش ۳، از آزمایش ۱ کمتر است. ب) سرعت واکنش در آزمایش ۲، بیشتر از سرعت واکنش در آزمایش ۱، است. پ) آزمایش ۴، در مقایسه با ۳ آزمایش دیگر، کمترین سرعت واکنش را دارد. ت) با کامل شدن واکنش‌ها، حجم گاز جمع‌آوری شده در آزمایش ۲ و ۳ تقریباً با هم برابر است.	آزمایش	مقدار قرص جوشان	دمای آب (°C)	۱	یک قرص	۰	۲	یک قرص (پودر)	۰	۳	یک قرص	۲۵	۴	یک قرص (پودر)	۳۵
آزمایش	مقدار قرص جوشان	دمای آب (°C)															
۱	یک قرص	۰															
۲	یک قرص (پودر)	۰															
۳	یک قرص	۲۵															
۴	یک قرص (پودر)	۳۵															
۲	آ) نادرست، مساحت کل جانبی زغال، سطح تماس آن را با شعله هنگام سوختن نشان می‌دهد و نه حجم آن! ب) درست با توجه به فرض سؤال، فقط کربن موجود در زغال می‌سوزد: $C + O_2 \rightarrow CO_2$ $C \text{ جرم} = \frac{80}{100} \times 16 = 12.8g$ $12.8gC \times \frac{1molC}{12gC} \times \frac{1molO_2}{1molC} \times \frac{32gO_2}{1molO_2} = 34.13gO_2$	درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را درباره یک تکه زغال چوب به شکل مکعب به ضلع ۲cm و جرم ۱۶ گرم، با نوشتن دلیل مشخص نمایید. (فرض کنید ۸۰ درصد جرم زغال را کربن تشکیل می‌دهد و سایر مواد سازنده آن نمی‌سوزند). (O = ۱۶, C = ۱۲: g.mol⁻¹) 															

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

پ) نادرست، با برش زدن مکعب، حجم کل آن تغییری نمی کند.  $V_0 = 2^3 = 8 \text{ cm}^3$ $S_0 = 24 \text{ cm}^2$ $V = 4 \text{ cm}^3$ $S = 16 \text{ cm}^2$ $V = 4 \text{ cm}^3$ $S = 16 \text{ cm}^2$ $V_{\text{کل}} = 8 \text{ cm}^3$ $S_{\text{مجموع}} = 32 \text{ cm}^2$	آ) حجم آن 8 cm^3 است و این کمیت، سطح تماس این تکه زغال را با شعله هنگام سوختن نشان می دهد. ب) برای سوزاندن کامل آن به $34/13$ گرم گاز اکسیژن نیاز است. پ) اگر این مکعب از وسط یک ضلع برش بخورد، حجم و سطح تماس آن به ترتیب ۰.۵ و ۴ برابر می شود.
---	---


استان خراسان رضوی - صفحات ۷۷ تا ۸۸			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۶۸	در آزمایشی یک تیغه از جنس فلز روی در داخل محلولی به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر از هیدروکلریک اسید قرار داده می‌شود، نمودار زیر تغییرات جرم تیغه را با گذشت زمان نشان می‌دهد. $\text{Zn (s)} + 2\text{HCl (aq)} \rightarrow \text{ZnCl}_2 \text{ (aq)} + \text{H}_2 \text{ (g)}$ با صرف نظر از تغییر حجم محلول طی انجام واکنش، به سوالات زیر پاسخ دهید. (Zn: ۶۵ g/mol)  آ) سرعت متوسط مصرف فلز روی را در پایان دو دقیقه از شروع واکنش، بر حسب مول بر ثانیه حساب کنید. ب) غلظت مولار یون Zn^{2+} را در ثانیه ۶۰ حساب کنید.	آ) $13 \text{ g} - 7 \text{ g} = 6 \text{ g}$ = جرم روی مصرف شده در پایان ثانیه ۱۲۰ $n(\text{Zn}) = 6 \text{ g Zn} \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{65 \text{ g Zn}} = 0.092 \text{ mol Zn}$ $\rightarrow \Delta n(\text{Zn}) = -0.092 \text{ mol}$ $\bar{R}(\text{Zn}) = -\frac{\Delta n}{\Delta t} = -\frac{-0.092 \text{ mol}}{120 \text{ s}} = 7.7 \times 10^{-4} \text{ mol/s}$ ب) $20 \text{ g} - 12 \text{ g} = 8 \text{ g}$ = جرم روی مصرف شده در پایان ثانیه ۶۰ $n(\text{Zn}) = 8 \text{ g Zn} \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{65 \text{ g Zn}} = 0.123 \text{ mol Zn}$ $0.123 \text{ mol Zn} \times \frac{1 \text{ mol Zn}^{2+}}{1 \text{ mol Zn}} = 0.123 \text{ mol Zn}^{2+}$ $M(\text{Zn}^{2+}) = \frac{n(\text{mol})}{V(\text{L})} = \frac{0.123}{0.2} = 0.615 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$	۲/۷۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۱/۲۵	$C_9H_{14}O_4$ (آ) (ب)	با توجه به ساختار داده شده، به پرسش‌ها پاسخ دهید: (آ) فرمول مولکولی ترکیب زیر را بنویسید. (ب) گروه‌های عاملی را روی ساختار ترکیب داده شده مشخص و نام-گذاری کنید.	۲۶۹																																																								
۱	<table border="1"> <thead> <tr> <th>شماره آزمایش</th><th>دما (°C)</th><th>شکل کلسیم کربنات</th><th>زمان انجام واکنش</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>۱۰</td><td>پودر</td><td>۸۶</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>۱۰</td><td>قرص</td><td>۱۹۰</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>۳۰</td><td>پودر</td><td>۷۲</td></tr> <tr> <td>۴</td><td>۳۰</td><td>قرص</td><td>۱۵۸</td></tr> <tr> <td>۵</td><td>۶۰</td><td>پودر</td><td>۶۲</td></tr> <tr> <td>۶</td><td>۶۰</td><td>قرص</td><td>۱۱۳</td></tr> </tbody> </table>	شماره آزمایش	دما (°C)	شکل کلسیم کربنات	زمان انجام واکنش	۱	۱۰	پودر	۸۶	۲	۱۰	قرص	۱۹۰	۳	۳۰	پودر	۷۲	۴	۳۰	قرص	۱۵۸	۵	۶۰	پودر	۶۲	۶	۶۰	قرص	۱۱۳	دانش آموزی در آزمایشگاه طی انجام چند آزمایش مقدار ۵ گرم کلسیم کربنات (به صورت پودر یا قرص) را با مقدار کافی و یکسان از محلول هیدروکلریک اسید در دماهای متفاوت واکنش می‌دهد. این دانش آموز زمان لازم برای کامل شدن هر واکنش را با دقت اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. مقایسه نتایج به دست آمده با پیش‌بینی‌های او مطابقت داشت. زمان‌های ثبت شده عبارتند از: ۶۲، ۷۲، ۸۶، ۱۱۳، ۱۵۸ و ۱۹۰ ثانیه. به نظر شما در هر کدام از آزمایش‌های شماره ۳ تا ۶ چه نتایجی به دست آمد؟ آنها را در جدول زیر بنویسید. $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>شماره آزمایش</th><th>دما (°C)</th><th>شکل کلسیم کربنات</th><th>زمان انجام واکنش</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>۱۰</td><td>پودر</td><td>۸۶</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>۱۰</td><td>قرص</td><td>۱۹۰</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>۳۰</td><td>پودر</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>۴</td><td>۳۰</td><td>قرص</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>۵</td><td>۶۰</td><td>پودر</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>۶</td><td>۶۰</td><td>قرص</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	شماره آزمایش	دما (°C)	شکل کلسیم کربنات	زمان انجام واکنش	۱	۱۰	پودر	۸۶	۲	۱۰	قرص	۱۹۰	۳	۳۰	پودر		۴	۳۰	قرص		۵	۶۰	پودر		۶	۶۰	قرص		۲۷۰
شماره آزمایش	دما (°C)	شکل کلسیم کربنات	زمان انجام واکنش																																																								
۱	۱۰	پودر	۸۶																																																								
۲	۱۰	قرص	۱۹۰																																																								
۳	۳۰	پودر	۷۲																																																								
۴	۳۰	قرص	۱۵۸																																																								
۵	۶۰	پودر	۶۲																																																								
۶	۶۰	قرص	۱۱۳																																																								
شماره آزمایش	دما (°C)	شکل کلسیم کربنات	زمان انجام واکنش																																																								
۱	۱۰	پودر	۸۶																																																								
۲	۱۰	قرص	۱۹۰																																																								
۳	۳۰	پودر																																																									
۴	۳۰	قرص																																																									
۵	۶۰	پودر																																																									
۶	۶۰	قرص																																																									

(آ)


در صورتی که ۰/۱۲ مول گاز نیتروژن مطابق واکنش زیر، در مدت ۶۰ ثانیه در حضور ۰/۱۵ مول گاز اکسیژن واکنش زیر را انجام دهد:



آ جدول زیر را کامل کنید.


زمان (s)	N_2	O_2	2NO
۰	۰/۱۲	۰/۱۵	۰
۱۰	۰/۰۸		
۲۰	۰/۰۵		
۳۰	۰/۰۳		
۴۰	۰/۰۲		
۵۰	۰/۰۱		
۶۰	۰		


(ب) نمودار تغییرات تعداد مول گاز نیتروژن (N_2) و نیتروژن منوکسید (NO) را بر حسب زمان رسم کنید.




(ب)

زمان (s)	N_2	O_2	2NO
۰	۰/۱۲	۰/۱۵	۰
۱۰	۰/۰۸	۰/۱۱	۰/۰۸
۲۰	۰/۰۵	۰/۰۸	۰/۱۴
۳۰	۰/۰۳	۰/۰۶	۰/۱۸
۴۰	۰/۰۲	۰/۰۵	۰/۲۰
۵۰	۰/۰۱	۰/۰۴	۰/۲۲
۶۰	۰	۰/۰۳	۰/۲۴



۱/۵	واکنش دادن پودر یا براده آهن با غلظت های متفاوت هیدروکلریک اسید که در واکنش با اسید غلیظ سرعت خروج گاز هیدروژن بیشتر است. (واکنش صفحه ۲۴ کتاب) $\text{Fe(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{FeCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ یا مثال های دیگری مانند الیاف آهن داغ و سرخ شده در هوا (غلظت کم اکسیژن) نمی سوزد ولی همان مقدار الیاف داغ و سرخ شده در یک ارلن پر از اکسیژن (غلظت زیاد اکسیژن) می سوزد. $4\text{Fe(s)} + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	آزمایشی طراحی کنید که در آن انجام یک آزمایش شیمیایی اثر غلظت را بر آهنگ انجام واکنش شیمیایی نشان دهد. واکنش شیمیایی مربوط به آزمایش را بنویسید.	۲۷۲										
۲/۵	(آ) کاهش جرم به علت خروج گاز CO₂ از مخلوط واکنش است. $22\text{g CO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{44\text{g CO}_2} = 0.5\text{mol CO}_2$ $\bar{R}_{\text{CO}_2} = \frac{\Delta n(\text{CO}_2)}{\Delta t} = \frac{0.5}{20} = 0.025\text{mol/s}$ (ب) $26/4\text{g CO}_2 \times \frac{1\text{mol CO}_2}{44\text{g CO}_2} = 0.6\text{mol CO}_2$ $\bar{R}_{\text{CO}_2} = \frac{\Delta n(\text{CO}_2)}{\Delta t} = \frac{0.6}{30} = 0.02\text{mol/s}$ $\bar{R}_{\text{HCl}} = 2\bar{R}_{\text{CO}_2} = 0.04\text{mol/s}$	جدول زیر میزان کاهش جرم مخلوط را در واکنش کلسیم کربنات با هیدروکلریک اسید در زمان های پس از شروع واکنش نشان می دهد. <table><tr><td>زمان (s)</td><td>۰</td><td>۱۰</td><td>۲۰</td><td>۳۰</td></tr><tr><td>کاهش جرم (g)</td><td>۰</td><td>۱۳/۲</td><td>۲۲</td><td>۲۶/۴</td></tr></table> $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (آ) با توجه به داده های این جدول سرعت متوسط تولید گاز کربن دی اکسید را در ۲۰ ثانیه اول از شروع واکنش بر حسب مول بر ثانیه محاسبه کنید. (ب) سرعت متوسط مصرف HCl را در ۳۰ ثانیه اول از شروع واکنش محاسبه نمایید. 	زمان (s)	۰	۱۰	۲۰	۳۰	کاهش جرم (g)	۰	۱۳/۲	۲۲	۲۶/۴	۲۷۳
زمان (s)	۰	۱۰	۲۰	۳۰									
کاهش جرم (g)	۰	۱۳/۲	۲۲	۲۶/۴									

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۰/۷۵	آ) وان دروالس ب) افزایش می یابد. پ) $C_8H_6O_4$	در مورد ترکیب زیر (پاراایلن) به سوالات پاسخ دهید.  آ) نیروی بین مولکولی در این ترکیب از چه نوعی است؟ ب) اگر در ساختار این ترکیب، به جای گروه های متیل گروه های کربوکسیل قرار گیرد، حلالیت آن در آب چه تغییری می کند؟ پ) فرمول مولکولی ترکیب بدست آمده در قسمت ب را بنویسید.	۲۷۴
۲/۵	آ) $\bar{R}_{Al_2(SO_4)_3} = \frac{\Delta n(Al_2(SO_4)_3)}{\Delta t}$ $\Delta \times 10^{-4} = \frac{\Delta n(Al_2(SO_4)_3)}{300} \Rightarrow \Delta n(Al_2(SO_4)_3) = 0.15 \text{ mol}$ $0.15 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3 \times \frac{342 \text{ g } Al_2(SO_4)_3}{1 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3} = 51.3 \text{ g } Al_2(SO_4)_3$ ب) در این آزمایش جرم مخلوط آزمایش به علت خروج گاز SO_3 کاهش می یابد. با محاسبه جرم این گاز و کم کردن عدد بدست آمده از جرم کل ، جرم جامد باقی مانده بدست می آید. راه حل اول:	پژوهشگری برای تولید آزمایشگاهی سولفوریک اسید، مقدار ۸۵/۵ گرم آلومینیم سولفات ناخالص را مطابق واکنش زیر طی مدت ۵ دقیقه تجزیه و گاز SO_3 حاصل را جمع آوری و از آن برای تولید سولفوریک اسید استفاده می کند. در صورتی که سرعت متوسط تجزیه آلومینیوم سولفات در این آزمایش 5×10^{-4} مول بر ثانیه باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید. (Al: ۲۷, S: ۳۲, O: ۱۶ g/mol) $Al_2(SO_4)_3(s) \rightarrow Al_2O_3(s) + 3SO_3(g)$ آ) با نوشتن محاسبات لازم، مقدار آلومینیوم سولفات خالص را بر حسب گرم حساب کنید. ب) با نوشتن محاسبات لازم، جرم مخلوط جامد باقی مانده در پایان واکنش چقدر است؟	۲۷۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	$\bar{R}_{SO_4} = 3 \bar{R}_{Al_2(SO_4)_3} = 3 \times 5 \times 10^{-7} = 15 \times 10^{-7}$ $15 \times 10^{-7} = \frac{\Delta n(SO_4)}{300} \Rightarrow \Delta n(SO_4) = 0.45 \text{ mol}$ $0.45 \text{ mol } SO_4 \times \frac{80 \text{ g } SO_4}{1 \text{ mol } SO_4} = 36 \text{ g } SO_4$ $85 - 36 = 49$ راه حل دوم: $0.45 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3 \times \frac{3 \text{ mol } SO_4}{1 \text{ mol } Al_2(SO_4)_3} \times \frac{80 \text{ g } SO_4}{1 \text{ mol } SO_4} = 36 \text{ g } SO_4$ $85 - 36 = 49$	
۱/۵	یک نمونه زغال از مکعب هایی به ضلع ۴ سانتی متر تشکیل شده است. (آ) اگر هر مکعب از وسط به دو نیمه مساوی تقسیم شود، مساحت سطح هر مکعب زغال چند برابر می شود؟ (ب) با تغییر ایجاد شده در قسمت آ، آهنگ سوختن زغال چه تغییری می کند؟ چرا؟ 	۲۷۶
۲	(آ) حذف پوست به عنوان مانع طبیعی، باعث افزایش سطح تماس مغزها با اکسیژن هوا و ورود جانداران ذره بینی و در نتیجه افزایش آهنگ تغییرات شیمیایی و فساد می شود. (ب) بنزوئیک اسید چون نقش نگهدارنده دارد باعث کاهش آهنگ تغییرات شیمیایی و فساد در مواد غذایی می شود. (پ) آهن به عنوان کاتالیزگر آهنگ واکنش تولید آمونیاک را افزایش می دهد. (ت) کاهش دما باعث کاهش آهنگ تغییر شیمیایی می شود. با ذکر دلیل توضیح دهید هر یک از اقدامات انجام شده ی زیر، آهنگ واکنش های شیمیایی را چگونه تغییر می دهد؟ (آ) مغازه داری برای صرفه جویی در حجم فضای اشغال شده ی مغازه، پوست گردوها را جدا و گردوها را به صورت مغز نگهداری کرده و می فروشد. (ب) استفاده از بنزوئیک اسید در صنایع غذایی به خصوص در سس ها و آب میوه ها (پ) استفاده از ورقه های آهنی در فرایند هابر برای تولید آمونیاک (ت) نگهداری بیشتر واکسن ها در یخچال	۲۷۷

استان خراسان جنوبی - صفحات ۷۷ تا ۸۸			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۷۸	در واکنش $\text{Fe (s)} + 2\text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{2+} (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g})$ ، کدام یک از تغییرات باعث افزایش و کدام یک باعث کاهش سرعت واکنش می‌شود؟ با ذکر دلیل. (آ) اضافه کردن آب به ظرف حاوی واکنش‌دهنده‌ها (ب) گرم کردن محلول اسید در آغاز واکنش (پ) با استفاده از گرد آهن به جای قطعه‌های آهن (ت) افزودن HCl(g) به ظرف واکنش	بررسی گزینه (آ) باعث کاهش سرعت واکنش می‌شود: چون با افزودن آب غلظت محلول کم می‌شود و سرعت واکنش کاهش می‌یابد. بررسی گزینه (ب) سرعت واکنش افزایش می‌یابد: با افزایش دما سرعت واکنش افزایش می‌یابد. بررسی گزینه (پ) سرعت واکنش افزایش می‌یابد زیرا گرد آهن نسبت به قطعه‌های آهن، سطح تماس بسیار بیشتری با یون های H^+ ایجاد می‌کند، بنابراین سرعت واکنش افزایش می‌یابد. بررسی گزینه (ت) سرعت واکنش افزایش می‌یابد: زیرا افزودن HCl به محلول غلظت یون H^+ و در نتیجه سرعت واکنش افزایش می‌یابد.	۲
۲۷۹	درستی یا نادرستی موارد زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. (آ) سرعت واکنش پتاسیم با آب سرد نسبت به سرعت واکنش سدیم با آب سرد بیشتر است چون واکنش پذیری پتاسیم از سدیم بیشتر است. (ب) سرعت واکنش ۱ g منیزیم و ۵۰ mL محلول ۰/۲ مولار HBr با سرعت واکنش ۱ g منیزیم و ۱۰۰ mL محلول ۰/۱ مولار HBr یکسان است. (پ) افزایش دما سرعت واکنش های گرماگیر را برخلاف واکنش‌های گرماده افزایش می‌دهد. (ت) محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای اتاق به سرعت واکنش می‌دهد.	بررسی گزینه (آ) صحیح است چون در فلزات قلیایی در هر گروه از بالا به پایین به علت فاصله بیشتر الکترون‌های ظرفیت از هسته، الکترون‌ها راحت‌تر جدا شده و واکنش-پذیری بیشتر می‌شود. بررسی گزینه (ب) غلط زیرا سرعت واکنش در حالت محلول، مستقل از حجم محلول است. غلظت محلول HBr در حالت اول بیشتر از حالت دوم است و سرعت واکنش در حالت اول بیشتر است. بررسی گزینه (پ) غلط زیرا افزایش دما سرعت هر دو واکنش گرماگیر و گرماده را افزایش می‌دهد. بررسی گزینه (ت) غلط محلول بنفش‌رنگ پتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلی در دمای اتاق به کندی واکنش می‌دهد.	۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲	جرم مولی گاز گوگرد تری اکسید برابر ۸۰ g.mol^{-1} است، بنابراین تعداد مول های اولیه این ماده برابر است با: $n(\text{SO}_3) = \frac{m}{M} = \frac{۱۲ \text{ g}}{۸۰ \text{ g.mol}^{-1}} = ۰.۱۵ \text{ mol}$ با استفاده از سرعت واکنش، سرعت مصرف SO_3 را به دست می آوریم و یکی زمان را از ثانیه به دقیقه تبدیل و سپس حجم را حذف می کنیم. $R(\text{واکنش}) = \frac{\bar{R}(\text{SO}_3)}{\nu} \rightarrow \bar{R}(\text{SO}_3) = \nu \times R(\text{واکنش}) = ۲ \times ۰.۰۰۱ = ۰.۰۰۲ \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ $\bar{R}(\text{SO}_3) = ۰.۰۰۲ \frac{\text{mol}}{\text{L.s}} \times \frac{۶۰ \text{ s}}{۱ \text{ min}} \times ۲ \text{ L} = ۰.۲۴ \text{ mol.min}^{-1}$ در یک دقیقه، ۰.۲۴ مول SO_3 تجزیه می شود. بنابراین در مدت ۵ دقیقه، $۱/۲$ مول از این ماده تجزیه شده و $۰/۳$ مول از آن در ظرف باقی می ماند. $۱/۵ - ۱/۲ = ۰/۳ \text{ mol}$ با مصرف شدن $۱/۲$ مول SO_3، $۱/۲$ مول SO_2 تولید می شود. زیرا ضریب SO_3 و SO_2 با هم برابر و در نتیجه میزان تولید و مصرف آنها برابر است. همچنین با توجه به اینکه ضریب O_2 نصف SO_3 است، مقدار تولید شده O_2 برابر $۰/۶$ مول است. بنابراین: = مول گاز موجود در ظرف $(۰/۳ + ۱/۲ + ۰/۶) = ۲/۱ \text{ mol}$ (مول باقی مانده SO_3) + (مول تولید شده SO_2) + (مول تولید شده O_2)	۱۲۰ گرم گاز گوگرد تری اکسید را در یک ظرف دو لیتری قرار می دهیم تا مطابق معادله زیر تجزیه شود. $۲\text{SO}_3(\text{g}) \rightarrow ۲\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ اگر سرعت این واکنش برابر $۰.۰۰۱ \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ باشد، پس از گذشت ۵ دقیقه، شمار مول های گازی موجود در ظرف واکنش چقدر است؟ ($S = ۳۲$, $O = ۱۶ \text{ g.mol}^{-1}$)
---	--	---

۱/۲۵	معادله موازنه شده این واکنش به صورت زیر است: $2\text{KNO}_3 (\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{KNO}_2 (\text{s}) + \text{O}_2 (\text{g})$ جدول داده شده شامل تغییر غلظت یک فراورده است، اما توجه کنید که غلظت پتاسیم نیتريت (KNO_2) به عنوان یک ماده جامد، همواره ثابت است، پس جدول متعلق به گاز اکسیژن است. نکته بعدی این است که مدت زمان انجام واکنش از دقیقه ۰ تا دقیقه ۴ (لحظه ثابت شدن غلظت O_2) باید در نظر گرفته شود: $\Delta t = 4 - 0 = 4 \text{ min}$ $\Delta M = M_2 - M_1 = 1/8 - 0 = 1/8 \text{ mol.L}^{-1}$ همین ابتدا تغییر غلظت گاز اکسیژن را به تغییر تعداد مول های آن تبدیل می کنیم: $1/8 \text{ mol/L} \times 0.5 \text{ L} = 0.0625 \text{ mol}$ $\bar{R} (\text{O}_2) = \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{0.0625}{4} = 0.015625 \text{ mol.min}^{-1}$ سرعت واکنش نیز همین مقدار است، زیرا ضریب اکسیژن برابر ۱ است. $R (\text{واکنش}) = \bar{R} (\text{O}_2) = 0.015625 \text{ mol.min}^{-1}$	اگر واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در اثر گرما طبق معادله موازنه نشده $2\text{KNO}_3 (\text{s}) \xrightarrow{\Delta} 2\text{KNO}_2 (\text{s}) + \text{O}_2 (\text{g})$ در یک ظرف نیم لیتری انجام شود و تغییر غلظت یکی از مواد شرکت کننده در واکنش مطابق جدول زیر باشد. سرعت واکنش در بازه زمانی انجام واکنش بر حسب مول بر دقیقه چند است؟ <table border="1"><thead><tr><th>زمان (min)</th><th>۱</th><th>۲</th><th>۳</th><th>۴</th><th>۵</th></tr></thead><tbody><tr><th>غلظت (mol.L^{-1})</th><td>۰/۶</td><td>۱/۲</td><td>۱/۶</td><td>۱/۸</td><td>۱/۸</td></tr></tbody></table>	زمان (min)	۱	۲	۳	۴	۵	غلظت (mol.L^{-1})	۰/۶	۱/۲	۱/۶	۱/۸	۱/۸	۲۸۱
زمان (min)	۱	۲	۳	۴	۵										
غلظت (mol.L^{-1})	۰/۶	۱/۲	۱/۶	۱/۸	۱/۸										
۲	بررسی گزینه آ) $\frac{\bar{R}(\text{Fe})}{3} = \frac{\bar{R}(\text{H}_2)}{4}$ $\bar{R}(\text{Fe}) = \frac{3}{4} \times 2 \times 10^{-2} = 0.0015 \text{ mol.s}^{-1}$ در هر ثانیه ۰/۰۱۵ مول Fe مصرف می شود پس این گزینه نادرست است. بررسی گزینه ب) $\frac{\bar{R}(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{1} = \frac{\bar{R}(\text{H}_2)}{4}$ $\bar{R}(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{1}{4} \times 2 \times 10^{-2} = 0.0005 \text{ mol.s}^{-1}$	با توجه به این که سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن در واکنش: $2\text{Fe} (\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O} (\text{g}) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) + 4\text{H}_2 (\text{g})$ است، کدام مطلب، نادرست است؟ آ) در هر ثانیه، ۰/۱۵ مول $\text{Fe} (\text{s})$ مصرف می شود. ب) در هر دقیقه، ۰/۳ مول $\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s})$ تولید می شود. پ) سرعت متوسط مصرف $\text{H}_2\text{O} (\text{g})$ برابر 0.02 mol.s^{-1} است. ت) سرعت واکنش، برابر سرعت متوسط تولید $\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s})$ است.	۲۸۲												



بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	$0.005 \text{ mol.s}^{-1} \times \frac{60 \text{ s}}{60 \text{ min}} = 0.005 \text{ mol.min}^{-1}$ بنابراین گزینه درست است. بررسی گزینه پ) ضرایب آب و هیدروژن برابر است پس سرعت متوسط مصرف و تولید آنها نیز برابر است. $\overline{R}(\text{H}_2\text{O}) = \overline{R}(\text{H}_2)$ $\overline{R}(\text{H}_2\text{O}) = 0.005 \text{ mol.s}^{-1}$ بنابراین گزینه درست است. بررسی گزینه ت) سرعت واکنش با سرعت مصرف یا تولید گونه‌هایی که ضریب استوکیومتری آنها در واکنش موازنه شده برابر ۱ است، یکسان می‌باشد، بنابراین گزینه درست است.	
۰/۷۵	در بین واکنش دهنده ها ماده ای که ضریب بیشتری داشته باشد، سرعت مصرف آن نیز بیشتر است، از آنجاییکه در سوال، سرعت را بر اساس تغییرات غلظت بر زمان خواسته و غلظت ماده B که یک ماده جامد است با گذشت زمان ثابت است پس جواب سوال ماده A است.	۲۸۳ در واکنش $2A(g) + 3B(s) + C(g) \rightarrow 4D(g) + 2E(s)$ سرعت مصرف کدام ماده بر حسب mol/L.s بیشتر است؟
۲	آ) درست، چون مقدار قرص جوشان و همچنین دمای آب نسبت به آزمایشات دیگر، کمتر است ب) نادرست، مقایسه سرعت واکنش بین آزمایشات ۱ و ۲ به مقدار واکنش دهنده مربوط است نه غلظت پ) درست، سرعت واکنش در آزمایش ۵ از بقیه بیشتر است، زیرا در آن هم مقدار قرص بیشتر بوده و هم به شکل پودر شده ست و همچنین دمای آب هم بالاتر است ت) نادرست، سرعت واکنش در آزمایش ۵ بیشتر بوده و زمان پرتاب شدن قوطی برای آن (یعنی e) از همه کوچکتر است	۲۸۴ در یک سری آزمایش، درون قوطی یک فیلم عکاسی، مقدار ۵ میلی لیتر آب با دماهای گوناگون و نیز مقادیر مختلفی قرص جوشان می ریزیم. اگر نتایج حاصل به صورت جدول زیر باشد، <u>درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل تعیین کنید:</u> آ) آهسته ترین واکنش، مربوط به آزمایش ۲ می باشد ب) $a < b$ است که این موضوع، بیانگر اثر تغییر غلظت بر روی سرعت واکنش است پ) سرعت واکنش در آزمایش ۵ از همه بیشتر است ت) در ستون آخر (سمت چپ) بزرگترین عدد متعلق به e است


		<table><tr><td>شماره ی آزمایش</td><td>مقدار قرص جوشان</td><td>دمای آب) سانتی گراد)</td><td>زمان پرتاب شدن قوطی(ثانیه)</td></tr><tr><td>۱</td><td>یک دوم قرص</td><td>۰</td><td>a</td></tr><tr><td>۲</td><td>یک چهارم قرص</td><td>۰</td><td>b</td></tr><tr><td>۳</td><td>یک دوم قرص</td><td>۲۵</td><td>c</td></tr><tr><td>۴</td><td>یک چهارم قرص</td><td>۲۵</td><td>d</td></tr><tr><td>۵</td><td>یک دوم قرص (پودر شده)</td><td>۲۵</td><td>e</td></tr></table>	شماره ی آزمایش	مقدار قرص جوشان	دمای آب) سانتی گراد)	زمان پرتاب شدن قوطی(ثانیه)	۱	یک دوم قرص	۰	a	۲	یک چهارم قرص	۰	b	۳	یک دوم قرص	۲۵	c	۴	یک چهارم قرص	۲۵	d	۵	یک دوم قرص (پودر شده)	۲۵	e	
شماره ی آزمایش	مقدار قرص جوشان	دمای آب) سانتی گراد)	زمان پرتاب شدن قوطی(ثانیه)																								
۱	یک دوم قرص	۰	a																								
۲	یک چهارم قرص	۰	b																								
۳	یک دوم قرص	۲۵	c																								
۴	یک چهارم قرص	۲۵	d																								
۵	یک دوم قرص (پودر شده)	۲۵	e																								
۲۸۵	اگر درواکنش $N_2(g)+3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ بعد از گذشت نیم ساعت از آغاز واکنش ۳/۳۶ لیتر گاز NH_3 تولید شده باشد سرعت متوسط مصرف H_2 و سرعت واکنش چند مول بر دقیقه است ؟ (واکنش در STP انجام شده است)	$\overline{R}(NH_3)=\frac{3}{36L}\times\frac{1mol}{22.4L}\times\frac{1}{30min}=0.005mol/min$ $\overline{R}(H_2)=\frac{3}{2}\times0.005=0.0075mol/min$ $R(n)=\frac{\overline{R}(NH_3)}{2}=\frac{0.005}{2}=0.0025\quad imol/mol/(s)$																									
۲۸۶	مقداری پتاسیم کلرات را وارد ظرف ۲ لیتری کرده تا در حضور گرما و کاتالیزگر تجزیه شود. با توجه به اطلاعات جدول، سرعت واکنش را بر حسب مول بر دقیقه به دست آورید. $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$	دو ماده دیگر جامد هستند و غلظت ثابتی دارند ، بنابراین جدول غلظت گاز اکسیژن را نشان می دهد. زمان کل واکنش ۱۵ ثانیه هست چون بعد از آن تغییری ایجاد نشده است . ابتدا سرعت تولید اکسیژن را بر حسب تغییر غلظت به دست آورده ، سپس یکای سرعت را تغییر داده (در حجم ظرف ضرب کرده) و برای محاسبه سرعت واکنش ، سرعت اکسیژن را بر ضریب آن تقسیم میکنیم. $\Delta T=15s=0.25min \quad \Delta [O_2] =0.3-0=0.3mol.min^{-1}$ $R=\frac{\Delta [B]}{\Delta T}$ $R(O_2)=0.3\div0.25=1.2mol.L^{-1}.min^{-1}\times2L=2.4\quad mol.min^{-1}$ $R\text{ (واکنش)} =2.4\div2=1.2mol.min^{-1}$																									

۱/۲۵	$2\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow 2\text{KCl}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta n\text{KClO}_3 = 0.18\text{molO}_2 \times \frac{2\text{molKClO}_3}{3\text{molO}_2} = 0.12\text{mol}$ $\text{molKClO}_3 = 1.08 + 0.12 = 1.20$ $\bar{R}(\text{KCl}) = \bar{R}(\text{KClO}_3) = \frac{\Delta n\text{KClO}_3}{\Delta t} = \frac{0.12}{4} = 0.03\text{mol/min}$	اگر در واکنش تجزیه پتاسیم کلرات مطابق معادله زیر پس از گذشت ۴ دقیقه ۱/۰۸ مول از آن باقی مانده و ۰/۱۸ مول اکسیژن تشکیل شده باشد: $2\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow 2\text{KCl}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g})$ آ مقدار اولیه پتاسیم کلرات را حساب کنید. ب) سرعت متوسط تشکیل پتاسیم کلرید چند مول بر دقیقه است؟	۲۸۷
۱/۲۵	ابتدا به کمک سرعت متوسط تولید O_2، سرعت تولید N_2 را محاسبه می کنیم. $\frac{\bar{R}(\text{N}_2)}{\bar{R}(\text{O}_2)} = \frac{2}{5} \Rightarrow \bar{R}(\text{N}_2) = \frac{2}{5} \times (5 \times 10^{-2}) = 2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ سپس به کمک سرعت متوسط تولید N_2، مقدار مول N_2 تولید شده و مدت زمان انجام واکنش، حجم ظرف واکنش را بدست می آوریم. $2 \times 10^{-2} = \frac{0.5}{2.5} \Rightarrow V = 10\text{L}$	اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن مطابق معادله زیر در یک ظرف دربسته برابر $5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ باشد و پس از ۲/۵ دقیقه کل KNO_3 تجزیه شده و ۰/۵ مول گاز نیتروژن تولید شده باشد، حجم ظرف واکنش چند لیتر است؟ $4\text{KNO}_3(\text{s}) \rightarrow 2\text{K}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{N}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g})$	۲۸۸


استان چهار محال و بختیاری - صفحات ۸۸ تا ۹۶			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۸۹	هر یک از عبارات‌های زیر را با انتخاب کلمه صحیح کامل کنید (آ) رادیکال گونه‌ای فعال و (پایدار/ ناپایدار) است و دارای اتم‌هایی است که از قاعده هشت-تایی پیروی (می‌کنند/ نمی‌کنند). با مصرف خوراکی‌های حاوی مواد بازدارنده، مقدار رادیکال‌ها در بدن (کاهش/ افزایش) می‌یابد. (ب) سهم تولید گاز کربن دی‌اکسید در رد پای غذا (بیشتر/ کمتر) از سوختن سوخت‌ها در خودروها و کارخانه هاست. (پ) یکی از راهکارهای شیمی سبز برای (کاهش مصرف انرژی/ کاهش تولید زباله) استفاده از غذاهای بومی و فصلی است. (ت) در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان اغلب سرعت متوسط مصرف واکنش‌دهنده‌ها (کاهش/ افزایش) و سرعت تولید فراورده‌ها (کاهش/ افزایش) می‌یابد.	(آ) ناپایدار- نمی‌کنند- کاهش (ب) بیشتر (پ) کاهش مصرف انرژی (ت) کاهش- کاهش	۱/۷۵
۲۹۰	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. برای موارد <u>نادرست</u> علت بنویسید (آ) در واکنش: $\text{C(g)} + \text{D(aq)} \rightarrow \text{B(g)}$ ، شیب نمودار غلظت-زمان برای ماده C بیشتر از بقیه مواد است. (ب) هر چه یک واکنش به پایش نزدیک‌تر شود، شیب نمودار مول-زمان فراورده‌ها در آن کندتر می‌شود. (پ) در واکنش: $\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO(g)} + \text{O}_2(\text{g})$ ، نسبت سرعت متوسط تولید NO به سرعت متوسط تولید O_2 برابر با $\frac{1}{2}$ است. (ت) سرعت متوسط تولید یک فراورده در لحظات آغازی واکنش بیشتر از لحظات پایانی واکنش است.	(آ) درست (ب) درست (پ) نادرست، برابر ۲ است. (ت) درست	۱/۲۵



۲	(آ) $\bar{R}(B) = \frac{-\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{0.001 \text{ mol}}{2 \text{ L} \times 240 \text{ s}} = 0.001 \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$ (ب) $A + 2B \rightarrow 2C$	نمودار زیر تغییرات مول سه ماده A و B و C را بر حسب زمان نشان می‌دهد. با توجه به نمودار به سوالات زیر پاسخ دهید. (آ) اگر حجم ظرف واکنش ۲ لیتر باشد سرعت متوسط مصرف ماده B را در بازه زمانی ۴ دقیقه بر حسب mol/L.s به دست آورید. (ب) معادله واکنش مربوطه را بنویسید. 
۱	منحنی C، زیرا لیکوپن به عنوان یک ماده بازدارنده است که فعالیت رادیکال‌های آزاد را کاهش می‌دهد و سبب کاهش سرعت واکنش می‌شود.	در نمودار زیر منحنی A تغییرمول برحسب زمان را برای فراورده یک واکنش که منجر به تولید رادیکال در بدن می‌شود را نشان می‌دهد. کدام یک از منحنی‌ها (B یا C) نشان‌دهنده انجام این واکنش در حضور لیکوپن می‌باشد؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید. 

۲/۲۵	(آ) نمودار تغییرات غلظت ماده $\text{NO}_2(\text{g})$ را نسبت به زمان نشان می‌دهد. زیرا این ماده فرآورده واکنش است و در زمان شروع واکنش ($t=0$ s)، دارای غلظت صفر است. با گذشت زمان و تولید فراورده غلظت $\text{NO}_2(\text{g})$ افزایش می‌یابد. (ب) $R(\text{B}) = \frac{1}{2} \times \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = \frac{0.16 \text{ mol.L}^{-1}}{2 \times 8 \text{ min}} = 0.01 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ $R(\text{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{-\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = \frac{0.16 \text{ mol.L}^{-1}}{2 \times 8 \text{ min}} = 0.01 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ در یک واکنش شیمیایی با گذشت زمان، سرعت واکنش کم می‌شود. (پ) سرعت متوسط تشکیل NO_2 دو برابر سرعت متوسط تجزیه N_2O_4 است.	برای واکنش $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NO}_2(\text{g})$ نمودار غلظت - زمان داده شده است. (آ) این نمودار تغییر غلظت کدام ماده $\text{NO}_2(\text{g})$ یا $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ را نسبت به زمان نشان می‌دهد؟ چرا؟ (ب) سرعت واکنش را در حالت های A و B بر حسب $\text{M} \cdot \text{min}^{-1}$ محاسبه کنید. از مقایسه این دو حالت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ (پ) بین سرعت متوسط تجزیه N_2O_4 و سرعت متوسط تشکیل NO_2 چه نسبتی وجود دارد؟										
۲	$\Delta V_{\text{H}_2, 2-8 \text{ mol}} = 1600 - 750 = 850 \text{ mL} = 0.85 \text{ L} \rightarrow \Delta n_{\text{H}_2, 2-8 \text{ min}}$ $= 0.85 \text{ L} \times \frac{1 \text{ mol}}{24 \text{ L}} = 0.035 \text{ mol}$ $\Delta[\text{H}_2] = \frac{0.035}{1/7} = 0.245 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \rightarrow \bar{R}_{\text{H}_2} = \frac{0.245}{6} = 0.041 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}}$ $\frac{\bar{R}_{\text{H}_2}}{1} = \frac{\bar{R}_{\text{HCl}}}{2} \rightarrow \bar{R}_{\text{HCl}} = 0.082 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}}$	مقداری روی را در ظرفی محتوی هیدروکلریک اسید می‌ریزیم. حجم هیدروژن تولید شده از این واکنش در جدول زیر آمده است. سرعت متوسط مصرف اسید (HCl) در فاصله <table border="1" data-bbox="884 750 1380 826"> <tr> <td>حجم گاز (ml)</td> <td>۷۵۰</td> <td>۱۲۵۰</td> <td>۱۵۰۰</td> <td>۱۶۰۰</td> </tr> <tr> <td>زمان (min)</td> <td>۲</td> <td>۴</td> <td>۶</td> <td>۸</td> </tr> </table> زمانی ۲ تا ۸ دقیقه چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (حجم مولی گازها را ۲۵ لیتر و حجم ظرف را ۱/۷ لیتر در نظر بگیرید). $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$	حجم گاز (ml)	۷۵۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰	زمان (min)	۲	۴	۶	۸
حجم گاز (ml)	۷۵۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰	۱۶۰۰								
زمان (min)	۲	۴	۶	۸								


۱/۲۵	آ) درست ب) درست پ) نادرست. شیب نصف و منفی	درست یا نادرست بودن هریک از عبارات زیر را معین کنید و علت نادرستی عبارات نادرست را بنویسید؟ آ) شیب نمودار فعالیت رادیکال ها در بدن انسان با مصرف لیکوپن کاهش می یابد. ب) سبک زندگی هر فرد باعث تفاوت در میزان نیاز و بهره مندی از منابع مانند آب و هوا و... می شود. پ) در واکنش تبدیل قند موجود در جوانه گندم (مالتوز) به گلوکز شیب نمودار سرعت مصرف مالتوز دو برابر شیب نمودار تولید گلوکز بوده و مثبت است	۲۹۵
۱/۷۵	آ) سیر نشده ب) چهار -۷۸ پ) آلی	ساختار کلسترول را در نظر گرفته و با انتخاب کلمه مناسب جملات را کامل کنید .  آ) یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است که یک الکل (سیر شده / سیر نشده) است. ب) فرمول مولکولی کلسترول $C_{27}H_{46}O$ با داشتن (سه / چهار) حلقه و تعداد پیوند کووالانسی برابر (هفتاد / هفتاد و هشت) می باشد. پ) کلسترول محلول در حلال های (آبی / آلی) است.	۲۹۶

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱/۵	(آ) تا سال ۲۰۱۰ منابع مورد نیاز برای تأمین غذا بیش از منابع موجود در سطح زمین بوده و پیش بینی می شود اگر از الگوی مصرف کنونی استفاده شود در سال ۲۰۴۰ برای تأمین غذای ساکنین کره زمین به دو کره زمین نیاز باشد ولی اگر از الگوی توسعه پایدار پیروی شود منابع یک کره زمین کافی است. (ب) با توجه به الگوی تولید و مصرف غذا انتظار می رود مدیران جامعه جهانی با طراحی و انتخاب راه حل های اجرایی مناسب و هماهنگ، بهره وری را در مراحل تولید و تأمین غذا افزایش دهند تا رد پای آن کاهش یابد.	شکل زیر پیش بینی مساحت زمین مورد نیاز برای تأمین غذا را نشان می دهد.  (آ) برداشت خود را از شکل بطور مختصر در دو سطر بنویسید. (ب) با توجه به الگوی تولید و مصرف غذا وظیفه مدیران جامعه جهانی چیست ؟
-----	---	---


استان بوشهر - صفحات ۸۸ تا ۹۶			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۲۹۸	با ذکر دلیل مشخص کنید هر یک از منحنی‌های (A,B,C) مربوط به کدام ماده شرکت‌کننده در واکنش زیر است. $2H_2O_2(aq) \rightleftharpoons 2H_2O(l) + O_2(g)$ 	B مربوط به H_2O_2 است. زیرا با گذشت زمان واکنش‌دهنده مصرف و غلظت آن کم می‌شود. A مربوط به O_2 است. زیرا با گذشت زمان فراورده تولید شده و غلظت آن افزایش می‌یابد. C مربوط به H_2O است و زیرا غلظت مایع خالص ثابت و نمودار آن افقی است.	۱/۵
۲۹۹	در شکل زیر گوی (●) ماده A و گوی (○) ماده B است. فرض کنید هر ذره معادل ۰/۴ مول از ماده باشد. (حجم ظرف ۲ لیتر است).  آ) سرعت متوسط مصرف A در ۱۰۰ ثانیه اول چند $mol.s^{-1}$ است؟ ب) سرعت متوسط تولید B در ۱۰۰ ثانیه دوم چند $mol.L^{-1}.min^{-1}$ است؟ پ) در معادله واکنش $aA(g) \rightarrow bB(g)$ ضرایب a و b را تعیین کنید.	آ) محاسبه مول A در زمان صفر: $5 \times 0.4 = 2 \text{ mol}$ محاسبه مول A در زمان ۱۰۰ ثانیه: $3 \times 0.4 = 1.2 \text{ mol}$ محاسبه سرعت A در ۱۰۰ ثانیه اول: $\bar{R}_A = -\frac{1/2 - 2}{100} = 8 \times 10^{-3}$ ب) محاسبه مول B در زمان ۱۰۰ ثانیه: $4 \times 0.4 = 1.6 \text{ mol}$ محاسبه مول B در زمان ۲۰۰ ثانیه: $6 \times 0.4 = 2.4 \text{ mol}$ محاسبه سرعت B در ۱۰۰ ثانیه دوم: $\bar{R}_B = +\frac{2/4 - 1/6}{2 \times 100} = 4 \times 10^{-3} \times \frac{60s}{1min} = 0.24 \frac{mol}{L.min}$ پ) تعیین a و b: $\frac{a}{b} = \frac{\Delta n(A)}{\Delta n(B)} = \frac{-1/8}{1/6} = \frac{1}{2} \quad a = 1 \quad b = 2$	۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

۲/۵	(آ) $2C \rightarrow A + 2B$ (ب) $\bar{R}(C) = \frac{-\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{-(0.02-0.06)}{50.s} = 0.0008 \text{ mol.L}^{-1}.s^{-1}$ (پ) $R(\text{واکنش}) = \frac{\bar{R}[C]}{2} = \frac{0.0008}{2} = 0.0004 \text{ mol.L}^{-1}.s^{-1}$ ت) ۱۰ تا ۲۰. زیرا شیب نمودار غلظت-زمان نشان دهنده سرعت تولید گونه است و سرعت تولید فرآورده تابع غلظت واکنش دهنده ها است که با گذشت زمان کم می شود.	با توجه به نمودار زیر که تغییرات غلظت A,B,C را نشان می دهد، به سوالات پاسخ دهید.  (آ) معادله واکنش را بنویسید. (ب) سرعت متوسط C را در ۵۰ ثانیه واکنش بر حسب mol/L بنویسید؟ (پ) سرعت واکنش را در طی این ۵۰ ثانیه بر حسب mol/L حساب کنید. ت) به نظر شما شیب نمودار B در زمان ۱۰-۲۰ بیشتر است یا ۴۰-۵۰؟ چرا؟	۳۰۰														
۲/۷۵	(آ) $\bar{R}(H_2O_2) = \frac{-\Delta[H_2O_2]}{\Delta t} = \frac{-(0.21-0.32)}{20.s} \times \frac{60.s}{1.min} = 0.33 \text{ mol.L}^{-1}.min^{-1}$ (ب) $\bar{R}(O_2) = \frac{1}{2}\bar{R}(H_2O_2) = 0.165 \text{ mol.L}^{-1}.min^{-1}$ (پ) $R(\text{واکنش}) = \bar{R}(O_2) = 0.165 \text{ mol.L}^{-1}.min^{-1}$ ت) ۲۰ ثانیه اول < ۴۰ ثانیه < ۲۰ ثانیه دوم ث) پتاسیم یدید	با توجه به جدول زیر که مربوط به مصرف H_2O_2 طی واکنش های زیر پاسخ دهید. $2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$ <table border="1" data-bbox="888 725 1358 799"><tr><th>زمان (s)</th><th>۰</th><th>۱۰</th><th>۲۰</th><th>۳۰</th><th>۴۰</th><th>۵۰</th></tr><tr><th>$[H_2O_2]$</th><td>۰/۵۰</td><td>۰/۴۰</td><td>۰/۳۲</td><td>۰/۲۶</td><td>۰/۲۱</td><td>۰/۱۸</td></tr></table> (آ) سرعت متوسط مصرف H_2O_2 در ۲۰ ثانیه دوم، چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (ب) سرعت متوسط تولید O_2 در ۲۰ ثانیه دوم، چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (پ) سرعت واکنش در ۲۰ ثانیه دوم ، چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (ت) سرعت واکنش را در ۲۰ ثانیه اول، ۲۰ ثانیه دوم و در ۴۰ ثانیه شروع واکنش مقایسه کنید. ث) با چه کاتالیزگری می توان سرعت این واکنش را افزایش داد؟	زمان (s)	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	$[H_2O_2]$	۰/۵۰	۰/۴۰	۰/۳۲	۰/۲۶	۰/۲۱	۰/۱۸	۳۰۱
زمان (s)	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰											
$[H_2O_2]$	۰/۵۰	۰/۴۰	۰/۳۲	۰/۲۶	۰/۲۱	۰/۱۸											



بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۲ (آ) نادرست- منحنی شماره ۱ مربوط به گاز NO می باشد زیرا ضریب استوکیومتری آن در معادله دو برابر گاز اکسیژن است. (ب) نادرست- با توجه به ضرایب آنها در معادله شیب منحنی NO تندتر از شیب منحنی O_۲ است. (پ) درست- با توجه به مصرف شدن گاز NO_۲ شیب نمودار منفی است و ضریب آن در معادله که با ضریب NO برابر است. (ت) درست- زیرا ضریب گاز O_۲ در معادله نصف ضریب گاز NO_۲ است.	با توجه به واکنش و نمودار داده شده که تغییر غلظت واکنش دهنده ها و فرآورده ها را در واکنش گازی: $2NO_2 \rightarrow 2NO + O_2$ نشان می دهد، درستی یا نادرستی هر جمله را (با نوشتن علت) مشخص کنید.  (آ) منحنی شماره ۱ تغییرات غلظت مولی O_۲ را نسبت به زمان نشان می دهد. (ب) شیب منحنی O_۲ نسبت به NO تندتر است. (پ) منحنی شماره ۳ تغییرات غلظت مولی NO_۲ را نسبت به زمان نشان می دهد و شیب آن با شیب منحنی NO یکسان است. (ت) سرعت متوسط تولید گاز O_۲ نصف سرعت متوسط مصرف گاز NO_۲ است. ۳۰۲												
۲ (آ) ماده B- با توجه به اطلاعات جدول متوجه می شویم که مقدار مول بر حسب گذشت زمان در حال افزایش است؛ یعنی نمودار مول - زمان صعودی است، بنابراین داده ها مربوط به فرآورده واکنش است. در اینجا فرآورده واکنش ماده B است. (ب) ۳۰ ثانیه- از زمان ۳۰ ثانیه به بعد تغییرات مول وجود ندارد (Δn=۰)، یعنی واکنش به اتمام رسیده است. (پ) $\bar{R}_B = + \frac{\Delta n_B}{\Delta t} = + \frac{(0.018 - 0.015) \text{ mol}}{(30 - 20) \text{ s}} = 0.0003 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 0.018 \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$ $\frac{\bar{R}_A}{2} = \frac{\bar{R}_B}{1} \rightarrow \bar{R}_A = 2\bar{R}_B \rightarrow \bar{R}_A = 2(0.018) = 0.036 \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$	داده های عددی جدول زیر مربوط به تغییرات مول واکنش $2A(g) \rightarrow B(g)$ است. با توجه به جدول به سوالات پاسخ دهید. <table border="1" data-bbox="948 781 1315 860"><tr><td>مول</td><td>۰/۰۱۸</td><td>۰/۰۱۸</td><td>۰/۰۱۵</td><td>۰/۰۱۲</td><td>۰/۰۱</td></tr><tr><td>زمان (s)</td><td>۴۰</td><td>۳۰</td><td>۲۰</td><td>۱۰</td><td>۰</td></tr></table> (آ) داده های عددی جدول مربوط به ماده A است یا ماده B؟ چرا؟ (ب) واکنش در چه زمانی به اتمام رسیده است؟ (پ) سرعت متوسط مصرف ماده A را در ده ثانیه سوم بر حسب mol.min^{-۱} بیابید. (ت) سرعت واکنش را در بازه زمانی ۰ تا ۲۰ ثانیه بر حسب mol.s^{-۱} بیابید. ۳۰۳	مول	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۵	۰/۰۱۲	۰/۰۱	زمان (s)	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۰
مول	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸	۰/۰۱۵	۰/۰۱۲	۰/۰۱								
زمان (s)	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۰								



	(ت)		
	$R_{\text{واکنش}} = \bar{R}_B = + \frac{\Delta n_B}{\Delta t} = + \frac{(0.015 - 0.01) \text{ mol}}{(20 - 0) \text{ s}} = 0.00025 \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1}$		
۱/۲۵	(آ) $2B \rightarrow 3A + C$ (ب) $\frac{\bar{R}(A)}{3} = \frac{\bar{R}(B)}{2} \rightarrow \bar{R}(B) = \frac{2}{3} \bar{R}(A) = \frac{2 \times 2}{3} = 1.33 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$	معادله سرعت واکنشی به صورت $+\frac{\Delta n(A)}{3\Delta t} = -\frac{\Delta n(B)}{2\Delta t} = +\frac{\Delta n(C)}{\Delta t}$ است: (آ) معادله موازنه شده واکنش را بنویسید. (ب) اگر سرعت متوسط تولید با مصرف ماده A برابر $2 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$ باشد، سرعت متوسط تولید با مصرف ماده B را بیابید.	۳۰۴
۱/۲۵	(آ) ماده A- نمودار (a) نزولی است، یعنی مقدار مول با گذشت زمان کاهش می‌یابد. بنابراین مربوط به واکنش دهنده است. (ب) $\bar{R}(B) = + \frac{\Delta n_B}{\Delta t} = + \frac{0.028 - 0.022}{6 - 4} = \frac{0.006}{2} = 0.003 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 0.18 \frac{\text{mol}}{\text{min}}$	نمودار زیر مربوط به واکنش $A \rightarrow 2B$ است:  (آ) نمودار (a) مربوط به کدام ماده A یا B است؟ چرا؟ (ب) سرعت متوسط تولید ماده B در دو ثانیه سوم، را بر حسب $\text{mol} \cdot \text{min}^{-1}$ بیابید.	۳۰۵
۰/۷۵	رادیکال، گونه فعال و ناپایداری است که در ساختار خود، الکترون جفت نشده دارد، در واقع محتوی اتم هایی است که از قاعده هشت تایی پیروی نمی کنند.	رادیکال را تعریف کنید.	۳۰۶
۱	ماده A- معادله موازنه شده واکنش $4A + B \rightarrow 2C$ است. شیب نمودار مول - زمان برای هر یک از شرکت کننده ها در واکنش، متناسب با ضریب استوکیومتری آن است. بنابراین ماده A که ضریب استوکیومتری آن از بقیه مواد بیشتر است، شیب نمودار مول-زمان آن بیشتر است.	شیب نمودار مول-زمان برای کدام ماده واکنش دهنده یا فراورده در واکنش زیر بیشتر است؟ دلیل بنویسید. $R_r = - \frac{\Delta n(A)}{4\Delta t} = - \frac{\Delta n(B)}{\Delta t} = + \frac{\Delta n(C)}{2\Delta t}$	۳۰۷

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۳۰۸	درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت نادرست بودن علت آن را بنویسید؟ (آ) در واکنش با گذشت زمان، مقدار و سرعت متوسط تولید فراورده ها افزایش می یابد. (ب) میوه ها و سبزیجات محتوی ترکیبات آلی سیرشده ای به نام ریز مغذی ها هستند. (پ) لیکوپن یک هیدروکربن سیرنشده است که در حضور کاتالیزگر نیکل با مولکول هیدروژن واکنش می دهد. (ت) تولید گاز کربن دی اکسید در چهره پنهان ردپای غذا، کمتر از سوختن سوخت ها در خودروها و کارخانه ها است. (ث) در چهره آشکار ردپای غذا سالانه حدود ۳۰درصد غذایی که در جهان فراهم میشود به مصرف نمی رسد.	۲	(آ) نادرست. با گذشت زمان مقدار فرآورده ها زیاد می شود، ولی سرعت متوسط تولید آن ها کم می شود. زیرا سرعت متوسط تولید فرآورده تابع غلظت واکنش دهنده ها است. (ب) نادرست. ترکیبات آلی سیرنشده ای درست (پ) درست (ت) نادرست. بیشتر از سوختن سوخت ها در خودروها و کارخانه ها است. (ث) درست												
۳۰۹	جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. (آ) هندوانه و گوجه محتوی بوده که فعالیت رادیکال ها را کاهش می دهد. (ب) در واکنش فرضی زیر، سرعت متوسط گونه..... بر حسب mol/Ls از سایر گونه های واکنش دهنده و فرآورده بیشتر است. $\Delta A(l) + 2B(s) \rightarrow 4C(aq) + D(g)$	۰/۵	(آ) لیکوپن (ب) C												
۳۱۰	با توجه به جدول زیر که مربوط به تجزیه N_2O_5 است به سوالات پاسخ دهید. $2N_2O_{5(g)} \rightarrow 4NO_{2(g)} + O_{2(g)}$ <table border="1"><thead><tr><th>زمان (s)</th><th>۰</th><th>۵</th><th>۱۰</th><th>۱۵</th><th>۲۰</th></tr></thead><tbody><tr><td>$\times 10^{-2} [N_2O_5]$</td><td>۴/۱</td><td>۳/۱</td><td>۲/۵</td><td>۲/۱</td><td>۱/۸</td></tr></tbody></table> (آ) سرعت متوسط تجزیه N_2O_5 در ۱۰ ثانیه دوم، چند مول بر لیتر بر ثانیه است؟ (ب) سرعت متوسط تولید O_2 در ۱۰ ثانیه دوم، چند مول بر لیتر بر ثانیه است؟ (پ) سرعت واکنش در ۱۰ ثانیه دوم، چند مول بر لیتر بر ثانیه است؟ (ت) سرعت واکنش را در ۵ ثانیه اول، ۵ ثانیه دوم و در ۱۰ ثانیه اول واکنش مقایسه کنید؟	زمان (s)	۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰	$\times 10^{-2} [N_2O_5]$	۴/۱	۳/۱	۲/۵	۲/۱	۱/۸	۲.۷۵	(آ) $\bar{R}(N_2O_5) = -\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t} = \frac{-(1.8 - 2.5) \times 10^{-2} mol.L^{-1}}{10 s}$ $= 7 \times 10^{-4} \frac{mol}{L.s}$ (ب) $\bar{R}(O_2) = \bar{R}(N_2O_5) \times \frac{1}{2} = 3.5 \times 10^{-4} \frac{mol}{L.s}$ (پ) $R(\text{واکنش}) = \bar{R}(O_2) = 3.5 \times 10^{-4} \frac{mol}{L.s}$ (ت) ۵ ثانیه اول < ۱۰ ثانیه < ۵ ثانیه دوم
زمان (s)	۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰										
$\times 10^{-2} [N_2O_5]$	۴/۱	۳/۱	۲/۵	۲/۱	۱/۸										

۲/۲۵	(آ) $\bar{R}(H_2O_2) = \frac{-\Delta n}{V \cdot \Delta t} = \frac{-(0.05 - 0.1) \text{ mol}}{2 \text{ L} \times 20 \text{ s}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 0.075 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}}$ (ب) $\bar{R}(O_2) = \bar{R}(H_2O_2) \times \frac{1}{2} = 0.0375 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}}$ (پ) $R(\text{واکنش}) = \bar{R}(O_2) = 0.0375 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}}$ (ت) پتانسیم یدید	نمودار زیر مربوط به تغییر مول‌های هیدروژن پراکسید در ظرفی به حجم دو لیتر در دمای اتاق است. با توجه به واکنش به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. $2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$  (آ) سرعت متوسط مصرف H_2O_2 طی ۲۰ ثانیه اول چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (ب) سرعت متوسط تولید O_2 گازی طی این ۲۰ ثانیه چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (پ) سرعت واکنش را در طی این ۲۰ ثانیه چند مول بر لیتر بر دقیقه است؟ (ت) با چه کاتالیزوری می‌توان سرعت واکنش را افزایش داد؟	۳۱۱
۲	(آ) نمودار (۱)، با گذشت زمان شیب نمودار مول - زمان کاهش می‌یابد، زیرا غلظت واکنش دهنده کاهش می‌یابد، سرعت مصرف واکنش دهنده کاهش می‌یابد. (ب) برای جامدها و مایعات خالص به صورت خط ثابت چون غلظت ثابت است. (پ) (۲)، با گذشت زمان شیب نمودار مول - زمان کاهش می‌یابد، زیرا سرعت تولید فرآورده تابع غلظت واکنش دهنده‌ها است.	(آ) کدام نمودار تغییرات غلظت A را در واکنش $A(aq) \rightarrow B(s) + C(aq)$ نشان می‌دهد؟ چرا؟ 	۳۱۲


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

		ب) نمودار غلظت - زمان فرآورده B به چه صورت خواهد بود؟ چرا؟ پ) کدام نمودار، نمودار غلظت - زمان فرآورده C را نشان می دهد؟   ۱ ۲	
--	--	--	--




استان ایلام - صفحات ۸۸ تا ۹۶			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۳۱۳	درست یا نادرست بودن گزینه‌های زیر را معین کنید. موارد نادرست را اصلاح و یا دلیل نادرست بودن آن را بیان کنید. آ) شیب نمودار مول- زمان ذره‌های شرکت‌کننده در واکنش، مستقل از استوکیومتری آنها است. ب) ریزمغذی‌ها ترکیب‌های آلی سیرشده‌ای هستند که منشا تولید رادیکال‌ها آزاد در بدن می‌باشند. پ) رادیکال‌ها ذره‌های فعال و پرنرزی هستند که به عنوان بازدارنده در واکنش‌های شیمیایی ناخواسته و مضر بدن، عمل می‌کنند و برای بدن مفید هستند. ت) ریزمغذی‌ها در بدن هنگام برخورد با رادیکال‌های آزاد، نقش کاتالیزگر را ایفا می‌کنند.	آ) نادرست- شیب نمودار مول- زمان ذره‌های شرکت‌کننده در واکنش، مستقل از ضرایب استوکیومتری آنها نیست و به آنها بستگی دارد. ب) نادرست- ریز مغذی‌ها ترکیب های آلی سیر نشده‌ای هستند که سبب به دام افتادن و کاهش مقدار رادیکال‌های ایجاد شده در بدن می‌شوند. پ) نادرست- رادیکال‌های با فعالیت و انرژی زیادی که دارند نه تنها نقش بازدارنده واکنش‌های ناخواسته را ندارند بلکه باعث آسیب رساندن به بافت‌های بدن می‌شوند و خود برای بدن مضر هستند. ت) نادرست- ریزمغذی‌ها در بدن در برخورد با رادیکال‌های آزاد نقش بازدارنده را ایفا می‌کنند نه کاتالیزگر.	۲
۳۱۴	در واکنش زیر اگر مقدار گاز تولید شده پس از گذشت ۳۰ ثانیه از ابتدای واکنش، برابر ۸/۹۶ لیتر باشد. سرعت متوسط مصرف HCl را بر حسب مول بر دقیقه حساب کنید. (شرایط واکنش را STP فرض کنید) $\text{CaCO}_3(s) + 2\text{HCl}(aq) \rightarrow \text{CaCl}_2(aq) + \text{CO}_2(g)$	تنها گاز تولید شده در این واکنش CO_2 است. پس از ۳۰ ثانیه ۸/۹۶ لیتر از آن تولید شده است. پس: $? \text{mol CO}_2 = \frac{8.96 \text{ LCO}_2}{22.4 \text{ LCO}_2} \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{1} = 0.4 \text{ mol CO}_2$ $\bar{R}(\text{CO}_2) = \frac{\Delta n_{\text{CO}_2}}{\Delta t} = \frac{0.4 \text{ mol}}{5 \text{ min}} = 0.08 \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$ باتوجه به رابطه سرعت و ضرایب استوکیومتری: $\bar{R}(\text{HCl}) = 2\bar{R}(\text{CO}_2) = 2 \times 0.08 = 0.16 \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$	۱/۵


بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	$R(\text{واکنش}) = + \frac{\Delta n(NO)}{4\Delta t} \rightarrow \cdot / \cdot = \frac{n2(NO) - \cdot}{4 \times \cdot / 5}$ $n_2(NO) = \cdot / 2 \text{ mol}$ تعداد مول‌های NO تولید شده پس از گذشت ۳۰ ثانیه = ۰/۲ مول $? \text{ molecules NO} = \cdot / 2 \text{ mol} \times \frac{6 / \cdot 2 \times 10^{23} \text{ molecules NO}}{1 \text{ mol NO}} = 1 / 2 \cdot 4 \times 10^{23} \text{ molecules NO}$	اگر سرعت واکنش زیر $0.1 \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1}$ باشد. پس از گذشت ۳۰ ثانیه از شروع واکنش انتظار می‌رود که چند مولکول گاز NO تولید شود؟ (با فرض ثابت بودن سرعت تولید گاز NO در طول واکنش) $4 \text{ NH}_3 (\text{g}) + 5 \text{ O}_2 (\text{g}) \rightarrow 4 \text{ NO} (\text{g}) + 6 \text{ H}_2\text{O} (\text{g})$	۳۱۵
۲	با توجه به ضرایب استوکیومتری واکنش: $\bar{R}(\text{N}_2\text{O}_5) = 2 \bar{R}(\text{O}_2) = 2 \times \cdot / \cdot 25 = \cdot / \cdot 5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ $? \text{ mol N}_2\text{O}_5 = 6 / 48 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{108 \text{ g}} = \cdot / \cdot 6 \text{ mol}$ $[\text{N}_2\text{O}_5] = \frac{\cdot / \cdot 6 \text{ mol}}{3 \text{ L}} = \cdot / \cdot 2 \text{ مولار}$ $\bar{R}(\text{N}_2\text{O}_5) = - \frac{\Delta[\text{N}_2\text{O}_5]}{\Delta t} = \cdot / \cdot 5$ $- \frac{[\text{N}_2\text{O}_5]_2 - [\text{N}_2\text{O}_5]_1}{\Delta t} = - \frac{\cdot - \cdot / \cdot 2}{\Delta t}$ $\Delta t = \frac{\cdot / \cdot 2}{\cdot / \cdot 5} = \cdot / 4 \text{ min}$ $\cdot / 4 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 24 \text{ s}$	واکنش زیر در یک ظرف ۳ لیتری در حال انجام است. اگر سرعت متوسط تولید اکسیژن $0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ باشد چند ثانیه طول می‌کشد که مقدار ۶/۴۸ گرم گاز N_2O_5 مصرف شود؟ (N=۱۴, O= ۱۶ g/mol) $2 \text{ N}_2\text{O}_5 (\text{g}) \rightarrow 4 \text{ NO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g})$	۳۱۶

۲/۵ آ) در ابتدای واکنش چون غلظت مواد واکنش دهنده بیشتر است، سرعت تولید یا مصرف مواد که همان شیب نمودار تغییرات مول یا غلظت بر حسب زمان است، نیز زیادتر است. با پیشرفت واکنش و کاهش مقدار یا غلظت مواد واکنش دهنده، سرعت تولید یا مصرف مواد شرکت کننده در واکنش نیز کاهش می یابد. ب) چون شیب نمودار افزایشی و مثبت است پس نمودار مربوط به تغییرات غلظت یکی از فراورده ها است. باتوجه به ضرایب استوکیومتری واکنش و رابطه سرعت متوسط تولید محصولات با سرعت واکنش، اگر نمودار مربوط به H_2 باشد باید سرعت متوسط نمودار سه برابر سرعت واکنش باشد و اگر مربوط به آلومینیم کلرید باشد باید سرعت آن دو برابر سرعت واکنش باشد: $R(\text{واکنش}) = \frac{\bar{R}(AlCl_3)}{2} = \frac{\bar{R}(H_2)}{3}$ $R(\text{واکنش}) = 0.06 \text{ mol.min}^{-1} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 0.001 \text{ mol.s}^{-1}$ $\bar{R}(\text{نمودار}) = \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{0.09}{30} = 0.003 \text{ mol.s}^{-1}$ $\frac{\bar{R}(\text{نمودار})}{R(\text{واکنش})} = \frac{0.003 \text{ mol/s}}{0.001 \text{ mol/s}} = 3$ نمودار مربوط به H_2 است.	باتوجه به واکنش زیر و نمودار نشان داده شده، به سوالات پاسخ دهید. $2 Al(s) + 6 HCl(aq) \rightarrow 2 AlCl_3(aq) + 3 H_2(g)$  آ) چرا شیب نمودار در زمان های آغازین واکنش زیاد و هر چه به پایان واکنش نزدیک می شویم، کمتر می شود؟ ب) باتوجه به نمودار، ۳۰ ثانیه پس از شروع واکنش، واکنش به پایان می رسد. اگر سرعت واکنش $0.06 \text{ mol.min}^{-1}$ باشد، نمودار دقیقاً نشان دهنده تغییرات غلظت کدام یک از اجزای واکنش است؟ با دلیل و انجام محاسبات نشان دهید.
--	---

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۷۵	آ درست ب) نادرست - زیرا مواد در حالت فیزیکی جامد غلظت ثابتی دارند پس نمی توان سرعت متوسط را بر حسب تغییرات غلظت آن ها گزارش کرد. پ) نادرست- در یک واکنش همواره با گذشت زمان، سرعت متوسط مصرف یا تولید یک ماده کاهش می یابد. ت) نادرست - از روی ضرایب ماده ها در واکنش، فقط می توان تغییرات مول ماده ها (یعنی میزان تولید یا مصرف) را در بازه زمانی معین پیش بینی کرد نه مقدار مول آنها را.	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل را بنویسید. آ) سهم تولید گاز کربن دی اکسید در رد پای غذا به مراتب بیشتر از سوختن سوخت ها در کارخانه ها است. ب) در واکنش: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ سرعت متوسط مصرف کربن به صورت $\frac{\Delta[C]}{\Delta t}$ می باشد. پ) در واکنش گازی $2A \rightarrow 4B + C$ با گذشت زمان سرعت متوسط مصرف A کاهش و سرعت متوسط تولید B افزایش می یابد. ت) در واکنش گازی $2B \rightarrow 4C + 3D$ تعداد مول های ماده C در هر لحظه از انجام واکنش دو برابر B است.	۳۱۸
۱/۲۵	آ $A \rightarrow B$ ب) با توجه به اینکه در زمان ۱۰ ثانیه، چهار گوی سفید (A) وجود دارد و در زمان ۲۰ ثانیه، ۳ گوی سفید و هر گوی معادل ۰/۱mol است پس داریم: $\bar{R}(A) = \frac{-\Delta[A]}{\Delta t}$ $\bar{R}(A) = -\frac{0.4}{10} = 0.04 \text{ mol.s}^{-1}$ $\bar{R}(A) = \frac{0.4}{20} = 0.02 \text{ mol.L}^{-1}.s^{-1}$	با توجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید.(حجم ظرف ۲ لیتر است)  t=۰ s  t=۱۰ s  t=۲۰ s ۰/۱mol A = ○ ۰/۱ mol B = ● آ) معادله موازنه شده واکنش را بنویسید. ب) سرعت متوسط مصرف A را در ۱۰ ثانیه دوم بر حسب مول بر لیتر بر ثانیه محاسبه کنید	۳۱۹

۱/۷۵	(آ) $\bar{R}(O_2) = \frac{1}{2} \bar{R}(Cl_2) = \frac{1}{2} \times 4 \text{ mol.L}^{-1}.s^{-1} \times 2L \times \frac{60s}{1min} = 24 \text{ mol.min}^{-1}$ ب) HCl - چون از بین مواد شرکت کننده در واکنش دارای ضریب بالاتری است.	واکنش زیر در یک ظرف به حجم ۲L در حال انجام است و سرعت متوسط تولید گاز کلر برابر $4 \text{ mol.L}^{-1}.s^{-1}$ می باشد. $4HCl(g) + O_2(g) \rightarrow 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$ (آ) سرعت متوسط مصرف گاز O_2 بر حسب mol.min^{-1} را محاسبه کنید. ب) از بین مواد شرکت کننده در واکنش، سرعت متوسط تولید یا مصرف کدام ماده بیشتر است؟ چرا؟	۳۲۰
۰/۷۵	a: NO_2 , b: NO , c: O_2	با توجه به واکنش گازی: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ و شکل زیر مشخص کنید هر یک از نمودارهای a, b و c مربوط به کدام ماده است؟ 	۳۲۱
۰/۷۵	$2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$	با توجه به رابطه زیر، معادله شیمیایی موازنه شده واکنش را بنویسید. (همه مواد گازی هستند). $R_{\text{واکنش}} = \frac{-\Delta n_{N_2O_5}}{2\Delta t} = \frac{+\Delta n_{NO_2}}{4\Delta t} = \frac{+\Delta n_{O_2}}{\Delta t}$	۳۲۲

۳۲۳

داده‌های زیر برای واکنش $2NO_2(g) \rightarrow 2NO(g) + O_2(g)$ به دست آمده است.

(آ) سرعت متوسط مصرف $NO_2(g)$ در ده ثانیه اول برابر چند $\frac{mol}{L.min}$ است؟

(ب) اگر واکنش با همین سرعت (قسمت آ) پیش برود چند ثانیه زمان لازم است که واکنش به پایان برسد؟

(پ) نسبت سرعت واکنش در ۱۰ ثانیه اول به ۱۰ ثانیه دوم را حساب کنید.

زمان (S)	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰
$[NO_2]$	۰/۵	۰/۴۲	۰/۳۶	۰/۳۲	۰/۳

$$\Delta[NO_r] = [NO_r]_r - [NO_r]_i = 0/42 - 0/5 = -0/08 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\Delta t = t_r - t_i = 10 - 0 = 10 \text{ s} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = \frac{1}{6} \text{ min} \quad (\bar{\Gamma})$$

$$\bar{R}(NO_r) = -\frac{\Delta[NO_r]}{\Delta t} = -\frac{-0/08 \text{ mol.L}^{-1}}{\frac{1}{6} \text{ min}} = 0/48 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$0/48 = \frac{0/42}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{0/42}{0/48} \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 52/5 \text{ s} \quad (\text{ب})$$


$$52/5 + 10 = 62/5 \text{ s}$$

$$R_{-i} = \frac{1}{r} \bar{R}(NO_r) = \frac{1}{r} \times \frac{-(-0/08) \text{ mol.L}^{-1}}{10 \text{ s}} = 0/004 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$R_{i-r} = \frac{1}{r} \bar{R}(NO_r) = \frac{1}{r} \times \frac{-(0/36 - 0/42) \text{ mol.L}^{-1}}{(20 - 10) \text{ s}} = 0/003 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (\text{پ})$$


$$\frac{R_i}{R_r} = \frac{0/004}{0/003} = \frac{4}{3}$$

۴


۱	آ) B - چون با افزایش غلظت مواد واکنش دهنده ، سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد (شیب منحنی) افزایش می یابد. ب) C - چون با کاهش دما ، سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد (شیب منحنی) کاهش می یابد.	در نمودار زیر ، منحنی A برای واکنش محلول هیدروکلریک اسید 0.1 mol.L^{-1} با مقدار کافی کلسیم کربنات در دمای اتاق رسم شده است با دلیل مشخص کنید در هر یک از موارد زیر کدام منحنی (B یا C) تغییر مول‌های کربن دی اکسید را با گذشت زمان به درستی نشان می دهد. $\text{CaCO}_3(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCl}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ آ) انجام واکنش با محلول 0.2 mol.L^{-1} اسید: ب) قرار دادن ظرف واکنش در یخ : 	۳۲۴
۱	آ) کم‌تر ب) افزایش پ) بازدارنده‌ها - کاهش	با انتخاب کلمه مناسب از درون پرانتز ، جملات زیر را تکمیل کنید. آ) سرعت یک واکنش در دقیقه دوم از دقیقه اول آن (کم‌تر - بیشتر) است. ب) افزودنی‌ها سبب (افزایش - کاهش) زمان ماندگاری و کیفیت مواد غذایی می شوند. پ) لیکوپن جزء (بازدارنده‌ها - کاتالیزورها) است و فعالیت رادیکال‌ها را (کاهش - افزایش) می دهد.	۳۲۵

استان البرز - صفحات ۹۹ تا ۱۰۹			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۳۲۶	با توجه به شکل های زیر به سوالات پاسخ دهید:  (۱) (۲) آ) کدام پلی اتن در تهیه کیسه پلاستیکی کاربرد دارد؟ ب) کدام پلی اتن استحکام بیشتری دارد؟ پ) کدام پلی اتن کدر است و کدام پلی اتن چگالی بیشتری دارد؟	آ) ساختار (۱) پلی اتن سبک ب) ساختار (۲) پلی اتن سنگین پ) پلی اتن (۲) کدر است و پلی اتن (۱) چگالی بیشتری دارد.	۱
۳۲۷	در رابطه با الیاف طبیعی و مصنوعی به سوالات زیر پاسخ دهید: آ) چرا الیاف طبیعی مانند پنبه و پشم نسبت به الیاف مصنوعی مانند نایلون و پلی استر، قابلیت جذب رطوبت بیشتری دارند؟ با توجه به ساختار مولکولی و نیروهای بین مولکولی، این تفاوت را توضیح دهید. ب) چرا این تفاوت در صنعت نساجی مهم است؟	آ) الیاف طبیعی مانند پنبه و پشم از مولکول های بزرگی تشکیل شده اند که به هم پیوند خورده اند. این مولکول ها دارای گروه های عاملی مانند هیدروکسیل (OH) هستند. این گروه ها می توانند با مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. پیوند هیدروژنی یک پیوند قوی بین مولکول ها است. از طرف دیگر، الیاف مصنوعی مانند نایلون و پلی استر معمولاً ساختار ساده تری دارند و گروه های عاملی کمتری دارند. این الیاف بیشتر به وسیله نیروهای واندروالس به هم متصل شده اند که پیوندهای ضعیف تری هستند. ب) پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب و الیاف طبیعی باعث می شود که الیاف طبیعی بتوانند مقدار زیادی آب را جذب کنند. این ویژگی باعث می شود که پارچه های طبیعی احساس نرمی و راحتی بیشتری داشته باشند و در فصل های گرم سال خنک تر باشند.	۱/۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

	نیروهای واندروالس: نیروهای واندروالس بین مولکول‌های الیاف مصنوعی ضعیف‌تر هستند و نمی‌توانند مقدار زیادی آب را جذب کنند. در نتیجه، پارچه‌های مصنوعی معمولاً خشک‌تر و کمتر قابلیت جذب دارند	
۳۲۸	چرا کیسه‌های پلاستیکی معمولاً از پلی‌اتن سبک ساخته می‌شوند، در حالی که بطری‌های شیر از پلی‌اتن سنگین تولید می‌شوند؟ با توجه به ساختار و خواص این دو نوع پلی‌اتن، به طور دقیق توضیح دهید.	۱
۳۲۹	نمودار زیر روند تولید الیاف پلی‌استر، پنبه و پشم را نشان می‌دهد. با توجه به آن،  (آ) مشخص کنید هر نمودار مربوط به کدام الیاف است؟ (ب) کدام الیاف در طبیعت یافت نمی‌شوند؟	۱

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴


۱/۵	آ) تفلون ب) نقطه ذوب بالا، مقاومت در برابر گرما، نجسب بودن، حل نشدن در حلال‌های آلی و بی‌اثر بودن از نظر شیمیایی	آ) شکل زیر، کاربرد کدام پلیمر را نشان می‌دهد؟ ب) کدام ویژگی‌های این پلیمر سبب کاربرد آن در این شکل شده است؟ 	۳۳۰
۰/۵	ا: الیاف سلولز ب: گلوکز	شکل زیر نمایی ساده از الیاف و مولکول‌های سازنده آن را نشان می‌دهد. نام هر یک از موارد a و b را بنویسید. 	۳۳۱
۱	آ) پلی سیانواتن ب) واحد تکرار شونده: $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ -\text{C}-\text{C}- \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{CN} \end{array}$ پ) ساختار مونومر: $\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{CN} \end{array}$ ت) برای تولید پتو	شکل زیر بخشی از ساختار یک پلیمر را نشان می‌دهد. با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید. $\begin{array}{cccccccc} \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & & & & & \\ -\text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- & \text{C}- \\ & & & & & & & \\ \text{H} & \text{CN} & \text{H} & \text{CN} & \text{H} & \text{CN} & \text{H} & \text{CN} \end{array}$ آ) نام این پلیمر چیست؟ ب) واحد تکرار شونده را مشخص کنید. پ) ساختار مونومر این پلیمر را رسم کنید. ت) کاربرد این مونومر را بنویسید.	۳۳۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴


۱	(آ) $\begin{array}{c} \text{H} & & \text{Cl} \\ & \backslash & / \\ & \text{C} = \text{C} \\ & / & \backslash \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$ (ب) $\begin{array}{c} \text{H} & \text{Cl} \\ & \\ -\text{C} & - & \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$ (پ) پلی وینیل کلرید	(آ) ساختار مونومر تشکیل دهنده پلیمری را رسم کنید که در تهیه کیسه خون استفاده می - شود. (ب) واحد تکرارشونده این پلیمر را رسم کنید. (پ) نام این پلیمر چیست؟	۳۳۳
---	--	--	-----

استان اصفهان - صفحات ۹۹ تا ۱۰۹			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۳۳۴	سلولز و نشاسته دو درشت مولکول طبیعی هستند که واحدهای سازنده آنها گلوکز است. آ) تفاوت میان ساختار این دو درشت مولکول چیست؟ ب) آیا نتیجه گیری زیر در مورد الیاف سازنده پنبه درست است؟ چرا؟ "الیاف پنبه که از سلولز ساخته شده اند تعداد واحدهای گلوکز یکسان دارند."	آ) ساختار و نحوه اتصال مولکول های گلوکز در این دو پلیمر با هم متفاوت است. ب) خیر، پلیمرها فرمول مولکولی دقیق ندارند چون تعداد دقیق مونومرهایی که در ساختار هر کدام به هم متصل می شود، مشخص نیست.	۰/۷۵
۳۳۵	آ) شکل روبه رو معرف کدام پلیمر است؟ فرمول شیمیایی مونومر سازنده آن را بنویسید. ب) دو مورد از ویژگی های این پلیمر را بنویسید.	آ) پلی تترا فلئورو اتن (تفلون)، $(CF_2 = CF_2)$ یا C_2F_4 ب) از نظر شیمیایی بی اثر است. نقطه ذوب بالایی دارد.	۱
۳۳۶	آ) پلیمر یا مونومر هریک از موارد زیر را بنویسید. $\left[CH_2 - \underset{\substack{ \\ Cl}}{\overset{\substack{H \\ }}{C}} \right]_n$ پلی وینیل کلرید $CH_2 = \underset{\substack{ \\ CH_3}}{\overset{\substack{H \\ }}{C}}$ پروپن ب) وجه اشتراک مونومرهای این دو مولکول چیست؟	آ) پلیمر: (پلی پروپن) $\left[\begin{array}{cc} H & H \\ & \\ -C & -C- \\ & \\ H & CH_3 \end{array} \right]_n$ مونومر: (وینیل کلرید) $\begin{array}{c} H & & H \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ & / & \backslash \\ H & & Cl \end{array}$ ب) هر دو دارای زنجیر کربنی با پیوند دوگانه در ساختار خود هستند. (ترکیب سیر نشده هستند).	۱

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۳۳۷	نسبت جرم مولی پروین به مونومر پلی وینیل کلرید را محاسبه کنید. (C=۱۲, Cl=۳۵.۵, H=۱ g/mol)	۱/۵	$\frac{M_{C_3H_6}}{M_{C_2H_3Cl}} = \frac{(3 \times 12) + (6 \times 1)}{(2 \times 12) + (3 \times 1) + (1 \times 35.5)} = \frac{42}{62.5} = 0.67$
۳۳۸	در مورد استایرن کدام عبارت زیر درست و کدام نادرست است؟ (شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید.)  (آ) یک مول آن به طور کامل با یک مول هیدروژن، به ترکیب سیر شده تبدیل می‌شود. (ب) یک ترکیب سیر نشده آروماتیک است. (پ) تعداد اتم‌های کربن استایرن، ۲ برابر تعداد اتم‌های کربن اتن می‌باشد. (ت) نسبت تعداد اتم‌های هیدروژن به تعداد اتم‌های کربن آن، برابر ۱ است.	۱/۵	(آ) نادرست؛ یک مول آن به طور کامل با ۴ مول هیدروژن، به ترکیب سیر شده تبدیل می‌شود. (ب) درست زیرا دارای حلقه بنزنی در ساختار خود است. (پ) نادرست؛ تعداد اتم‌های کربن استایرن C_8H_8 ، ۴ برابر تعداد اتم‌های کربن اتن C_2H_4 می‌باشد. (ت) درست ، فرمول مولکولی استایرن (C_8H_8) است.
۳۳۹	کدام مفاهیم در ارتباط با مفهوم سیر شده بودن یک ترکیب شیمیایی کربن‌دار صحیح است؟ (آ) در پلیمر حاصل از اتن، تمامی پیوندهای میان کربن‌ها یگانه است. (ب) تعیین تعداد دقیق واحدهای تکرار شونده در یک بسپار ممکن نیست. (پ) کالاهای ساخته شده از پلی‌اتن شفاف و نرم هستند. (ت) ترکیبی مانند برمواتان نمی‌تواند در واکنش پلیمر شدن شرکت کند.	۲	(آ) درست، به هنگام پلیمر شدن مولکول‌های اتن، پیوندهای $C=C$ باز شده و در ترکیب حاصل پیوندهای اشتراکی میان اتم‌های کربن یگانه هستند که نشان‌دهنده سیر شده بودن پلیمر حاصل دارد. (ب) درست (پ) نادرست، شفافیت و یا نرمی و سختی پلیمر به نحوه اتصال مونومرها (واحدهای تکرار شونده) بستگی دارد که ایجاد مولکول‌های راست زنجیر کنند و یا شاخه‌دار. (ت) درست، در ساختار برمواتان پیوند میان دو اتم کربن یگانه بوده بنابراین یک ترکیب سیر شده محسوب می‌شود.

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	ساختار مونومر پلینیل کلرید :  ساختار مونومر تفلون:  $\frac{12}{6} = 2$ $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$ در تفلون این نسبت بزرگ تر است.	نسبت جفت الکترون ناپیوندی به جفت الکترون های پیوندی در مونومر کدامیک از درشت مولکول های زیر بزرگ تر است؟ پلینیل کلرید یا تفلون	۳۴۰
۱/۵	$0.7gC_nH_{2n} \times \frac{1molC_nH_{2n}}{14ngC_nH_{2n}} \times \frac{1molH_2}{1molC_nH_{2n}} \times \frac{22400mLH_2}{1molH_2} = 560mLH_2$ $\Rightarrow n = \frac{0.7 \times 22400}{560 \times 14} = 2 \Rightarrow C_2H_4$ ساختار پلیمر حاصل: $-(CH_2-CH_2)_n-$	مقدار ۰/۷ گرم از یک آلکن با جذب ۵۶۰ میلی لیتر گاز هیدروژن کاملاً سیر می شود. فرمول پلیمر حاصل از این آلکن را رسم کنید.	۳۴۱
۲	آ) ترکیب (۱) ، زیرا شاخه دار بوده و در هیدروکربن های شاخه دار حداقل یک کربن بصورت مستقیم به ۳ یا ۴ اتم کربن دیگر متصل است. ب) پلی اتن شاخه دار چگالی کمتری نسبت به پلی اتن بدون شاخه دارد و چگالی هر دو نوع پلیمر از آب کمتر است. بنابراین: $d_{H_2O} > d_2 > d_1$ پ) ترکیب (۲) ، زیرا ساختار آن سخت تر و محکم تر است. ت) هر دو نوع پلیمر ، هیدروکربن سیر شده بوده و ناقطبی هستند. نوع نیروهای جاذبه بین مولکولی در هر دو یکسان و از نوع ضعیف ترین نیروهای جاذبه واندروالس است.	با توجه به ساختار دو نوع پلی اتن نشان داده شده، به پرسش های زیر با ذکر دلیل پاسخ دهید.   (۱) (۲) آ) در کدام ساختار اتم های کربنی یافت می شود که به بیش از دو اتم کربن متصل هستند؟ ب) چگالی این دو ترکیب را با یکدیگر و با آب مقایسه کنید. پ) از کدام ساختار در تولید اسباب بازی استفاده می شود؟ چرا؟ ت) نوع نیروهای بین مولکولی در این دو ساختار را با یکدیگر مقایسه کنید.	۳۴۲




بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱	(آ) بله، زیرا همانند اتن یک ترکیب سیرنشده بوده و در ساختار خود همانند اتن دارای پیوند $C=C$ در زنجیر کربنی است، بنابراین توانایی تشکیل پلیمر را دارد. (ب) $n \begin{array}{c} H & CH_3 \\ & \backslash / \\ & C=C \\ & / \backslash \\ H & CH_3 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} H & CH_3 \\ & \\ -C- & -C- \\ & \\ H & CH_3 \end{array}_n$	(آ) بنظر شما ترکیب متیل پروپن با ساختار مقابل می تواند در واکنش پلیمر شدن شرکت کند؟ علت را توضیح دهید. (ب) واکنش پلیمر شدن این ترکیب را بنویسید. $\begin{array}{c} H & CH_3 \\ & \backslash / \\ & C=C \\ & / \backslash \\ H & CH_3 \end{array}$	۳۴۳
۱	مونومر پلی اتن، هیدروکربن اتن با فرمول C_2H_4 بوده و فرمول مولکولی پروپن C_3H_6 است. درصد جرمی کربن در اتن : $\frac{(2 \times 12)}{(2 \times 12) + (4 \times 1)} \times 100 = \%85 / 71$ درصد جرمی کربن در پروپن: $\frac{(3 \times 12)}{(3 \times 12) + (6 \times 1)} \times 100 = \%85 / 71$ $\Rightarrow \frac{85 / 71}{85 / 71} = 1$	درصد جرمی کربن در مونومر پلی اتن چند برابر درصد جرمی کربن در پروپن است؟	۳۴۴
۱	(الف) پلی اتن $\begin{array}{c} H & H \\ & \\ -C- & -C- \\ & \\ H & H \end{array}_n$ (ب) پلی تترافلوئورواتن (تفلون) $\begin{array}{c} F & F \\ & \\ -C- & -C- \\ & \\ F & F \end{array}_n$	نام و فرمول فرآورده هر یک از واکنش های زیر را بنویسید. a) $nCH_2 = CH_2 \rightarrow$ b) $nCF_2 = CF_2 \rightarrow$	۳۴۵


استان اردبیل - صفحات ۱۰۹ تا ۱۲۲			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۳۴۶	واژه مناسب را انتخاب کنید. آ) در بین ترکیبات آلی (کربوکسیلیک اسیدها- استرها) مزه ترش دارند و مزه میوه‌های مانند انگور و مرکبات به همین دلیل است. ب) دسته‌ای از مواد آلی (کربوکسیلیک اسیدها - استرها) می‌باشند که منشاء بوی خوش شکوفه‌ها گل‌ها و طعم میوه‌ها هستند. پ) نیروی غالب در یک الکل ۹ کربنه از نوع (هیدروژنی- واندروالس) است.	آ) کربوکسیلیک اسیدها ب) استرها پ) واندروالس	۰/۷۵
۳۴۷	برای جمله زیر دلیل بنویسید. الکل‌هایی با تعداد بیشتر از پنج اتم کربن در زنجیره هیدروکربنی در آب حل نمی‌شوند.	با افزایش طول زنجیر کربنی بخش ناقطبی بزرگ‌تر می‌شود، قطبیت مولکول کاهش می‌یابد و بنابراین الکل‌هایی با بیش از پنج اتم کربن در آب حل نمی‌شوند.	۰/۵
۳۴۸	فرمول ساختاری الکل و اسید سازنده استر را بنویسید.	$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH} \\ \text{O} \\ \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{OH} \end{array}$	۰/۵
۳۴۹	با توجه به ساختار داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید. $\left[\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{C}-\text{CH}_2-\text{C}-\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N} \\ \qquad \qquad \\ \text{H} \qquad \qquad \text{H} \end{array} \right]_n$ آ) این ترکیب جزو کدام دسته از پلیمرها است؟ ب) فرمول ساختاری ترکیب‌های حاصل از آبکافت آن را بنویسید.	آ) پلی آمیدها $\text{HO}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ ب) $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ و	۱/۲۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۰/۵	پلیمر سازنده الیاف در این شرایط سریع تر آبکافت شده و به مونومرهای سازنده شکسته شده و بوی حاصل به دلیل تشکیل مونومرها است.	اگر لباس ها را برای مدت طولانی در محلول آب و شوینده قرار دهید، بوی بد و نافذی پیدا می کنند. توضیح دهید چه رخ می دهد؟	۳۵۰
۰/۵	تهیه تایر اتومبیل- قایق بادبانی-لباس مخصوص موتور سواری- جلیقه ضد گلوله	دو کاربرد برای کولار بنویسید.	۳۵۱
۰/۷۵	خط زدن واژه های: قطبی- افزایش- بیشتر انتخاب واژه های: ناقطبی- کاهش- کمتر	عبارت زیر را با خط زدن واژه نادرست در هر مورد کامل کنید. در ترکیب های آلی مانند الکل ها و کربوکسیلیک اسیدها با افزایش طول زنجیر کربنی بخش (ناقطبی/قطبی) بزرگتر می شود، قطبیت مولکول (کاهش / افزایش) می یابد و انحلال پذیری آن در آب (بیشتر / کمتر) می شود.	۳۵۲

	استان آذربایجان غربی - صفحات ۱۰۹ تا ۱۲۲		
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۳۵۳	دیکلوفناک یک داروی مسکن پرکاربرد است که پزشکان اغلب از آن برای تسکین درد ناشی از آرتروز و روماتیسم استفاده می کنند. با توجه به ساختار آن، به پرسش ها پاسخ دهید: (آ) برای تولید استر، این ماده را باید با اتانول واکنش داد یا متیل آمین؟ برای انتخاب خود دلیل بنویسید: (ب) آیا این ماده توانایی تولید آمید را دارد؟ توضیح دهید؟	(آ) اتانول. زیرا دیکلوفناک دارای گروه عاملی اسیدی است که می تواند در واکنش با الکل ها ، استر تولید کند. (ب) بله. چون این ترکیب دارای گروه های عاملی کربوکسیل و آمین است، می تواند در واکنش تشکیل آمید شرکت کند.	۱/۵
۳۵۴	با توجه به ترکیبات داده شده به پرسش ها پاسخ دهید: (۱)  (۲)  (آ) الکل سازنده کدام استر را می توان از واکنش اتن با آب به دست آورد؟ توضیح دهید. (ب) اسید سازنده استر (۱) را بر الکل سازنده استر (۲) اثر می دهیم : (a) نام استر حاصل را بنویسید: (b) ساختار آن را رسم کنید (c) استر حاصل در ترکیب کدام میوه یافت می شود؟	(آ) ترکیب (۲) زیرا الکل سازنده استر (۲) اتانول است. (ب) (a) اتیل بوتانوآت  (b) (c) در آناناس	۲

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



۱/۵	بنزوئیک اسید یک ترکیب جامد بلوری و به رنگ سفید است. که به عنوان نگهدارنده به خوراکی ها یا غذاها افزوده می شود. آیا این ترکیب قادر به تولید پلی استر می باشد؟ توضیح دهید.		خیر - زیرا پلی استرها از واکنش دی اسیدها با دی الکل ها تشکیل می شوند. بنزوئیک اسید یک گروه عاملی کربوکسیل دارد.
۰/۷۵	با استفاده از واژه های درون کادر، عبارتهای زیر را کامل کنید. (برخی واژه ها اضافی است).	آلکان ها - هیدروژنی - آرامی - اتانول - سرعت - متانول	آ) ویتامین C می تواند با آب پیوند برقرار کند. ب) نشاسته در محیط مرطوب با کاتالیزگر یا محیط گرم و مرطوب ، به به مونومرهای سازنده خود تجزیه می شود. پ) برای تولید شوینده با عطر آناناس، از اثر دادن بر بوتانوئیک اسید در مجاورت کاتالیزگر H_2SO_4 می توان استفاده کرد.
۱/۲۵	درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید.	آ) کاتالیزگر واکنش استری شدن همان کاتالیزگر واکنش اتن با آب برای تولید اتانول است. ب) مونومرهای سازنده سلولز و نشاسته، یکسان است. پ) کولار پلی استری ساختگی است که از فولاد هم جرم خود، پنج برابر مقاوم تر است. ت) پلی لاکتیک جزء پلیمرهای سبز به شمار آمده و زیست تخریب پذیر است.	آ) درست ب) درست پ) نادرست - کولار پلی آمیدی ساختگی است که از فولاد هم جرم خود، پنج برابر مقاوم تر است. ت) درست

۰/۷۵	آ) کولار ب) پلی آمیدها پ) دی اسید و دی آمین	۳۵۸ برای محافظت از بدن در مسابقات جت اسکی جنس بادبان ها را از ماده‌ای با استحکامی ۵ برابر فولاد هم جرمش می‌سازند: آ) نام این ماده را بنویسید؟ ب) این ماده جزو کدام دسته از پلیمرهاست؟ پ) اجزای سازنده آن کدام است؟ (دی اسید و دی الکل - دی اسید و دی آمین)
۱	آ) زیرا مولکول‌های پلیمر سازنده آن توسط آب شکسته شده و به مونومرهای سازنده تبدیل می‌شود و گرما هم سرعت این واکنش را افزایش می‌دهد. ب) واکنش آبکافت پلی استرها و پلی آمیدها کند است به همین دلیل لباس تهیه شده از این نوع پارچه برای مدت‌های طولانی قابل استفاده است زیرا استحکام خود را حفظ می‌کند.	۳۵۹ آ) در یک شرکت مهندسی که در محیط گرم و مرطوب قرار دارد، لباس‌های نخی پرسنل زودتر پوسیده می‌شود، علت این اتفاق را بیان کنید. ب) دو الگوی واکنش زیر تجزیه پلی استرها و پلی آمیدها را نشان می‌دهد. با اینکه این دو نوع پلیمر هم در محیط گرم و مرطوب تجزیه می‌شوند ولی برای تهیه لباس پرسنل این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند، علت استفاده از این دو نوع پلیمر را بیان کنید. (الف) $\left[\text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{N} \begin{array}{c} \text{H} \\ \end{array} \text{---} \text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{N} \begin{array}{c} \text{H} \\ \end{array} \right]_n + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow n \text{HOOC} \text{---} \text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{COOH} + n \text{H}_2\text{N} \text{---} \text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{NH}_2$ (ب) $\left[\text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{O} \text{---} \text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{O} \right]_n + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow n \text{HOOC} \text{---} \text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{COOH} + n \text{HO} \text{---} \text{C} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array} \text{---} \text{OH}$

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳


۱/۲۵	ویتامین دی زیرا بخش ناقطبی آن بزرگ تر است مولکولی ناقطبی بوده و در آب حلال قطبی حل نمی شود. ولی ویتامین ث به دلیل داشتن بخش های قطبی بیشتر، مولکولی قطبی بوده و در آب حلال قطبی حل می شود و مقدار اضافی آن از طریق ادرار از بدن دفع می شود.	دانش آموزی قرص ویتامین ث و دی بدون تجویز پزشک مصرف می کند با توجه به فرمول ساختاری استفاده بدون تجویز پزشک از کدام ویتامین برای این دانش آموز مضر خواهد بود و دلیل علمی برای قانع کردن این دانش آموز بیان کنید. ویتامین ث ویتامین دی	۳۶۰
۱/۵	آ) وان دروالس ب) نقطه جوش استر کمتر است زیرا در جاذبه بین مولکولی در استرها از نوع جاذبه های ضعیف وان دروالس می باشند ولی در اسید هم کربن پیوندهای هیدروژنی وجود دارد که بسیار قوی تر بوده و باعث بیشتر شدن نقطه جوش اسیدها می گردد	واکنش زیر را کامل کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید: $\text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---C(=O)OH} + \text{CH}_3\text{OH} \longrightarrow \dots + \dots$ آ) نیروی بین مولکولی در این استر از چه نوعی است؟ ب) نقطه جوش این استر را با اسید هم کربن آن با نوشتن دلیل مقایسه کنید.	۳۶۱

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳



۰/۷۵	(آ) پلی آمیدها $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2 + \text{HO}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ (ب)	بخشی از ساختار مولکول سازنده یک بسیار در شکل زیر ارائه شده است با توجه به آن: $\left[\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}(=\text{O}) \right]_n$ (آ) این بسیار به کدام دسته از بسیارها تعلق دارد؟ (ب) ساختار مونومرهای آن را رسم کنید.	۳۶۲
۲	(آ) گروه آلدهیدی- گروه آمیدی $\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{NO}_2$ (ب) در هگزان چون بخش ناقطبی آن بزرگتر از دو بخش قطبی می باشد (ت) به علاوه دارای حلقه بنزن است	با توجه به ساختار ترکیب داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید:  (آ) نام گروه های عاملی موجود در آن را مشخص کنید. (ب) فرمول مولکولی آن را بنویسید. (پ) این ترکیب در آب انحلال پذیری بیشتری دارد یا در هگزان؟ چرا؟ (ت) آیا می توان این ترکیب را جزو ترکیبات آروماتیک دسته بندی کرد؟ چرا؟	۳۶۳
۱/۷۵	(آ) کولار (ب) جلیقه ضدگلوله $\text{HO}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{OH} + \text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$ (پ) (ت) به دلیل تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیره های پلیمری (ث) کاهش می یابد چون امکان تشکیل پیوند هیدروژنی بین زنجیره های پلیمری وجود نخواهد داشت	شکل زیر متعلق به پلیمری است که استحکامی ۵ برابر فولاد هم جرمش را دارد.  (آ) نام این پلیمر چیست؟ (ب) یک کاربرد برای آن ذکر نمایید. (پ) ساختار مونومرهای آن را رسم نمایید.	۳۶۴

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴



		(ت) علت استحکام بسیار زیاد این پلیمر چیست؟ (ث) با جایگزین کردن اتم های H گروه آمیدی با اتم های Cl در این پلیمر، استحکام پلیمر چه تغییری می کند؟ چرا؟	
۱/۷۵	(آ) گروه کربوکسیل (ب) در آب چون بخش قطبی آن بزرگتر از بخش ناقطبی است (پ) بله چون در ساختار خود دارای گروه کربوکسیل است و می تواند در واکنش با یک الکل به استر تبدیل شود (ت) خبر چون برای تولید پلی استر نیاز به وجود دو گروه کربوکسیل در ساختار آن ترکیب می باشد (جواب زیر را هم می توان نوشت: برای تولید پلی استر، مونومر هر دو گروه کربوکسیل و هیدروکسیل را داشته باشد)	با توجه به ساختار ویتامین B_۲ به سوالات زیر پاسخ دهید: (آ) نام گروه عاملی (b) را بنویسید. (ب) این ویتامین در آب حل می شود یا در چربی؟ چرا؟ (پ) آیا می توان از این ویتامین در تولید استر استفاده کرد؟ چرا؟ (ت) آیا می توان از این ویتامین در تولید پلی استر استفاده کرد؟ چرا؟	۳۶۵






استان آذربایجان شرقی - صفحات ۱۰۹ تا ۱۲۲			
ردیف	متن سوال	پاسخ سوال	نمره
۳۶۶	با توجه به ترکیب‌های آلی داده شده، به سوالات پاسخ دهید: ۱) $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ۲) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ ۳) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ ۴) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CON}(\text{CH}_3)_2$ ۵) HCOOCH_3 ۶) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ آ) فرمول شیمیایی ترکیب «۲» را بنویسید. ب) کدام ترکیب‌ها توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی دارند؟ پ) ساده‌ترین ترکیب استری کدام است؟ ت) کدام ترکیب یک آمید است؟ ث) از آبکافت ترکیب «۱» در محیط اسیدی، چه ترکیباتی تولید می‌شود؟ (ساختار آنها را رسم کنید).	$\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_2$ (آ) ب) ۲ و ۶ پ) ۵ ت) ۴ ث) یک اسید و یک الکل CH_3COOH $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	۲
۳۶۷	کدام یک از مونومرهای زیر در ساخت پلی استر استفاده می‌شود؟ چرا؟ ۱) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ۲) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ۳) $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ۴) $\text{OHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	گزینه ۴ - چون دی ال یا دی الکل است. (دو عامل الکلی دارد)	۰/۵



۱/۷۵	آ) درست ب) درست پ) نادرست - کوچکتری ت) نادرست - ۵ برابر	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کرده و شکل صحیح عبارت‌های نادرست را بنویسید. آ) ویژگی چربی دوستی الک‌ها، با افزایش شمار اتم‌های کربن، افزایش می‌یابد. ب) اتانول به هر نسبتی در آب حل می‌شود. پ) پلی لاکتیک اسیدها، ردپای وسیعی در محیط زیست برجای می‌گذارند. ت) کولار از فولاد هم جرم خود ۳ برابر مقاوم‌تر است.	۳۶۸
۰/۲۵	ب) اثر غلظت	"اگر سفیدکننده‌ها را به طور مستقیم روی لباس بریزیم، رنگ لباس در محل تماس به سرعت از بین می‌رود، اما اگر آن را در آب بریزیم سپس لباس را درون محلول آن با آب فرو ببریم، تغییر محسوسی در رنگ لباس ایجاد نمی‌شود." این مسئله اثر کدام عامل را بر روی واکنش پذیری نشان می‌دهد؟ آ) دما ب) غلظت پ) کاتالیزگر ت) جنس	۳۶۹
۱	آ) گروه عاملی آمیدی ب) گروه هیدروکسیل	در ساختارهای زیر دور گروه‌های عاملی خط کشیده و نام هریک را بنویسید:  آ)  ب)	۳۷۰

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳




۱	اگر ماده $R-COO-R'$ تولید کننده بوی نوعی میوه باشد، (آ) با ذکر دلیل بنویسید در چنین ساختارهایی کدام یک از گروه‌های R یا R' می‌تواند هیدروژن باشد؟ (ب) دانشجویی برای تهیه ماده‌ای دارای ۶ کربن شبیه ساختار بالا، از اتانول و کدام ماده دیگر باید استفاده کند؟ نام و ساختار آن ماده را بنویسید. آ) گروه R- چون استر است و R' باید زنجیره کربنی باشد. (ب) بوتانویک اسید $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$	۳۷۱
۱	الکل‌های زیر را از نظر انحلال‌پذیری در آب مقایسه کرده و نیروی بین مولکولی غالب در آنها را مشخص کنید. (آ) CH_7CH_7OH (ب) $CH_3(CH_2)_9OH$ ترکیب آ در آب محلول و نیروی بین مولکولی غالب هیدروژنی و ترکیب ب در آب نامحلول و نیروی بین مولکولی غالب واندروالس است.	۳۷۲
۰/۵	طرف دوم معادله پلیمری شدن زیر را بنویسید. $n CH_3 - CH = CH_2 \xrightarrow{\text{دما و فشار بالا}}$ $\left(\begin{array}{c} H & H \\ & \\ -C & -C- \\ & \\ CH_3 & H \end{array} \right)_n$	۳۷۳
۰/۵	نایلون ۶۶ پلی آمیدی است که از واکنش آدیپیک اسید و هگزا متیلن دی آمین به دست می‌آید. فرمول ساختاری این پلیمر را بنویسید. $n HOOC(CH_2)_4COOH + n NH_2(CH_2)_6NH_2 \rightarrow$ $(CO(CH_2)_4CONH(CH_2)_6NH)_n$ 	۳۷۴
۱	مونومرهای سازنده پلیمر زیر را رسم کنید.  $HO-C(=O)-C(=O)-OH$ $HO-C_5H_8-OH$	۳۷۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳




۱/۵	نمودار الف انحلال الکلی و نمودار ب انحلال آلکان را نشان می‌دهد. ب) الکلی‌ها با داشتن گروه هیدروکسیل توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب را دارند و در آب حل می‌شوند. پ) هرچه تعداد اتم‌های کربن در الکلی‌ها کمتر باشد، به دلیل غلبه بخش قطبی بر بخش ناقطبی انحلال‌پذیری در آب بیشتر خواهد بود. طبق نمودار در ترکیب ۱ تعداد اتم‌های کربن کمتر از تعداد اتم کربن در ترکیب ۲ است.	نمودار زیر انحلال‌پذیری الکلی‌ها و آلکان‌ها را در آب نشان می‌دهد: آ) از نمودارهای الف و ب، کدام یک انحلال‌پذیری الکلی و کدام یک انحلال‌پذیری آلکان را نشان می‌دهد؟ ب) چه عاملی باعث انحلال ترکیبات نمودار الف در آب می‌شود؟ پ) توضیح دهید چرا انحلال‌پذیری ترکیب شماره ۱ از ترکیب شماره ۲ بیشتر است؟ 	۳۷۶									
۱/۷۵	۱- ماده ۲ - چون بیش از ۵ کربن دارد و بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد. ۲- ماده ۱- زیرا کمتر از ۵ کربن دارد. ۳- پیوند هیدروژنی ۴- بخش OH	با توجه به جدول زیر که دو نوع الکلی هستند به سوالات زیر پاسخ دهید: <table border="1"><thead><tr><th>ردیف</th><th>نام</th><th>فرمول</th></tr></thead><tbody><tr><td>۱</td><td>پروپانول</td><td>$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$</td></tr><tr><td>۲</td><td>۱-هگزانول</td><td>$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_2\text{OH}$</td></tr></tbody></table> ۱- کدام ماده در آب حل نمی‌شود؟ علت حل نشدن آن چیست؟ ۲- قطبیت کدام یک بیشتر است؟ چرا؟ ۳- نیروی بین مولکولی غالب در الکلی ۱ را بنویسید. ۴- بخش قطبی در مولکول ۱ کدام است؟	ردیف	نام	فرمول	۱	پروپانول	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$	۲	۱-هگزانول	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_2\text{OH}$	۳۷۷
ردیف	نام	فرمول										
۱	پروپانول	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$										
۲	۱-هگزانول	$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_4-\text{CH}_2\text{OH}$										
۱/۷۵	آ) پلی آمیدها ب) بله زیرا دارای پیوند N-H است. پ) دی اسید 	در شکل زیر واحد تکرارشونده یک پلیمر نشان داده شده است. 	۳۷۸									

	دی آمین 	آ) این پلیمر به کدام دسته از پلیمرها تعلق دارد؟ ب) آیا این پلیمر قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی است؟ چرا؟ پ) فرمول ساختاری مونومرهای تشکیل دهنده این پلیمر را رسم کنید.	
۲/۲۵	آ) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{OH}$ قطبی ناقطبی ب) بله - در الکل‌های با ساختار کوچک و تا پنج کربن، بخش قطبی بر ناقطبی غلبه دارد و الکل در آب محلول است. پ) پیوند هیدروژنی ت) گروه عاملی هیدروکسیل ث) 	با توجه به ساختار داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید. $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{OH}$ آ) بخش قطبی و ناقطبی آن را مشخص کنید. ب) آیا این ترکیب در آب حل می شود؟ چرا؟ پ) نیروی بین مولکولی غالب آن چه نام دارد؟ ت) کدام گروه عاملی در ساختار آن وجود دارد؟ ث) فرمول ساختاری استر حاصل از واکنش این ماده با استیک اسید را بنویسید.	۳۷۹
۱	$\text{CH}_3\text{C(=O)OH} + \text{HOCH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{C(=O)OCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ اتانویک اسید اتانول اتیل اتانوات $\Delta \text{mol اسید} \times \frac{1 \text{ mol استر}}{1 \text{ mol اسید}} \times \frac{88 \text{ g استر}}{1 \text{ mol استر}} \times \frac{80 \text{ g استر}}{100 \text{ g استر}} = 352 \text{ g}$	مخلوطی از ۵ مول اتانویک اسید و ۵ مول اتانول در مجاورت H_2SO_4 گرما داده شده است. اگر بازده درصدی واکنش ۸۰٪ باشد ، جرم استر تولید شده چند گرم است؟ ($\text{O} = 16$ و $\text{H} = 1$ و $\text{C} = 12$)	۳۸۰

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۰/۵	$\left[\begin{array}{c} \text{O} \quad \quad \text{O} \\ \parallel \quad \quad \parallel \\ -\text{C} - (\text{CH}_2)_8 - \text{C} - \text{O} - (\text{CH}_2)_6 - \text{O} - \end{array} \right]_n$	اگر فرمول مولکولی یک دی اسید راست‌زنجیر $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_4$ و فرمول مولکولی یک دی الکل راست‌زنجیر $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_2$ باشد، فرمول ساختاری پلیمر حاصل را بنویسید. (تعداد مول هریک از واکنش‌دهنده‌ها را n مول در نظر بگیرید)	۳۸۱
۰/۷۵	(آ) H_2O و $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$: B و A (ب) سولفوریک اسید (H_2SO_4)	با توجه به واکنش داده شده به سوالات پاسخ دهید. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow \dots (\text{A}) \dots + \dots (\text{B}) \dots$ (آ) ماده (A) و (B) را بنویسید. (ب) برای انجام این واکنش به این محیط باید H_2SO_4 اضافه کرد یا NaOH ؟	۳۸۲
۰/۵	(۱) هیدروژنی (۲) واندروالس	نوع نیروی بین مولکولی غالب در الکل‌های زیر را مشخص کنید.  (۲)  (۱)	۳۸۳
۱		ساختار پلی استر تولید شده از واکنش الکل و اسید زیر در شرایط مناسب را رسم کنید.  	۳۸۴
۱/۲۵	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{OH} + \text{HOCH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ اتانویک اسید اتانول اتیل اتانوات	$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_2\text{CH}_3$ به عنوان حلال چسب استفاده می‌شود. واکنش تولید این ماده را بنویسید.	۳۸۵

بانک سوالات مفهومی شیمی ۲ پایه یازدهم ، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

۱/۲۵	HOOC--COOH و H₂N--NH₂ آ) پلی آمیدها ب) کولار	ساختار پلیمر رسم شده را در نظر بگیرید.  آ) نام خانواده این پلیمر را بنویسید. ب) ساختار مونومرهای این پلیمر را رسم کنید. پ) یک پلیمر از این خانواده را نام ببرید.	۳۸۶
۱/۷۵	$\frac{\text{اسید } 130\text{g}}{1\text{mol اسید}} \times \frac{1\text{mol اسید}}{1\text{mol استر}} \times \frac{1\text{mol استر}}{172\text{g استر}} \times 43\text{g استر} = \text{اسید } ?\text{g}$ $\frac{\text{مقدار نظری } 100\text{g}}{\text{مقدار عملی } 60\text{g}} = 19/5(\text{g})$	جرم اسید تولید شده در اثر واکنش ۴۳ گرم از استر زیر با مقدار کافی آب، در صورتی که بازده واکنش ۶۰٪ باشد، چند گرم خواهد بود؟ (C = 12, O = 16, H = 1: g.mol⁻¹) 	۳۸۷